臺灣省農業試驗所保存稻種誌

A MONOGRAPH OF RICE VARIETIES PRESERVED BY TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

臺 灣 省 農 業 試 驗 所 主 編

Editor : Taiwan Agricultural Research Institute

TARI LIB.
C003879

中 國 農 村 復 興 委 員 會 補 助

Financed by Joint Commission on Rural Reconstruction

臺 灣 省 稻 作 改 進 會 出 版

中華民國五十三年五月

Published by Taiwan Rice Improvement Conference

TAIWAN, CHINA

MAY 1964

434.115
4039
1964

3394

臺灣省農業試驗所保存稻種誌

A MONOGRAPH OF RICE VARIETIES PRESERVED BY TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

臺 灣 省 農 業 試 驗 所 主 編

Editor : Taiwan Agicultural Research Institute

C003879

中 國 農 村 復 興 委 員 會 補 助

Financed by Joint Commission on Rural Reconstruction

臺 灣 省 稻 作 改 進 會 出 版

中華民國五十三年五月

Published by Taiwan Rice Improvement Conference

TAIWAN, CHINA

MAY 1964

A-001546

目　錄
CONTENTS

頁 Page

序 Preface

特性符號註解 Symbols used for various characters and remarks …… I

稻種類別及品種名稱代號對照表 List of classification, code number and name of rice varieties observed…… III

一、緒言 Introduction …… 1

二、調查材料 Materials …… 1

三、調查方法 Methods …… 2

四、調查結果 Results …… 6

1 臺灣蓬萊稻 (Taiwan Ponlai Variety) …… 7

2 中國大陸稻 (Mainland Chinese Variety) …… 45

3 臺灣在來稻 (Taiwan Native Variety) …… 103

4 日本稻 (Japanese Variety) …… 139

5 韓國稻 (Korean Variety) …… 157

6 臺灣蓬萊陸稻 (Taiwan Ponlai Upland Variety) …… 159

7 臺灣在來陸稻 (Taiwan Native Upland Variety) …… 160

8 臺灣山地陸稻 (Taiwan Mountainous Variety) …… 162

9 日本陸稻 (Japanese Upland Variety) …… 167

10 中國大陸糯稻 (Mainland China Glutinous Variety) …… 169

11 中灣在來糯稻 (Taiwan Native Glutinous Variety) …… 172

12 日本糯稻 (Japan Glutinous Variety) …… 177

13 日本陸糯糯 (Japan Upland Glutinous Variety) …… 180

14 臺灣蓬萊糯稻 (Taiwan Ponlai Glutinous Variety) …… 182

15 臺灣山地陸糯稻 (Taiwan Mountain Glutinous Variety) …… 185

16 錫蘭稻 (Ceylonese Variety) …… 188

17埃及稻 (Egyptian Variety)········ 189
18印度稻 (Indian Variety)········ 190
19印尼稻 (Indonesian Variety)········ 197
20意大利稻 (Italian Variety)········ 207
21獅子山稻 (Sierra Leone Variety)········ 208
22菲律賓稻 (Philippines Variety)········ 209
23巴基斯坦稻 (Pakistani Variety)········ 218
24西班牙稻 (Spainish Variety)········ 219
25泰國稻 (Thailand Variety)········ 220
26美國稻 (American Variety)········ 221
27越南稻 (Vietnam Variety)········ 227
28其 他 (Others)········ 231

序

據本廳民國50年農情報告，稻作栽培總面積（包括水稻與陸稻）七十八萬公頃，佔作物種植總面積百分之48.4，總生產量200萬公噸，生產價值為新臺幣93億，佔農作物總生產價值百分之45.47。目前本省稻作每公頃產量雖在光復後15年間，提高百分之96，在38年至49年提高百分之53.6，但近年來本省人口激增，對每公頃稻米產量再提高之壓力愈大，極需竭力改善始能追隨人口之增加。

在產量增高因素方面，除水利、栽培法之改善、肥料之增施與病蟲害之防治外，品種之改良為極重要因子。但從事品種改良工作者，不能赤手創造新品種，正如建築師不能憑空建築大厦。換言之，能廣集世界各地各種不同之品種，並加以觀察比較，然後應其育種目的，選擇最適合之材料，以供有關農業試驗場所從事改良工作之用。

近年來國內從事稻作實驗與研究大有進展，研究報告亦甚充實可觀，此為我同仁之努力有以致之。惜介紹中外稻種，書籍文獻仍未多見，因此使部份從事研究工作者，對國內外引進稻種之諸特性，未能進一步明瞭，致不能充分發揮與利用。

本廳所屬農業試驗所有鑑於此，曾獲農復會補助，將該所保存3000餘稻種加以整理，並將該類稻種的特性加以調查，以供有關單位從事稻作改良工作之參考，而達增產之目的。

本書之編印，承農復會經費之協助，謹此誌謝！

臺灣省政府農林廳廳長 張憲秋

中華民國五十三年四月

特性符號註解

Symbols used for various characters and remarks

① Plant height (cm.)
② First crop (from March to July)
③ Second crop (from August to November)
④ Number of tillers
⑤ Color of leaf blade
LGn: Light Green
Gn: Green
DGn: Deep Green
⑥ Color of basal portion of culm
Gn: Green
P: Purple
⑦ Weight of Panicle (g.)
⑧ Awn;
—: Awnless
FL: More than 2 cm. in length and 75% of the spikelets are awned
FM: 1~2 cm. in length and 75%−100% spikelets are awned.
FS: Less than 1 cm. in length and 75%-100% spikelets are awned.
PL: More than 2 cm. in length and 30%−75% of the spikelets are awned.
PM: 1−2cm. in length and 50% of spikelets are awned
PS: Less than 1 cm. in length and 50% of spikelets are awned.
RL: More than 2 cm. in length and less than 30% of spikelets are awned.
RM: 1~2 cm. in length and less than 30% of spikelets are awned.
RS: Less than 1 cm. in length and less than 30% of spikelets are awned.
⑨Color of stigma
W: White
RP: Reddish Purple
BP: Blackish Purple
P: Purple
⑩ Color of apiculus
⑪ Color of apiculus at blooming stage
LGn: Light Green
RP: Reddish Purple
DP: Dark Purple
BP: Blackish Purple
P: Purple
⑫Color of apiculus at maturity
○: Coloured
×: Colourless
⑬ Colour of lemma
YS: Yellow Straw
WS: White Straw
LG: Light Gold
Gd: Gold

BF: Brown Furrows
RB: Reddish Brown
DP: Dark Purple

⑭ Seedling blast
R: Resistant
M: Moderate
S: Susceptible
O: No infection
* (Suffix numbers express the number of spot on leaf.)

⑮ Leaf blast
0: Very highly resistant
1: Highly resistant
2: Moderately resistant
3: Moderately Susceptbile
4: Susceptible
5: Very susceptible

⑯ Neck blast (Percentage of infected necks)
0-10: Very hightly resistant
11-30: Highly resistant
31-50: Moderately resistant
51-70: Moderately Susceptible
71-90: Susceptible
91-100: Very susceptible

⑰ Sheath blight spot

⑱ Percentage of infected tillers by sheath blight spot

⑲ Degree of severity: The following formula has been proposed to estimate the degree of severity.

$$\text{Degree of severity}(\%)=\frac{3n_1+2n_2+1n_3+0n_4}{3N}\times 100$$

Where, $N=n_1+n_2+n_3+n_4$
n_1=Number of stems having affected upper leaf sheaths up to the leaf.
n_2=Number of stems having affected upper leaf sheaths except the top leaf sheath.
n_3=Number of stems having affected leaf sheaths except uppermost 2 leaf sheaths.
n_4=Number of stems having the 4 uppermost-leaf sheaths healthy.

⑳ Lodging sesistance
| : Erect
/: Bending
−: Lodged

㉑ Drought resistance of reaction to potassium chlorate of young seedlings.)
−: Little or no injury
±: Slight injury
+: Moderate injury
卄: Much iujnry
d: Dead or nearly dead

㉒ Response to Nitrogen
A: Very high response
B: High response
C: response
D: Low response
E: Very low response
△: uncertain

㉓ Percentage of shattering

㉔ Date of heading (month/day)

㉕ Intermediate Crop

㉖ Ratio of length to width of grain

㉗ Endosperm
Gl: Non-glutinous
gl: Glutinous

㉘ Remark

稻種類別及品種名稱品種代號對照表

(List of classification, code number and name of rice varieties observed)

臺灣蓬萊稻 (Taiwan Ponlai Varieties)

品種代號 Code Number	品 種 名 稱 Variety Name		品種代號 Code Number	品 種 名 稱 Variety Name	
1	臺農 16號	Tainung No. 16	62	農育1572號	Nungyu No. 1572
2	〃 28〃	Tainung No. 28	63	〃 1575〃	Nungeu No. 1575
3	〃 29〃	Tainung No. 29	64	〃 1576〃	Nungyu No. 1576
4	〃 33〃	Tainung No. 33	65	〃 1577〃	Nungyu No. 1577
5	〃 34〃	Tainung No. 34	66	〃 1584〃	Nungyu No. 1584
6	〃 37〃	Tainung No. 37	67	〃 1586〃	Nungyu No. 1586
7	〃 38〃	Tainung No. 38	68	〃 1594〃	Nungyu No. 1594
8	〃 40〃	Tainung No. 40	69	〃 1609〃	Nungyu No. 1609
9	〃 41〃	Tainung No. 41	70	〃 1625〃	Nungyu No. 1625
11	〃 45〃	Tainung No. 45	73	〃 1694〃	Nungyu No. 1694
12	〃 47〃	Tainung No. 47	74	〃 1774〃	Nungyu No. 1774
13	〃 48〃	Tainung No. 48	75	〃 1779〃	Nungyu No. 1779
14	〃 49〃	Tainung No. 49	76	〃 1783〃	Nungyu No. 1783
15	〃 51〃	Tainung No. 51	77	〃 1792〃	Nungyu No. 1792
16	〃 52〃	Tainung No. 52	78	〃 1795〃	Nungyu No. 1795
17	〃 53〃	Tainung No. 53	79	〃 1799〃	Nungyu No. 1799
18	〃 54〃	Tainung No. 54	80	〃 1800〃	Nungyu No. 1800
19	〃 55〃	Tainung No. 55	81	〃 1801〃	Nungyu No. 1801
41	農育 832號	Nungyu No. 832	82	〃 1802〃	Nungyu No. 1802
42	〃 1110〃	Nungyu No. 1110	83	〃 1803〃	Nungyu No. 1803
43	〃 1136〃	Nungyu No. 1136	84	〃 1804〃	Nungyu No. 1804
44	〃 1310〃	Nungyu No. 1310	85	〃 1805〃	Nungyu No. 1805
45	〃 1322〃	Nungyu No. 1322	86	〃 1806〃	Nungyu No. 1806
46	〃 1336〃	Nungyu No. 1336	87	〃 1807〃	Nungyu No. 1807
47	〃 1342〃	Nungyu No. 1342	88	〃 1808〃	Nungyu No. 1808
48	〃 1376〃	Nungyu No. 1376	89	〃 1809〃	Nungyu No. 1809
49	〃 1383〃	Nungyu No. 1383	90	〃 1811〃	Nungyu No. 1811
50	〃 1385〃	Nungyu No. 1385	91	〃 1812〃	Nungyu No. 1812
51	〃 1400〃	Nungyu No. 1400	92	〃 1814〃	Nungyu No. 1814
52	〃 1490〃	Nungyu No. 1490	93	〃 1815〃	Nungyu No. 1815
53	〃 1502〃	Nungyu No' 1502	94	〃 1816〃	Nungyu No. 1816
54	〃 1511〃	Nungyu No. 1511	95	〃 1817〃	Nungyu No. 1817
55	〃 1517〃	Nungyu No. 1517	96	〃 1818〃	Nungyu No. 1818
56	〃 1518〃	Nungyu No. 1518	97	〃 1819〃	Nungyu No. 1819
57	〃 1537〃	Nungyu No. 1537	98	〃 1821〃	Nungyu No. 1821
58	〃 1538〃	Nungyu No. 1538	99	〃 1822〃	Nungyu No. 1822
59	〃 1539〃	Nungyu No. 1539	100	〃 1823〃	Nungyu No. 1823
60	〃 1544〃	Nungyu No. 1544	101	〃 1824〃	Nungyu No. 1824
61	〃 1570〃	Nungyu No. 1570	102	〃 1826〃	Nungyu No. 1826

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
103	農育1823號	Nungyu No. 1828
104	〃 1829〃	Nungyu No. 1982
105	〃 1830〃	Nungyu No. 1830
106	〃 1831〃	Nungyu No. 1831
107	〃 2019〃	Nungyu No. 2019
108	〃 2092〃	Nungyu No. 2092
109	〃 2136〃	Nungyu No. 2136
110	農試 4〃	Nungshih No. 4
112	〃 10〃	Nungshih No. 10
113	〃 18〃	Nungshih No. 187
122	臺北 7〃	Taipei No. 7
124	〃 8〃	Taipei No. 8
126	〃 9〃	Taipei No. 9
127	〃 10〃	Taipei No. 10
128	〃 11〃	Taipei No. 11
129	〃 12〃	Taipei No. 12
130	〃 13〃	Taipei No. 13
131	〃 20〃	Taipei No. 20
133	〃 22〃	Taipei No. 22
134	〃 25〃	Taipei No. 25
136	〃 27〃	Taipei No. 27
138	〃 73〃	Taipei No. 73
139	〃 74〃	Taipei No. 74
140	〃 101〃	Taipei No. 101
141	〃 102〃	Taipei No. 102
142	〃 105〃	Taipei No. 105
143	〃 106〃	Taipei No. 106
144	〃 108〃	Taipei No. 108
145	〃 109〃	Taipei No. 109
146	〃 110〃	Taipei No. 110
147	〃 111〃	Taipei No. 111
148	〃 113〃	Taipei No. 113
149	〃 114〃	Taipei No. 114
150	〃 116〃	Taipei No. 116
151	〃 117〃	Taipei No. 117
152	〃 118〃	Taipei No. 118
153	〃 119〃	Taipei No. 119
154	〃 120〃	Taipei No. 120
155	〃 121〃	Taipei No. 121
156	〃 123〃	Taipei No. 123
157	〃 124〃	Taipei No. 124
158	〃 125〃	Taipei No. 125
160	〃 126〃	Taipei No. 126
162	〃 127〃	Taipei No. 127

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
163	臺北 129號	Taipei No. 129
164	〃 130〃	Taipei No. 130
165	〃 131〃	Taipei No. 131
166	〃 132〃	Taipei No. 132
167	〃 133〃	Taipei No. 133
169	〃 135〃	Taipei No. 135
170	〃 136〃	Taipei No. 136
171	〃 137〃	Taipei No. 137
172	〃 138〃	Taipei No. 138
173	〃 139〃	Taipei No. 139
174	〃 140〃	Taipei No. 140
175	〃 141〃	Taipei No. 141
176	〃 142〃	Taipei No. 142
177	〃 143〃	Taipei No. 143
178	〃 145〃	Taipei No. 145
179	〃 149〃	Taipei No. 149
180	〃 150〃	Taipei No. 150
181	〃 151〃	Taipei No. 151
182	〃 152〃	Taipei No. 152
183	〃 153〃	Taipei No. 153
184	〃 154〃	Taipei No. 154
185	〃 155〃	Taipei No. 155
186	〃 156〃	Taipei No. 156
187	〃 157〃	Taipei No. 157
188	〃 158〃	Taipei No. 158
189	〃 159〃	Taipei No. 159
190	〃 160〃	Taipei No. 160
191	〃 161〃	Taipei No. 161
192	〃 163〃	Taipei No. 163
193	〃 164〃	Taipei No. 164
194	〃 165〃	Taipei No. 165
195	〃 166〃	Taipei No. 166
196	〃 167〃	Taipei No. 167
197	〃 168〃	Taipei No. 168
198	〃 169〃	Taipei No. 169
199	〃 170〃	Taipei No. 170
200	〃 172〃	Taipei No. 172
201	〃 173〃	Taipei No. 173
202	〃 174〃	Taipei No. 174
203	〃 175〃	Taipei No. 175
204	〃 176〃	Taipei No. 176
205	〃 177〃	Taipei No. 177
207	〃 178〃	Taipei No. 178
208	〃 179〃	Taipei No. 179

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
209	臺北 180號	Taipei No. 180
210	〃 181〃	Taipei No. 181
211	〃 182〃	Taipei No. 182
212	〃 183〃	Taipei No 183
213	〃 185〃	Taipei No. 185
214	〃 186〃	Taipei No 186
215	〃 187〃	Taipei No 187
216	〃 188〃	Taipei No. 188
217	〃 189〃	Taipei No. 189
218	〃 190〃	Taipei No. 190
219	〃 191〃	Taipei No 191
220	〃 192〃	Taipei No 192
221	〃 194〃	Taipei No 194
223	〃 196〃	Taipei No 196
224	〃 197〃	Taipei No 197
225	〃 242〃	Taipei No 242
226	〃 301〃	Taipei No 301
228	〃 451〃	Taipei No. 451
242	新竹 4號	Hsinchu No. 4
244	〃 7〃	Hsinchu No. 7
245	〃 8〃	Hsinchu No. 8
248	〃 24〃	Hsinchu No. 24
249	新農育 31號	Hsinnungyu No. 31
250	〃 34〃	Hsinnungyu No. 34
251	〃 35〃	Hsinnungyu No. 35
252	〃 38〃	Hsinnungyu No. 38
253	〃 41〃	Hsinnungyu No. 41
255	新竹 50〃	Hsinchu No. 50
256	〃 51〃	Hsinchu No. 51
257	〃 52〃	Hsinchu No. 52
258	〃 53〃	Hsinchu No. 53
259	〃 54〃	Hsinchu No. 54
260	〃 55〃	Hsinchu No, 55
261	〃 56〃	Hsinchu No. 56
262	〃 57〃	Hsinchu No. 57
281	苗栗 3號	Miaoli No. 3
282	〃 4〃	Miaoli No. 4
283	〃 11〃	Miaoli No. 11
284	〃 16〃	Miaoli No. 16
285	〃 17〃	Miaoli No. 17
286	〃 18〃	Miaoli No. 18
287	〃 20〃	Miaoli No. 20
288	〃 22〃	Miaoli No. 22
289	〃 26〃	Miaoli No. 26

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
290	苗栗 31號	Miaoli No. 31
291	〃 34〃	Miaoli No. 34
292	〃 36〃	Miaoli No. 36
293	〃 37〃	Miaoli No. 37
294	〃 39〃	Miaoli No. 39
295	〃 50〃	Miaoli No. 50
296	〃 56〃	Miaoli No. 56
297	〃 58〃	Miaoli No. 58
322	臺中 65號	Taichung No. 65
323	〃 114〃	Taichung No. 114
325	〃 122〃	Taichung No. 122
326	〃 145〃	Taichung No. 145
328	〃 150〃	Taichung No. 150
329	〃 151〃	Taichung No. 151
330	〃 152〃	Taichung No. 152
331	〃 153〃	Taichung No. 153
333	〃 154〃	Taichung No. 154
335	〃 155〃	Taichung No. 155
336	〃 156〃	Taichung No. 156
337	〃 157〃	Taichung No. 157
338	〃 158〃	Taichung No. 158
339	〃 159〃	Taichung No. 159
341	〃 160〃	Taichung No. 160
345	〃 162〃	Taichung No. 162
346	〃 163〃	Taichung No. 163
347	〃 164〃	Taichung No. 164
348	〃 166〃	Taichung No. 166
349	〃 167〃	Taichung No. 167
351	〃 170〃	Taichung No. 170
353	臺中育171〃	Taichungyu No. 171
354	臺中 172〃	Taichung No. 172
355	臺中育173〃	Taichungyu No. 173
356	臺中育174〃	Taichungyu No. 174
357	臺中育175〃	Taichungyu No. 175
358	臺中 176〃	Taichung No. 176
359	臺中育177〃	Taichungyu No. 177
360	臺中 178〃	Taichung No. 178
361	〃 179〃	Taichung No. 179
362	〃 180〃	Taichung No. 180
363	臺中育 5〃	Taichungyu No. 5
364	〃 8〃	Taichungyu No. 8
365	〃 11〃	Taichungyu No. 11
366	〃 12〃	Taichungyu No. 12
367	〃 14〃	Taichungyu No. 14

品種代號 Code Number	品種名稱	Variety Name
368	臺中育 15號	Taichungyu No. 15
369	〃 16〃	Taichungyu No. 16
370	〃 17〃	Taichungyu No. 17
371	〃 43〃	Taichungyu No. 43
373	臺中特 6號	Taichung special No. 6
375	光 復401號	Kwangfu No. 401
376	臺 中181號	Taichung No. 181
401	嘉 南 1號	Chianan No. 1
403	〃 2〃	Chianan No. 2
405	〃 3〃	Chianan No. 3
407	〃 4〃	Chianan No. 4
409	〃 5〃	Chianan No. 5
411	〃 6〃	Chianan No. 6
413	〃 7〃	Chianan No. 7
415	〃 8〃	Chianan No. 8
417	〃 9〃	Chianan No. 9
419	〃 10〃	Chianan No. 10
420	〃 11〃	Chianan No. 11
421	〃 12〃	Chianan No. 12
422	〃 13〃	Chianan No. 13
423	〃 14〃	Chianan No. 14
426	〃 15〃	Chianan No. 15
427	〃 16〃	Chianan No. 16
428	〃 17〃	Chianan No. 17
429	〃 18〃	Chianan No. 18
430	〃 19〃	Chianan No. 19
432	〃 20〃	Chianan No. 20
433	〃 21〃	Chianan No. 21
434	嘉義晚 2號	Chiai-wan No. 2
436	南 育370號	Nanyu No. 370
437	〃 386〃	Nanyu No. 386
440	〃 485〃	Nanyu No. 485
441	〃 488〃	Nanyu No. 488
442	〃 500〃	Nanyu No. 500
443	〃 504〃	Nanyu No. 504
445	〃 508〃	Nanyu No. 508
446	臺 南 1號	Tainan No. 1
447	〃 2〃	Tainan No. 2
448	南改育 4號	Nankaiyu No. 4
449	〃 5〃	Nankaiyu No. 5
450	〃 6〃	Nankaiyu No. 6
451	〃 7〃	Nankaiyu No. 7
452	〃 8〃	Nankaiyu No. 8
453	臺 南 3號	Tainan No. 3

品種代號 Code Number	品種名稱	Variety Name
454	南改育 10號	Nankaiyu No. 10
455	〃 11〃	Nankaiyu No. 11
456	臺 南 4號	Tainan No. 4
457	南改育 13號	Nankaiyu No. 13
482	光 復 1號	Kwangfu No. 1
484	嘉 農 242號	Chianung No. 242
486	嘉農育 280號	Chianungyu No. 280
487	〃 411〃	Chianungyu No. 411
488	〃 428〃	Chianungyu No. 423
489	〃 478〃	Chianungyu No. 478
490	〃 2024〃	Chianungyu No. 2024
491	〃 2574〃	Chianungyu No. 2574
492	〃 1733〃	Chianungyu No. 1733
521	高 雄 6號	Kaohsiung No. 6
523	〃 10〃	Kaohsiung No. 10
526	〃 12〃	Kaohsiung No. 12
527	〃 13〃	Kaohsiung No. 13
529	〃 16〃	Kaohsiung No. 16
531	〃 18〃	Kaohsiung No. 18
533	〃 19〃	Kaohsiung No. 19
535	〃 20〃	Kaohsiung No. 20
536	〃 21〃	Kaohsiung No. 21
537	〃 22〃	Kaohsiung No. 22
539	〃 23〃	Kaohsiung No. 23
541	〃 24〃	Kaohsiung No. 24
543	〃 25〃	Kaohsiung No. 25
544	〃 26〃	Kaohsiung No. 26
546	〃 27〃	Kaohsiung No. 27
547	〃 28〃	Kaohsiung No. 28
548	〃 29〃	Kaohsiung No. 29
549	〃 53〃	Kaohsiung No. 53
550	高雄育 2號	Kaohsiungyu No. 2
551	〃 3〃	Kaohsiungyu No. 3
552	〃 4〃	Kaohsiungyu No. 4
553	〃 5〃	Kaohsiungyu No. 5
554	〃 6〃	Kaohsiungyu No. 6
555	〃 7〃	Kaohsiungyu No. 7
556	〃 8〃	Kaohsiungyu No. 8
557	〃 9〃	Kaohsiungyu No. 9
558	〃 11〃	Kaohsiungyu No. 11
559	〃 12〃	Kaohsiungyu No. 12
560	〃 13〃	Kaohsiungyu No. 13
561	〃 14〃	Kaohsiungyu No. 14
562	〃 18〃	Kaohsiungyu No. 18

品種代號 Code Number	品種名稱	Variety Name
563	高雄育 19號	Kaohsiungyu No. 19
564	〃 23〃	Kaohsiungyu No. 23
565	〃 37〃	Kaohsiungyu No. 37
566	〃 38〃	Kaohsiungyu No. 38
567	〃 39〃	Kaohsiungyu No. 39
568	〃 40〃	Kaohsiungyu No. 40
570	〃 41〃	Kaohsiungyu No. 41
572	〃 43〃	Kaohsiungyu No. 43
574	〃 44〃	Kaohsiungyu No. 44
576	〃 45〃	Kaohsiungyu No. 45
577	〃 46〃	Kaohsiungyu No. 46
578	〃 47〃	Kaohsiungyu No. 47
579	〃 48〃	Kaohsiungyu No. 48
580	〃 49〃	Kaohsiungyu No. 49
581	〃 50〃	Kaohsiungyu No. 50
582	〃 51〃	Kaohsiungyu No. 51
583	〃 52〃	Kaohsiungyu No. 52
602	臺 東 5號	Taitung No. 5
604	〃 13〃	Taitung No. 13
605	〃 16〃	Taitung No. 16
606	〃 17〃	Taitung No. 17
607	〃 24〃	Taitung No. 24
608	〃 33〃	Taitung No. 33
609	〃 35〃	Taitung No. 35
610	臺東育 3號	Taitungyu No. 3
611	〃 8〃	Taitungyu No. 8
612	〃 14〃	Taitungyu No. 14
613	〃 41〃	Taitungyu No. 41
614	〃 42〃	Taitungyu No. 42
615	〃 63〃	Taitungyu No. 63
616	〃 64〃	Taitungyu No. 64
617	〃 65〃	Taitungyu No. 65
618	〃 66〃	Taitungyu No. 66
619	〃 67〃	Taitungyu No. 67
620	〃 69〃	Taitungyu No. 69
621	〃 72〃	Taitungyu No. 72

品種代號 Code Number	品種名稱	Variety Name
622	臺東育 73號	Taitungyu No. 73
623	〃 74〃	Taitungyu No. 74
624	〃 75〃	Taitungyu No. 75
625	〃 76〃	Taitungyu No. 76
626	〃 77〃	Taitungyu No. 77
627	〃 78〃	Taitungyu No. 78
628	〃 79〃	Taitungyu No. 79
629	〃 80〃	Taitungyu No. 80
630	〃 81〃	Taitungyu No. 81
631	〃 82〃	Taitungyu No. 82
632	〃 83〃	Taitungyu No. 83
633	〃 84〃	Taitungyu No. 84
634	〃 85〃	Taitungyu No. 85
635	No. 4號	No. 4
636	吉野 1號變種	Yoshino No. 1 mutation
637	八 重 尾 種	Pa-chung-wei-ch'ung
638	臺 東 1號	Taitung No. 1
641	吉 野 1號	Yoshino No. 1
643	花蓮港 12號	Hualienkang No. 12
681	中農蓬 117號	Chungnungkang No. 11
682	〃 367〃	Chungnungkang No. 36
683	〃 376〃	Chungnungkang No. 37
684	〃 389〃	Chungnungkang No. 389
701	蓬 117A	P'eng 117A
702	〃 〃B	P'eng 117A P'eng 117B
703	〃 323A	P'eng 323A
704	〃 323B	P'eng 323A P'eng 323B
705	〃 344A	P'eng 344A
706	〃 344B	P'eng 344B
707	〃 367A	P'eng 367A
708	〃 367B	P'eng 367B
709	〃 376	P'eng 376
710	〃 377	P'eng 377
711	〃 388	P'eng 388
712	〃 389	P'eng 389
713	〃 387	P'eng 387

中國大陸引進稻(Mainland Chinese Varieties)

品種代號 Code Number	品種名稱	Variety Name
1001	一大川	I-ta-chuan
1002	一季谷	I-chi-ku
1003	一線紅	I-hsien-hung
1004	一時青	I-shih-ching
1005	一朝齊	I-cha'o-chi
1006	一朝齊	I-cha'o-chi
1007	七十天	Chi-shih-t'ien
1008	七十二天	Chi-shih-erh-t'ien
1009	八十子	Pa-shih-tzu
1010	八胆本	Pa-tan-pen
1011	八月白	Pa-yueh-pai
1012	八十早	Pa-shih-tsao
1013	八十早	Pa-shih-tsao
1014	九十早	Chiu-shih-tsao
1015	九公早	Chiu-kung-tsao
1016	十月冬軟枝	Shih-yueh-tung-juan-chih
1017	二等一時興	Erh-teng-i-shih-sing
1018	頭等一時興	T'ou-teng-i-shih-sing
1019	二發早	Erh-fa-tsao
1021	二毛香	Erh-mao-shiang
1022	上杭早尖	Shang-hang-tsao-chien
1023	上杭大冬	Shang-hang-ta-tung
1024	上高早	Shang-kao-tsao
1025	小薄殼	Hsiao-po-k'o
1026	小薄殼	Hsiao-po-k'o
1027	小白稻	Hsiao-pai-tao
1028	小白粘	Hsiao-pai-Chan
1029	小青谷	Hsiao-ching-ku
1030	小南粘	Hsiao-nan-chan
1031	小歸稻	Hsiao-kuei-tao
1032	小馬尾	Hsiao-ma-wei
1033	小毛番	Hsiao-mao-fan
1034	小尖顆	Hsiao-chien-k'o
1035	大穗	Ta-sui
1036	大粒	Ta-li
1037	大粒早	Ta-li tsao
1038	大白粘	Ta-pai-chan
1039	大白粘	Ta-pai-chan
1040	大白谷	Ta-pai-ku
1041	宜良大白谷	I-liang-ta-pai-ku
1042	宜良大白谷	I-liang-ta-pai-ku

品種代號 Code Number	品種名稱	Variety Name
1043	大白谷35號	Ta-pai-ku No. 5
1044	大蠻谷	Ta-man-ku
1045	大暑白	Ta-shu-pai
1046	大暑	Ta-shu
1047	大葉白	Ta-yeh-pai
1048	大葉孝	Ta-yeh-hsiao
1049	大剛粘	Ta-kang-chan
1050	大頭秈	Ta-t'ou-shien
1051	大毛香	Ta-mao-shiang
1052	大麻香	Ta-ma-shiang
1053	大三百顆	Ta-san-pai-k'o
1054	大埔插子	Ta-p'u-ch'a-tzu
1055	大倉太子秈	Ta-ts'ang-t'ai-tzu-shien
1056	三夜齊	San-yeh-ch'i
1057	三早齊	San-tsao-ch'i
1058	三朝齊 8號	San-cha'o-ch'i No. 8
1059	三百早	San-pai-tsao
1060	三百子谷	San-pai-tzu-ku
1061	三百粒14號	San-pai-li No. 14
1062	三元鐵早金	San-yuan-t'ieh-tsao-chin
1063	山頭早	Shan-t'ou-tsao
1064	山冒	Shan-mao
1065	下馬看	Hsia-ma-k'an
1066	六十早	Liu-shih-tsao
1067	六十早	Liu-shih-tsao
1068	六十早	Liu-shih-tsao
1069	六十日早	Liu-shih-jih-tsao
1070	六十日黃	Liu-shih-jih-huang
1071	六月西施谷	Liu-yueh-hsi-shih-ku
1072	五十早	Wu-shih-tsao
1073	五茸川早	Wu-jung-ch'uan-tsao
1074	中農玉粒早	Chung-nung-yu-li-tsao
1079	中黔 2號	Chung-ch'ien No. 2
1084	中秈 8號	Chung-shien No. 8
1085	中秈10號	Chung-shien No. 10
1086	中桂馬房秈	Chung-kuei-ma-fang-shien
1087	中大 345號	Chung-ta No. 345
1088	中 12—606	Chung-12-606
1089	中 41— 25	Chung-41-25
1090	中57—15	Chung-57-15
1091	中131—31	Chung-131-31

品種代號 Code Number	品種名稱	Variety Name
1092	中104—11	Chung-104-11
1093	中109—11	Chung-109-11
1094	中118—33	Chung-118-33
1095	中135—45	Chung-135-45
1096	中139—12	Chung-139-12
1097	中90—43	Chung-90-43
1099	中秋白	Chung-ch'iu-pai
1100	中稻	Chung-tao
1102	白水條(1)	Pai-shui-tiao (1)
1103	白水白條	Pai-shui-pai-tiao
1104	牛尾早	Niu-wei-tsao
1105	火稻	Huo-tao
1107	天生白	Tien-sheng-pai
1108	水稻線占	Shui-tao-hsien-chan
1109	丹陽香粳	Tan-yang-shiang-keng
1110	白早	Pai-tsao
1111	白早	Pai-tsao
1112	白37早稻	Pai-37-tsao-tao
1113	白米粘	Pai-mi-chan
1114	白粘3號	Pai-chan No. 3
1116	白脚粘	Pai-chueh-chan
1117	白脚粘	Pai-chueh-chan
1118	白谷(早稻)	Pai-ku
1119	白禾	Pai-ho
1120	白枝谷	Pai-chih-ku
1121	白孫谷	Pai-sun-ku
1122	白飯谷	Pai-fan-ku
1123	白錢谷	Pai-chien-ku
1124	白殼32號	Pai-k'o No. 32
1125	白殼 884號	Pai-k'o No. 884
1126	白殼占	Pai-k'o-chan
1127	白殼絲苗	Pai-k'o-szu-miao
1128	白殼絲苗7號	Pai-k'o-szu-miao No. 7
1129	白秈	Pai-shien
1130	白洋秈	Pai-yang-shien
1131	白節子	Pai-chieh-tzu
1132	白節子	Pai-chieh-tzu
1133	白殼小油粘	Pai-k'o-hsiao-yu-chan
1134	白河沙白谷	Pai-ho-sha-pai-ku
1135	白朝齊	Pai-cha'o-chi
1136	四十子	Szu-shih-tzu
1137	四季禾	Szu-chi-ho
1138	禾谷稻	Ho-ku-tao
1139	禾插4號	Ho-ch'a No. 4

品種代號 Code Number	品種名稱	Variety Name
1140	石粒粘	Shih-li-chan
1141	石印粘	Shih-yin-chan
1142	牙粘	Ya-chan
1143	占殼	Chan-k'o
1144	正粘殼	Cheng-chan-k'o
1145	仙遊粘	Hsien-yu-chan
1146	幼尖	Yu-chien
1147	早禾 4號	Tsao-ho No. 4
1148	早禾 4號	Tsao-ho No. 4
1149	廣西早禾1號	Kuang-hsi-tsao-ho No. 1
1150	早稻	Tsao-tao
1151	早稻26號	Tsao-tao No. 26
1152	早稻2065號	Tsao-tao-No. 2065
1153	早水稻	Tsao-shui-tao
1154	早日谷	Tsao-jih-ku
1155	早稻白谷	Tsao-tao-pai-ku
1156	早日禾	Tsao-jih-ho
1157	早白秈	Tsao-pai-shien
1158	早秈5575號	Tsao-shien No. 5575
1159	早谷秈	Tsao-ku-shien
1160	早秈谷	Tsian-shien-ku
1161	早刈秈	Tsao-i-shien
1162	早蘆秈	Tsao-lu-shien
1163	有芒早10日	Yu-mang-tsao-10-jih
1164	早矮子秈	Tsao-ai-tzu-shien
1166	早登齊	Tsao-teng-ch'i
1167	早水銀粘	Tsao-shui-yin-chan
1168	早嘴早稻	Tsao-tsui-tsao-tao
1170	早46—16	Tsao-46-16
1171	早66—13	Tsao-66-13
1172	早160—54	Tsao-160-54
1173	早20—72	Tsao-20-72
1174	早156—15	Tsao-156-15
1175	早157—56	Tsao-157-56
1177	汝城早稻	Ju-cheng-tsao-tao
1178	西鄉子早	Hsi-hsiang-tzu-tsao
1179	百日早 3號	Pai-jih-tsao No. 3
1180	永安冷水白	Yung-an-leng-shui-pai
1181	江西3613號	Chiang-hsi No. 3613
1183	竹粘殼	Chu-chan-k'o
1184	竹粘 1號	Chu-chan No. 1
1185	江粘47號	Chiang-chan No. 47
1186	永川沙刁子	Yung-ch'uan-sha-tiao-tzu
1187	江西晚	Chiang-hsi-wan

品種代號 Code Number	品種名稱	Variety Name
1188	瓜熟稻	Kwa-shu-tao
1189	老秈稻	Lao-shien-tao
1190	老來紅	Lao-lai-hung
1191	西洋粘	Hsi-yang-chan
1192	江寧洋稻	Chiang-ning-yang-tao
1193	吊犁忙	Tiao-li-mang
1194	舟角秈	Chou-chiao-shien
1195	宅谷	Chai-ku
1196	安徽稻	An-hui tao
1197	曲腰種	Ch'u-yao-ch'ung
1198	沙粘35號	Sha-chan No. 35
1199	沙粘70號	Sha-chan No. 70
1200	沙刁早	Sha-tiao-tsao
1201	杜子秈	Tu-tzu-shien
1202	杜尖稻	Tu-chien-tao
1203	快77晚稻	K'uai-77-wan-tao
1204	快80晚稻	K'uai-80-wan-tao
1205	快種黃尖	K'uai-ch'ung-huang-chien
1206	赤墺黃早	Ch'ih-yu-huang-tsao
1207	赤種	Ch'ih-ch'ung
1208	赤谷	Ch'ih-ku
1209	亂麻粘	Laun-ma-Chan
1210	杉木早谷	Shan-mu-tsao-ku
1211	谷兒子	Ku-erh-tzu
1212	芋田種	Yu-reng-t'ien-Ch'ung
1213	芒子晚	Mang-tzu-wan
1215	東莞白	Tong-kung-pai
1216	改良東莞白	Kai-liang-tong-kuan-pai
1217	東莞白18號	Tong-kuan-pai No. 18
1220	東莞油粘	Tong-kuan-yu-chan
1221	東莞綠苗	Ting-kuan-lu-miao
1222	東陽青	Tong-yang-ching
1223	東陽早	Tong-yang-tsao
1225	蘆晚秈	Lu-wan-shien
1226	蘆葛秈	Lu-ko-shien
1227	蘆花白	Lu-hua-pai
1228	蘆花白	Lu-hua-pai
1229	金秈	Chin-shien
1231	金磅粘	Chin-pang-chan
1232	金山粘18號	Chin-shan-chan No. 18
1233	金錢早	Chin-ch'ien-tsao
1234	金觀雪	Chin-kuan-hsueh
1235	泮野六十日黃	Pan-yeh-liu-shih-jih-huang

品種代號 Code Number	品種名稱	Variety Name
1236	泮野流岐早	Pan-yeh-liu-ch'i-tsao
1237	吳江早蘆秈	Wu-chiang-tsao-lu-shien
1239	長鬚谷	Chang-hsu-ku
1241	長谷早	Chang-ku-tsao
1242	長桿秈	Chang-kan-shien
1243	長柳光	Chang-liu-kuang
1244	長顆桂陽粘	Chang-k'o-kuei-yang-chan
1245	長粒子秈(1)	Chang-li-tzu-shien (1)
1246	長粒子秈(3)	Chang-li-tzu-shien (3)
1247	青定青	Ching-ting-ching
1248	青24早稻	Ching-24-tsao-tao
1249	青尖	Ching-chien
1250	青柳早日稻	Ching-liu-tsao-jih-tao
1251	青芒晚	Ching-mang-wan
1252	花羅粘	Hua-lo-chan
1253	花羅白	Hua-lo-pai
1254	花殼早種黃	Hua-k'o-tsao-ch'ung-huang
1255	花腰子	Hua-yao-tzu
1256	花秋谷	Hua-chiu-ku
1257	泗縣稻	Szu-hsien-tao
1258	泗縣稻(1)	Szu-hsien-tao (1)
1259	明溪清水早	Ming-hsi-ching-shui-tsao
1260	明溪冷水早	Ming-hsi-leng-shui-tsao
1261	明溪黃泥早	Ming-hsi-huang-ni-tsao
1262	河南早	Ho-nan-tsao
1263	宜豐早	I-feng-tsao
1264	英德油粘	Ying-te-yu-chan
1265	夜花粘	Yeh-hua-chan
1266	芥菜粘	Chieh-ts'ai-chan
1267	冒遂秈	Mao-sui-shien
1268	虎皮秈	Fu-p'i-shian
1269	宜興洋秈	I-hsing-yang-shien
1270	昆明節穀	K'un-ming-chieh-ku
1271	坡瑠2號	P'a-Liu No. 2
1272	抱山過	Pao-shan-kuo
1273	乳源白	Ju-yuan-pai
1275	南特號	Nan-t'e-hao
1276	南特16號	Nan-t'e No. 16
1277	南溪秈	Nan-hsi-shien
1278	南昌西穀	Nan-ch'ang-hsi-ku

品種代號 Code Number	品種名稱	Variety Name
1279	南京早	Nan-ching-tsao
1281	飛來鳳	Fei-lai-feng
1283	飛來粘	Fei-lai-chan
1284	飛天早	Fei-tien-tsao
1285	紅花螺	Hung-hua-lou
1286	紅嘴燕	Hung-tsui-yen
1287	紅殼秈	Hung-k'o-shien
1288	紅皮谷	Hung-p'i-ku
1289	紅殼慢	Hung-k'o-man
1290	紅脚粘	Hung-chueh-chan
1291	紅邊粘	Hung-pien-chan
1292	紅谷子	Hung-ku-tzu
1293	紅慣谷	Hung-kuan-ku
1294	紅脚蓮	Hung-chueh-lien
1295	紅飯谷	Hung-fan-ku
1296	紅蒲頭	Hung-p'u-t'ou
1297	紅毛蘇	Hung-mao-su
1298	洋尖	Yang-chien
1299	川大洋尖	Chuan-ta-yang-chien
1300	洋尖顆	Yang-chien-k'o
1301	洋秈(1)	Yang-shien (1)
1302	洋秈(3)	Yang-shien (3)
1303	洋谷子202	Yang-ku-tzu 202
1304	亮油洋稻	Liang-yu-yang-tao
1305	洋秈稻	Yang-shien-tao
1306	洋桃谷	Yang-t'ao-ku
1307	香山河山	Shiang-Shan-ho-shan
1308	香白墟	Shiang-pai-hsu
1310	香谷	Shiang-ku
1311	香根粘谷	Shiang-ken-chan-ku
1312	香蘆黃	Shiang-lu-huang
1313	秋風早	Chiu-feng-tsao
1314	秋牧蒿	Chiu-mu-hao
1315	秋鬚子	Chiu-hsu-tzu
1316	信州金子	Hsin-chou-chin-tzu
1317	信豐早	Hsin-feng-tsao
1318	胡家早	Hu-chia-tsao
1319	風屋谷	Feng-wu-ku
1320	响殼谷	Hsiang-k'o-ku
1321	急性黃	Chi-hsing-huang
1322	豹子冲秈	Pao-tzu-ch'ung-shien
1324	保靖麻谷	Pao-ching-ma-ku
1325	浙場5441號	Che-ch'ang No. 5441
1327	浙場3號	Che-ch'ang No. 3

品種代號 Code Number	品種名稱	Variety Name
1328	浙場9號	Che-chang No. 9
1329	浙場中秈1號	Che-ch'ang-chung-shien No. 1
1331	浙大 676	Che-ta 676
1332	涿州稻	Cho-chou-tao
1333	蒲城烏谷白	P'u-cheng-wu-ku-pai
1334	蒲城清流早	P'u-cheng-ching-liu-tsao
1335	連江密早谷	Lien-chiang-mi-tsao-ku
1336	連粘73號	Lien-chan No. 73
1337	連粘50號	Lien-chan No. 50
1338	連城細谷	Lien-cheng-hsi-ku
1339	連城沙布粘	Lien-cheng-sha-pu-chan
1340	連城白桿禾苗	Lien-cheng-pai-kan-ho-miao
1341	連城小早	Lien-cheng-hsiao-tsao
1342	連城赤早	Lien-cheng-ch'ih-tsao
1343	烏殼粘	Wu-k'o-chan
1344	烏殼占	Wu-k'o-chan
1345	烏篤粘	Wu-tu-chan
1346	烏谷	Wu-ku
1347	烏殼大秈	Wu-k'o-ta-shien
1348	烏黎	Wu-li
1349	特白早稻	T'e-pai-tsao-tao
1350	特白香谷	T'e-pai-shiang-ku
1351	除聞曲界谷	Ch'u-wen-ch'u-chieh-ku
1352	珠早	Chu-tsao
1353	泉水穀	Ch'uan-shui-ku
1354	海洋大粘	Hai-yang-ta-chan
1355	海陽黎粘	Hai-yang-li-chan
1356	陸稻	Lu-tao
1357	陸稻3065	Lu-tao 3065
1358	馬來本(1)	Ma-lai-pen (1)
1359	馬來本(2)	Ma-lai-pen (2)
1360	馬壩粘1號	Ma-Pa-chan No. 1
1361	馬剛白	Ma-kang-pai
1364	都江玉	Tu-chiang-yu
1365	浮面粘	Fu-mien-chan
1366	桂花園	kuei-hua-yuan
1367	草連長	Ts'ao-lien-chang
1368	草果皮谷	Ts'ao-kuo-p'i-ku
1370	雀不知	Ch'iao-pu-chih
1371	晒日谷	Shai-jih-ku
1372	凍米占	Tung-mi-chan

品種代號 Code Number	品 種 名 稱 Variety Name	
1373	桐 蘆 秈	T'ung-lu-shien
1374	黑督 4 號	Hei-tu No. 4
1375	黑督 4 號	Hei-tu No. 4
1377	黑 節 早	Hei-chieh-tsao
1378	黑 占	Hei-chan
1379	黑 谷	Hei-ku
1380	帽 子 頭	Mao-tzu-t'ou
1381	粒 谷 早	Li-ku-tsao
1382	細 粒 谷	Hse-li-ku
1383	細 粒 穀	Hse-li-ku
1384	細 白 谷	Hse-pai-ku
1385	細粒早稻	Hse-li-tsao-tao
1386	細 葉 青	Hse-yeh-ching
1387	細稈洋尖	Hse-kan-yang-chien
1388	雪 花 粘	Hsueh-hua-chan
1389	雲 花 粘	Yun-hua-chan
1390	雪 南 粘	Hsueh-nan-chan
1391	麻 谷	Ma-ku
1392	麻 麻 谷	Ma-ma-ku
1393	麻 吊 谷	Ma-tiao-ku
1394	麻 谷 子	Ma-ku-tzu
1395	高 麻 谷	Kao-ma-ku
1396	麻 線	Ma-hsien
1397	鈎魚蘭（白莖）	Tiao-yu-lan (white stem)
1398	鈎魚蘭（紅莖）	Tiao-yu-lan (Red stem)
1399	惡打粘 1 號	O-ta-chan No. 1
1400	崑山香梗	K'un-shan-shiang-keng
1401	進 賢 早	Chin-hsien-tsao
1402	埠頭大仔	Pu-t'ou-ta-tzu
1403	魚 鱗 粘	Yu-lin-chan
1404	惟 子 秈	Wei-tzu-shien
1405	唯 亭 秈	Wei-t'ing-shien
1406	淮 北 秈	Huai-pei-shien
1407	高脚九黃禾	Kao-chueh-chiu-huang-ho
1408	麥 葉 白	Mai-yeh-pai
1409	高 山 白	Kao-shan-pai
1410	寄 生 稻	Chi-sheng-tsao
1411	淸廉早季谷	Ching-lien-tsao-chi-ku
1412	勝 利 秈	Sheng-li-shien
1414	富 綿 黃	Fu-mien-huang
1416	湖 南 早	Hu-nan-tsao
1417	湖 南 早	Hu-nan-tsao

品種代號 Code Number	品 種 名 稱 Variety Name	
1418	湖 南 秈	Hu-nan-shien
1419	全著湖南粘	Ch'uan-chu-hu-nan-chan
1420	湖廣早11號	Hu-kuang-tsao No. 11
1421	湖 稻	Hu-tao
1422	湖南岳州種	Hu-nan-yueh-chou-ch'ung
1423	湘 潭 占	Hsiang-t'un-chan
1424	黃 桑 穀	Huang-sang-ku
1425	黃 占 穀	Huang-chan-ku
1426	黃 粘 穀	Huang-chan-ku
1427	黃尖（晚稻）	Huang-chien
1429	黃 殼 秈	Huang-k'o-shien
1430	黃 稈 秈	Huang-kan-shien
1431	黃 貝 秈	Huang-chu-shien
1432	黃 金 秈	Huang-chin-shien
1433	黃 秈	Huang-shien
1435	黃 岩 早	Huang-yen-tsao
1436	晚 稻	Wan-tao
1437	晚 稻	Wan-tao
1438	晚 粳 稻	Wn-keng-tao
1439	晚 野 稻	Wan-yeh-tao
1440	晚54—33	Wan 54-33
1441	6144晚秈	6144 wan-shien
1442	10509晚粳	10509-wan-keng
1443	129晚粳	129-wan-keng
1444	晚 白 米	Wan-pai-mi
1445	硬 稈 占	Keng-kan-chan
1446	硬 槓 占	Keng-kang-chan
1447	陽春竹粘	Yang-ch'un-chu-chan
1448	犁 陽 粘	Li-yang-chan
1449	揹 子 谷	Pei-Tzu-ku
1450	絲 荀 一	Szu-hsun-i
1452	等 色 齊	Teng-se-ch'i
1453	等 昭 齊	Teng-chao-ch'i
1454	等 等 齊	Teng-teng-ch'i
1455	楊 西 稻	Yang-hsi-tao
1456	雲 南 白	Yun-nan-pai
1457	紫 葉 粘	Tzu-yeh-chan
1458	萌 幹 白	Meng-kan-pai
1459	番粘 2 號	Fan-chan No. 2
1460	滁州無芒稻	Ch'u-chou-wu-mang-tao
1462	筠 連 粘	Yun-lien-chan
1463	新疆早稻	Hsin-chiang-tsao-tao
1465	新興白 9 號	Hsin-sing-pai No. 9

品種代號 Code Number	品 種 名 稱 Variety Name	
1466	新 興 白	Hsin-hsing-pai
1467	新興白谷	Hsin-sing-pai-ku
1469	紫 金 穀	Tzu-chin-ku
1470	禁 風 雪	Chin-feng-hsueh
1472	萬 利 秈	Wan-li-shien
1473	鼠 牙 粘	Shu-ya-chan
1474	鼠牙粘顆	Shu-ya-chan-k'o
1475	鐵 桿 盧	T'ieh-kan-lu
1476	鐵 板 梲	T'ieh-pan-ch'en
1477	閩淸鐵鍊早	Min-ching-t'ieh-lien-tsao
1478	矮脚大白谷	Ai-chueh-ta-pai-ku
1479	矮 脚 俚	Ai-chueh-li
1480	矮 仔	Ai-tzu
1481	矮 莖 仔	Ai-ching-tzu
1482	矮仔僕 2 號	Ai-tzu-p'u No. 2
1483	閩侯早朮	Min-hou-tsao-chu
1485	滇農 3 號	Tien-nung No. 3
1486	搶 上 黃	Ch'iang-shang-huang
1487	惹 葉 粘	Je-yeh-chan
1488	葉 下 藏	Yeh-thsia-tsang
1489	發 酉 稻	Fa-yu-tao
1490	全著楊稻	Ch'uan-chu-yang-tao
1491	閩淸白殼赤	Min-ching-pai-k'o-ch'ih
1492	歷城鐵耙子	Li-cheng-tieh-p'a-tzu
1493	福州大早(早稻)	Fu-chou-ta-tsao
1494	福淸早稻	Fu-ching-tsao-tao
1495	遲雪蘭白	Chih-hsueh-lan-pai
1496	遲江毛蘇	Ch'ih-chiang-mao-su
1497	鳳毛蘇	Feng-mao-su
1498	團谷草	T'uan-ku-tsao
1499	團稻白	T'uan-tao-pai
1500	全著團稻白	Ch'uan-chu-t'uan-tao-pai
1501	團頭子	T'uan-t'ou-tzu
1502	寧洋粳	Ning-yang-keng
1503	增城綠苗	Tseng-cheng-lu-miao
1504	銀包金	Yin-pao-chin
1505	A2391畬禾(早稻)	A 2391-Hsieh-ho
1506	蓋花蘭	Kai-hua-lan
1507	密葉粘	Mi-yeh-chan
1508	嘉應早31號	Chia-ying-tsao-No. 31
1509	鄱陽早	P'o-Yang-tsao
1510	銹色粘	Hsiu-se-chan

品種代號 Code Number	品 種 名 稱 Variety Name	
1511	齊 眉	Chi-mei
1512	齊眉 6 號	Chi-mei No. 6
1513	蚧蛇秈	Chieh-she-shien
1514	墊倉白	Tien-ts'ang-pai
1515	靠三黃	K'ao-san-huang
1516	靠八石	K'ao-pa-shih
1517	諸暨早	Chu-chi-tsao
1518	諸暨晚	Chu-chi-wan
1519	黔農 2 號	Ch'ien-nung No. 2
1520	黔純2363號	Ch'ien-chun No. 2363
1521	撫州早	Fu-chou-tsao
1522	賓陽早	Pin-yang-tsao
5231	蝦子粘	Hsia-tzu-chan
1524	漲水稻	Chang-shui-tao
1525	絲衣秈	Szu-i-shien
1526	頭絨谷	T'ou-jung-ku
1527	選占	Hsuan-chan
1528	493鴨兒禾	S493-ya-erh-ho
1529	輿黃早	Yu-huang-tsao
1530	鴛鴦谷	Yuen-yang-ku
1531	雲芒稻	Yun-mang-tao
1532	燕嘴紅	Yen-tsui-hung
1533	螃蟹爪	P'ang-hsieh-cha'o
1534	優生占	Yu-sheng-chan
1535	龍安霜降白	Lung-an-shuang-chiang-pai
1536	龍陽占	Lung-yang-chan
1537	龍牙占	Lung-ya-chan
1538	龍喉白	Lung-hou-pai
1539	氈帽頭	Chan-mao-t'ou
1540	謝稻	Hsieh-tao
1541	潘陽秈	Pan-yang-shian
1542	瀏和八尺秈	Liu-ho-pa-ch'ih-shien
1543	雞油粘	Chi-yu-chan
1545	羅粘 4 號	Lo-chan No. 4
1546	鎖匙種	So-chih-ch'ung
1547	雙流香谷	Shuang-liu-shiang-ku
1548	蘇州340	Su-chou-340
1549	蘭香稻	Lan-shiang-tao
1550	蘭江白	Lan-chiang-pai
1551	蘭溪白	Lan-hsi-pai
1552	纖纖谷	Hsien-hsien-ku
1553	襯石早	Ch'en-shih-tsao
1554	鶴上暗早	Ho-shang-an-tsao

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
1555	鶴上快車	Ho-shang-k'uai-ch'e
1556	露白秈	Lu-pai-shien
1557	鬚鬚谷	Hsu-hsu-ku
1558	觀音粘16號	Kuan-yin-chan No. 16
1559	觀音粘18號	Kuan-yin-chan No. 18
1560	觀音粘	Kuan-yin-chan
1616	三十子	San-shih-tzu
1617	八月黃	Pa-yueh-huang
1618	七月紅	Chi-yueh-hung
1619	七月谷	Chi-yueh-ku
1620	二江早8號	Erh-chiang-tsao No. 8
1621	女兒子	Nu-erh-tzu
1622	大葉躝干	Ta-yeh-lan-kan
1623	小白谷	Hsiao-pai-ku
1624	永安分龍早	Yung-an-fen-lung-tsao
1625	牛粘谷	Niu-chan-ku
1626	中湘33—1號	Chung-hsiang-33-1
1627	甘米	Kan-mi
1629	白殼紅米谷	Pai-k'o-hung-mi-ku
1630	出頭長	Ch'u-t'ou-chang
1631	早152—46	Tsao-152-46
1632	早山背	Tsao-shan-pei
1634	早油粘	Tsao-yu-chan
1635	早9—57	Tsao-9-57
1636	早白	Tsao-pai
1637	早大秈紅米	Tsao-ta-shian-hung-mi
1638	吉安早	Chi-an-tsao
1639	西林二	Hsi-lin-erh
1640	冰島藍粘	Ping-tao-lan-chan
1641	百日冬占	Pai-jih-tung-chan
1642	曲靖小紅桌	Ch'u-ching-hsiao-hung-cho
1643	芝蔴秈	Chih-ma-shien
1644	李子紅	Li-tzu-hung
1645	金秈	Chin-shien
1656	洋稻	Yang-tao
1657	馬尾粘	Ma-wei-chan
1658	黑杜早	Hei-tu-tsao
1659	崑山五香粳	K'uu-shan-wu-shiang-keng
1660	陸稻3036	Lu-tao 3036
1661	烏督谷	Wu-tu-ku
1662	進賢粳	Chin-hsien-keng
1663	黃色谷	Huang-se-ku

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
1664	黃楷秈	Huang-k'ai-shien
1665	鐵粳青	T'ieh-keng-ching
1666	鐵槌殼	T'ieh-ch'ui-ko
1667	茶稻	Ch'a-tao
1668	銀魚子	Yin-yu-tzu
1669	豐城早	Feng-cheng-tsao
1670	矮脚花秋	Ai-chueh-hua-chiu
1671	寧夏小稻	Ning-hsia-hsiao-tao
1672	畲禾	She-ho
1673	寶應秈	Pao-ying-shien
1674	嶺禾	Ling-ho
1675	雞爪秈	Chi-chao-shien
1676	0516	
1677	99219	
1678	99220	
1679	91399	
1680	99216	
1681	G124	
1682	T21	
1683	Randhanipagal-Seented	
1684	Latisail	
1686	Badshabbag-Seented	
1687	Basu-mathod	
1689	Wild-pally	
1691	M.T.V. 10	
1692	833-5691-11	
1693	D. S. wied	
1695	833-5691-11	
1696	26 III-422	
1697	27III-1051	
1698	26III-303	
1699	N-27-976	
1700	III-16-345	
1701	7094-A	
1703	Kolamba-184	
1704	T. 136	
1705	N. 22	
1706	T. 1	
1707	T. 43	
1708	Jinya-31	
1709	Holamba-540	
1710	A. 64	
1711	A. uja-na-pilil-hit	
1712	Jinya-149	

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
1713	T. 22-A	
1801	帽子頭	Mao-tzu-t'ou
1802	烏脚占A	Wu-chueh-chan-A
1803	花羅白	Hua-lo-pai
1805	沙刁早	Sha-tiao-tsao
1806	涿州稻	Cho-chou-tao
1807	馬祖黃尖稻	Ma-tsu-huang-chien-tao
1808	金門斗門白米	Chin-men-tou-men-pai-mi
1809	金門斗門烏暨	Chin-men-tou-men-wu chi
1810	金門斗門紅米	Chin-men-tou-men-hung-mi
1813	觀音粘16號	Kuan-yin-chan No. 16
1814	中農玉粒早	Chung-nung-yu-li-tsao
1815	中黔28號	Chung-chien No. 28
1816	富綿黃（紅莖）	Fu-mien-huang
1817	水白條	Shui-pai-tiao
1818	東莞白18號	Tong-kuan-pai No. 18
1819	B-13	B-13
1820	早禾4號	Tsao-ho No. 4
1821	浙場5441號	Che-ch'ang No. 5441
1822	中農34號	Chung-nung No. 34
1823	萬利秈	Wan-li-shien
1824	中農4號	Chung-nung No.4
1825	江西3613號	Ch'ang-hsi No. 3613
1826	宜良大白谷	I-liang-ta-pai-ku
1827	中秈1號	Chung-shien No.1
1828	中大345號	Chung-ta No. 345
1830	白殼小油尖	Pai-k'o-hsiao-yu-chien
1831	白殼小油尖	Pai-k'o-hsiao-yu-chien
1832	龍南霜降白	Lung-nan-shuang-chiang-pai
1835	黔農55號	Ch'ien-nung No. 55
1836	百日冬粘	Pai-jih-tung chan
1837	烏脚占A	Wu-chueh-chan-A
1839	晚野稻	Wan-yeh-tao
1840	洋稻 (B)	Yang-tao (B)
1841	黑占	Hei-chan
1843	紅粘	Hung-chan
1844	鐵板粘	Tieh-pan-chan
1845	紅貫谷	Hung-kuan-ku
1846	烏粘稻	Wu-chan-tao
1849	紅殼慢	Hung-k'o-man

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
1850	爛頭粘	Lan-t'ou-chan
1851	羅江黃	Lo-chiang-huang
1854	99216	99216
1855	晚54—33號	Wan-54-33
1856	閩候早稻	Min-hou-tsao-tao
1857	醉樂谷	Tsui-lo-ku
1858	蘇州340號	Su-chou No. 340
1859	下脚柳州	Hsia-chueh-liu-chou
1860	福清溫州	Fu-ching-wen-chou
1861	全著百日早	Ch'uan-chu-pai-jih-tsao
1862	全著大葉早	Ch'uan-chu-ta-yeh-tsao
1863	全著分龍早	Ch'uan-chu-fen-lung-tsao
1864	全著三百早	Ch'uan-chu-san-pai-tsao
1865	全著鬚鬚粘	Ch'uan-chu-hsu-hsu-chan
1866	連城大管白	Lien-chen-ta-kuan-pai
1867	永安冷水白	Yun-an-leng-shui-pai
1868	永安晚谷	Yung-an-wan-ku
1869	永安遭遠秈禾	Yuan-an-tsao-yuan-shien-ho
1870	青粘	Ching-chan
1871	林森快占	Lin-sen-k'uai-chan
1872	林森半快占	Lin-sen-pan-kuai-chan
1873	莆田一粒占	P'u-tien-i-li-chan
1874	仙遊南本	Hsien-yu-nan-pen
1875	甘米	Kan-mi
1876	閩候烏梨	Min-hou-wu-li
1877	邵武尾家開先白	Shao-wu-wei-chia-k'ai-hsien-pai

臺灣在來稻

(Taiwan Native Varieties)

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
2001	二花	Erh-hua
2003	大花 (臺中)	Ta-hua (Taichung)
2004	紅脚赤殼大花 (農試)	Hung-chueh-ch'ih-ku-ta-hua (Nungshih)
2005	紅脚赤殼大花 (臺中)	Hung-chueh-ch'ih-ku-ta-hua (Taichung)
2007	早大花 (農試)	Tsao-ta-hua (Nungshih)
2003	早大花 (臺中)	Tsao-ta-hua (Taichung)
2010	小姑秈	Sheau-ku-shien
2011	九十日	Chiu-shih-jih
2012	五脚齊 (臺中)	Wu-chueh-ch'i (Taichung)
2013	五脚齊 (臺中)	Wu-chueh-ch'i (Taichung)
2015	朮仔莤 (臺中)	Chu-tzu-chiu(Taichung)
2016	朮仔莤 (臺中)	Chu-tzu-chiu(Taichung)
2017	朮仔變 (臺中)	Chu-tzu-pien(Taichung)
2018	朮仔變 (臺中)	Chu-tzu-pien(Taichung)
2019	朮變	Chu-pien
2020	半天 (臺中)	Pan-tien (Taichung)
2023	半天仔 (臺中)	Pan-tien-tzu (Taichung)
2024	半天仔 (臺中)	Pan-tien-tzu (Taichung)
2027	田賦種	T'ien-fu-ch'ung
2028	打鐵崙	Ta-t'ieh-lun
2030	白米粉 (臺北)	Pai-mi-fen (Taipei)
2038	白米粉 (農試)	Pai-mi-fen (Nungshih)
2039	白米粉 (花蓮)	Pai-mi-fen (Hualien)
2042	白葉 (高雄)	Pai-yeh (Kaohsiung)
2044	白葉 (高雄)	Pai-yeh (Kaohsiung)
2045	白殼 (羅東)	Pai-k'o (Lotung)
2048	白殼仔 (臺中)	Pai-k'o-tzu (Taichung)
2051	白殼早仔	Pai-k'o-tsao-tzu
2053	白殼莤 (臺中)	Pai-k'o-chiu (Taichung)
2055	白殼莤 (臺中)	Pai-k'o-chiu (Taichung)
2057	白殼莤 (臺中)	Pai-k'o-chiu (Taichung)
2058	六五莤	Liu-wu-chiu
2059	赤殼莤	Ch'ih-k'o-chiu
2061	白殼耳	Pai-k'o-erh
2062	白米耳	Pai-mi-erh
2063	白米眼	Pai-mi-yen

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
2064	白米靭	Pai-mi-jen
2065	白尾葱	Pai-wei-ch'ung
2066	白骨仔	Pai-ku-tzu
2067	幼葉白占	Yu-yeh-pai-chan
2068	竹絲	Chu-shih
2069	自生	Tzu-sheng
2070	自由	Tzu-yu
2071	赤殼 (嘉義)	Ch'ih-k'o (Chiai)
2072	赤殼 (臺中)	Ch'ih-k'o (Taichung)
2074	亞崙	Ya-Lun
2075	尾張	Wei-chang
2077	花螺 (臺北雙溪)	Hua-lou (Taipei, Shungch'i)
2085	花螺 (農試)	Hua-lou (Nungshih)
2037	短廣花螺 (頭城)	Tuan-kung-hua-lou (Toucheng)
2090	短廣花螺 (農試)	Tuan-kung-hua-lou (Nungshih)
2093	短廣	Tuan-kung
2095	高脚花螺 (臺東)	Kao-chueh-hua-lou (Taitung)
2102	低脚花螺 (新竹)	Ti-chueh-hua-lou (Hsinchu)
2106	下脚花螺	Hsia-chueh-hua-lou
2109	烏殼花螺 (農試)	Wu-k'o-hua-lou (Nungshih)
2110	低脚烏殼花螺	Ti-chueh-wu-k'o-hua-lou
2111	白殼花螺 (頭城)	Pai-k'o-hua-lou (Toucheng)
2112	白殼花螺 (新竹)	Pai-k'o-hua-lou (Hsinchu)
2114	硬尾花螺	Ying-wei-hua-lou
2115	硬尾	Ying-wei
2117	紅皮花螺	Hung-p'i-hua-lou
2118	低脚仔種	Ti-chueh-tzu-ch'ung
2119	花肚 (新竹)	Hua-tu (Hsinchu)
2120	花肚 (農試)	Hua-tu (Nungshih)
2121	花殼	Hua-k'o
2122	尾張	Wei-chang
2123	金精 (臺中)	Chin-ching (Taichung)
2124	金精 (臺中)	Chin-ching (Taichung)
2125	金包銀	Chin-pao-yin
2127	阿崙種 (羅東)	A-lun-ch'ung (Lotung)

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
2123	阿猴嬌	A-hou-chiao
2129	虎皮花 (高雄)	Fu-p'i-hua (kaohsiung)
2131	兩期早	Lian-ch'i-tsao
2132	柳州 (臺東)	Liu-chou (Taitung)
2134	柳州 (臺東)	Liu-chou (Taitung)
2135	柳州 (農試)	Liu-chou (Nungshih)
2137	柳州 (農試)	Liu-chou (Nungshih)
2139	高脚柳州 (臺北)	Kao-chueh-liu-chou (Taipei)
2141	高脚柳州	Kao-chueh-liu-chou
2142	高脚柳州	Kao-chueh-liu-chou
2143	半高矮柳州	P'an-kao-ai-liu-chou
2144	低脚柳州	Ti-chueh-liu-chou
2147	矮脚柳州	Ai-chueh-liu-chou
2151	下脚柳州	Hsia-chueh-liu-chou
2152	烏殼柳州	Wu-k'o-liu-chou
2153	烏殼柳州	Wu-k'o-liu-chou
2154	細藁柳州	Hsi-kao-liu-chou
2155	柳頭仔	Liu-tou-tzu
2157	柱占	Chu-chan
2158	紅石	Hung-shih
2160	南仔仙	Nan-tzu-shien
2161	南路草	Nan-lu-tsao
2162	青心仔	Ching-hsin-tzu
2164	青心仔	Ching-hsin-tzu
2165	草鷲犁	Ts'ao-ching-li
2166	員粒	Yuan-li
2167	白殼員粒	Pai-k'o-yuan-li
2168	萬粒員粒	Wan-li-yuan-li
2169	紅鬚格仔	Hung-hsu-ko-tzu
2170	紅鬚格仔	Hung-hsu-ko-tzu
2171	格仔	Ko-tzu
2172	通興	T'ung-hsing
2173	白殼埔占	Pai-k'o-pu-chan
2174	大烏	Ta-wu
2175	大烏殼	Ta-wu-k'o
2176	中烏殼	Chung-wu-k'o
2178	小烏殼	Hsiao-wu-k'o
2179	小烏殼	Hsiao-wu-k'o
2180	高脚烏殼	Kao-chueh-wu-k'o
2181	低脚烏殼	Ti-chueh-wu-k'o
2184	白葉烏殼	Pai-yeh-wu-k'o
2186	白葉烏殼	Pai-yeh-wu-k'o
2189	紅脚烏殼	Hung-chueh-wu-k'o

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
2191	烏殼仔	Wu-k'o-tzu
2195	烏殼	Wu-k'o
2198	烏殼	Wu-k'o
2202	烏殼	Wu-k'o
2204	烏尖	Wu-chien
2208	烏尖	Wu-chien
2209	烏尖	Wu-chien
2211	烏尖 2 號	Wu-chien No. 2
2212	低脚烏尖	Ti-chueh-wu-chien
2213	低脚烏尖	Ti-chueh-wu-chien
2215	下脚烏尖	Hsia-chueh-wu-chien
2216	鵝卵尖	O-loan-chien
2217	長尾尖	Chang-wei-chien
2218	生尾尖	Sheng-wei-chien
2221	烏占	Wu-chan
2223	高脚烏占	Kao-chueh-wu-chan
2224	下脚烏占	Hsia-chueh-wu-chan
2225	火燒仔烏占	Huo-shao-tzu-wu-chan
2226	火燒仔烏占	Huo-shao-tzu-wu-chan
2227	烏秥	Wu-chan
2229	正烏秥	Cheng-wu-chan
2231	低脚烏秥	Ti-chueh-wu-chan
2233	高脚烏秥	Kao-chueh-wu-chan
2237	紅脚烏秥	Hung-chueh-wu-chan
2239	黃脚烏秥	Huang-chueh-wu-chan
2240	黃殼烏秥	Huang-ko-wu-chan
2241	軟枝烏秥	Juan-chih-wu-chan
2243	火燒烏秥	Huo-shao-wu-chan
2244	半高矮烏秥	Pan-kao-ai-wu-chan
2245	銀粒	Yin-li
2247	烏粒	Wu-li
2248	烏粒	Wu-li
2253	烏油	Wu-yu
2254	烏擔	Wu-tan
2255	烏種	Wu-ch'ung
2256	烏種	Wu-ch'ung
2258	烏毛種	Wu-mao-ch'ung
2261	烏殼軟枝	Wu-k'o-juan-chih
2262	白殼軟枝	Pai-k'o-juan-chih
2266	正清油	Cheng-ching-yu
2267	大粒清油	Ta-li-ching-yu
2269	白殼清油	Pai-k'o-ching-yu
2270	白殼清油	Pai-k'o-ching-yu
2274	烏殼清油	Wu-k'o-ching-yu

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
2276	烏殼清油	Wu-k'o-ching-yu
2280	矮脚清油	Ai-chueh-ching-yu
2281	密粒清油	Mi-li-ching-yu
2282	新桃園清油	Hsin-t'ao-yuan-ching-yu
2283	清油	Ching-yu
2284	清油	Ching-yu
2287	清油	Ching-yu
2288	清油	Ching-yu
2292	清油	Ching-yu
2294	青脚清油	Ching-chueh-ching-yu
2295	青脚清油	Ching-chueh-ching-yu
2296	清流	Ching-liu
2297	紅脚清流	Hung-chueh-Ching-liu
2298	接花	Chieh-hua
2299	接花種	Chieh-hua-ch'ung
2300	菜園種	Ts'ai-yuan-ch'ung
2301	球尾仔	Ch'iu-wei-tzu
2302	軟仔	Juan-tzu
2303	麥仔粒	Mai-tzu-li
2306	桃園硬尾	T'ao-yuan-ying-wei
2308	葫蘆墩	Hu-lu-tun
2309	琉球早	Liu-ch'iu-tsao
2310	菁菓占	Ching-kuo-chan
2311	矮仔種	Ai-tzu-ch'ung
2312	矮脚爐	Ai-chueh-lu
2313	烏脚矮脚爐	Wu-chueh-ai-chueh-lu
2314	新支早造田基慶	Hsin-chih-sao-sao-tien-chi-ch'ing
2316	榴槌	Ra-ch'ui
2318	短桿暹羅	Tuan-kan-hsieh-lo
2319	一期作霜降	I-chi-tso-shuang-chiang
2322	蟻公包	I-kung-pao
2326	臺中在來1號	T'ai-chung-Native No. 1
2330	嘉義八月占	Chia-i-pa-yueh-Chan
2331	臺東雙冬種	T'ai-tung-shung-tung-ch'ung
2332	高雄烏殼早	Kao-hsiung-wu-k'o-tsao
2333	新竹宜蘭種	Hsin-chu-i-lan-ch'ung
2334	嘉義宜蘭	Chia-i-i-lan
2335	新竹柳占	Hsin-chu-liu-chan
2336	高雄柳占	Kao-hsiung-liu-chan
2338	臺北白殼格	T'ai-pei-pai-k'o-ko
2341	嘉義烏殼清油	Chia-i-wu-k'o-ching-yu
2342	臺南歸仁烏殼清油	T'ai-nan-kuei-jen-wu-k'o-ching-yu
2343	高雄烏殼清油	Kao-hsiung-wu-k'o-ching-yu
2344	高雄密粒清油	Kao-hsiung-mi-li-ching-yu
2347	臺北葫蘆墩	T'ai-pei-hu-lu-tun
2348	羅東亞崙	Lo-tung-ya-lun
2349	嘉義烏殼	Chia-i-wu-k'o
2351	臺東烏擔	T'ai-tung-wu-tan
2352	宜蘭長尾尖	I-lan-chang-wei-chien
2353	宜蘭白殼軟枝	I-lan-pai-k'o-juan-chih
2354	臺中紅米舊	T'ai-chung-hung-mi-chiu
2359	臺中半天白	T'ai-chung-pan-t'ien-pai
2360	臺中紅米仔	T'ai-chung-hung-mi-tzu
2363	嘉義白葉	Chia-i-pai-yeh
2364	低脚菊仔	Ti-chueh-chu-tzu
2365	在 (8)	Tsai (8)
2366	在 (31)	Tsai (31)
2367	在 (97)	Tsai (97)
2368	在 (98)	Tsai (98)
2369	在 (99)	Tsai (99)
2370	在 (145)	Tsai (145)
2371	在 (94)	Tsai (94)
2373	清油	Ching-yu
2374	清流	Ching-liu
2375	白殼	Pai-k'o
2382	嘉義烏占	Chia-i-wu-chan
2383	臺東大麻里烏占	T'ai-tung-ta-ma-li-wu-chan
2501	刀子	Tao-tzu
2502	八月占	Pa-yueh-chan
2503	三杯	San-pei
2505	三杯	San-pei
2506	三杯	San-pei
2507	三杯	San-pei
2508	晚三杯	Wan-san-pei
2509	晚三杯	Wan-san-pei
2510	大粒三杯	Ta-li-san-pei
2512	三貂	San-tiao
2513	下脚岸	Hsia-chueh-an
2514	天來	Tien-lai
2515	天來	Tien-lai
2516	天來	Tien-lai

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
2517	朮變	Chu-pien
2518	朮變	Chu-pien
2522	朮舊	Chu-chiu
2523	朮舊	Chu-chiu
2525	白殼	Pai-k'o
2526	白殼晚	Pai-k'o-wan
2527	白殼大冬	Pai-k'o-ta-tung
2528	白肚引	Pai-tu-yin
2529	白占	Pai-chan
2530	水蛋	Shui-tan
2531	水蛋	Shui-tan
2533	水浪	Shui-lang
2534	水柳	Shui-liu
2536	水浸種	Shui-chin-ch'ung
2537	粗葉白占	Ts'u-yeh-pai-chan
2538	紅葉白占	Hung-yeh-pai-chan
2539	允仔谷	Yun-tzu-ku
2540	四十日冬	Szu-shih-jih-tung
2541	尼婆朗	Ni-p'o-lang
2542	江目	Chiang-mu
2543	雙冬種	Shuang-tung-ch'ung
2544	花螺	Hua-lou
2545	臺南大白	T'ai-nan-ta-pai
2547	白殼金仔	Pai-k'o-chin-tzu
2548	金獅	Chin-shih
2549	白殼金獅	Pai-k'o-chin-shih
2550	白米金猴	Pai-mi-chin-hou
2551	冷水	Leng-shui
2552	阿扁	A-pien
2553	幼稿	Yu-kao
2554	含穗種	Han-sui-ch'ung
2555	垄種	Lan-ch'ung
2556	岸仔 (1)	An-tzu (1)
2557	岸仔 (2)	An-tzu (2)
2559	岸仔	An-tzu
2562	青稿 (2)	Ching-kao (2)
2564	青稿	Ching-kao
2565	青稿岸 (1)	Ching-kao-an (1)
2566	青稿岸 (2)	Ching-kao-an (2)
2567	青稿岸10號	Ching-kao-an-No. 10
2568	青稿尖 1	Ching-kao-chien 1
2570	青稿尖 3	Ching-kao-chien 3
2571	菁菓占	Ching-kuo-chan
2572	菁稿占	Ching-kao-chan
2573	菁稿占	Ching-kao-chan
2576	菁稿	Ching-kao
2577	白殼柳占 (1)	Pai-k'o-liu-chan (1)
2578	白殼柳占 (2)	Pai-k'o-liu-chan (2)
2579	吻仔	Wen-tzu
2581	宜蘭	I-lan
2582	拗稿晚	Ao-kao-wan
2584	白殼埔占	Pai-k'o-p'u-chan
2585	白殼埔占	Pai-k'o-p'u-chan
2587	員粒	Yuan-li
2588	員粒	Yuan-li
2590	白殼員粒	Pai-k'o-yuan-li
2593	萬仔員粒	Wan-tzu-yuan-li
2594	柳占	Liu-chan
2595	柳占	Liu-chan
2596	格仔	Ko-tzu
2602	宜蘭格	I-lan-ko
2604	白殼格仔	Pai-k'o-ko-tzu
2607	下脚格仔	Hsia-chueh-ko-tzu
2608	低脚格仔	Ti-chueh-ko-tzu
2609	低脚格仔	Ti-chueh-ko-tzu
2610	高脚格仔	Kao-chueh-ko-tzu
2612	含葉格仔	Han-yeh-ko-tzu
2613	大格仔	Ta-ko-tzu
2614	小格仔	Hsiao-ko-tzu
2615	在來格仔	Tsai-lai-ko-tzu
2616	清流	Ching-liu
2617	清流	Ching-liu
2618	清流	Ching-liu
2620	紅脚清流	Hung-chueh-ching-liu
2622	白脚清流	Pai-chueh-ching-liu
2628	晚清油	Wan-ching-yu
2630	大粒清油	Ta-li-ching-yu
2631	鬼猴	Kuei-hou
2633	密粒	Mi-li
2635	鳥咬	Niao-yao
2636	鳥咬	Niao-yao
2637	鳥咬	Niao-yao
2639	鳥咬	Niao-yao
2642	鳥咬來	Niao-yao-lai
2643	烏尖	Wu-chien
2645	烏占	Wu-chan
2646	烏占	Wu-chan
2649	烏尖2號	Wu-chien No. 2

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
2650	烏殼早	Wu-k'o-tsao
2651	烏殼晚仔	Wu-k'o-wan-tzu
2652	烏殼大冬	Wu-k'o-ta-tung
2653	烏殼	Wu-k'o
2655	黃稿	Huang-kao
2656	黃稿	Huang-kao
2658	黃尖	Huang-chien
2660	菁種	Ching-ch'ung
2661	秈仔	Ch'u-tzu
2663	細粒秈仔	Hsi-li-ch'u-tzu
2664	細葉秈	Hsi-yeh-ch'u
2665	包心秈	Pao-hsin-ch'u
2666	包心秈	Pao-hsin-ch'u
2668	含胎秈	Han-t'ai-ch'u
2669	含胎秈	Han-t'ai-ch'u
2670	大葉秈	Ta-yeh-ch'u
2671	清油菊	Ching-yu-chu
2672	菊仔	Chu-tzu
2675	敏黨	Min-tang
2676	敏黨	Min-tang
2679	低脚敏黨	Ti-chueh-min-tang
2681	寄頭種	Chi-t'ou-ch'ung
2682	晚仔	Wan-tzu
2683	晚白蒁	Wan-pai-shih
2684	粽蓑齊	Chung-so-ch'i
2686	廈門種	Hsia-men-ch'ung
2687	新種	Hsin-ch'ung
2689	新種	Hsin-ch'ung
2690	高山	Kao-shan
2692	高犁	Kao-li
2694	蔓仔	Man-tzu
2696	紅脚蔓仔	Hung-chueh-man-tzu
2697	白殼蔓仔	Pai-k'o-man-tzu
2700	烏殼紅脚蔓	Wu-k'o-hung-chueh-man
2702	萬新	Wan-hsin
2703	萬仔	Wan-tzu
2705	潛遏	Ch'ien-hsieh
2706	鹿寮	Lu-liao
2707	楠仔仙	Nan-tzu-shien
2709	蕃仔 (1)	Fan-tzu (1)
2711	蕃仔 (3)	Fan-tzu (3)
2714	蕃麥花	Fan-mai-hua
2715	鼓嶺	Ku-ling
2716	搽仔	Ch'en-tzu

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
2717	齊仔谷	Chi-tzu-ku
2718	遏羅	Hsieh-lo
2719	霜降	Shuang-chiang
2720	霜降	Shuang-chiang
2722	霜降早 (1)	Shuang-chiang-tsao (1)
2724	鴨母	Ya-mu
2801	嘉義白殼圓粒	Chia-i-pai-k'o-yuan-li
2802	冬山白米金猴	Tung-shan-pai-mi-chin-hou
2803	冬山白米金猴	Tung-shan-pai-mi-chin-hou
2804	冬山白米金猴	Tung-shan-pai-mi-chin-hou
2805	冬山白米金猴	Tung-shan-pai-mi-chin-hou
2806	新竹晚清油	Hsin-chu-wan-ching-y
2807	花蓮清油	Hua-lian-ching-yu
2808	花蓮矮脚清油	Hua-lian-ai-chueh-ching-yu
2809	臺北霜降	T'ai-pei-shuang-chiang
2810	臺中蔓仔	T'ai-chung-man-tzu
2811	臺南柳營萬仔	T'ai-nan-liu-ying-wan-tzu
2812	新竹白埔占	Hsin-chu-pai-p'u-chan
2813	臺中集集拗稿晚	T'ai-chung-chi-chi-ao-kao-wan
2814	臺東烏殼紅脚蔓	T'ai-tung-wu-k'o-hung-chueh-man
2815	臺東三杯	T'ai-tung-san-pei
2816	嘉義菜園種	Chia-i-ts'ai-yuan-ch'ung
2818	白殼員粒	Pai-k'o-yuan-li
2819	菊仔	Chu-tzu
2820	朮變	Chu-pien

日本稻 (Japanese Varieties)

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
3001	メ張	Shimehari
3002	八左衛門	Yaz-amon
3003	小田四郎穗	Odashiroho
3004	小田代穗	Odashiro
3005	小都	Ko-miyako
3006	大正赤穗	Taishioakho
3007	大和日之出	Yamatohinode
3008	大稻	Oho-ina
3009	大黑	Daikoku
3011	丹後中稻	Tangochuto
3012	Pi No. 1	Pi No. 1
3013	Pi No. 2	Pi No. 2
3014	山之光	Yamarohegali
3015	中生白毛	Lakasasheraga
3016	中村	Nakamura
3017	石狩白毛	Ishikari-shiroke
3018	白光	Shirohikari
3019	巴勝	Tomoemasari
3020	早生大野	Waseouno
3021	吉神 1 號	Ki-sin No. 1
3022	吉神早生	Kissin wase
3023	竹成	Takenari
3025	銀坊主	Ginbozu
3026	銀坊主中性	Ginbozu
3027	坊主5	Bozu No. 5
3028	坊主5	Bozu No. 5
3029	坊主6	Bozu No.6
3030	福坊主	Fukubozu
3031	旭	Asahi
3032	旭	Asahi No. 2
3033	豐旭	Yutaka Asahi
3034	愛知旭	Aichi Asahi
3035	旭錦	Asahi-Lisheki
3038	金南風	Kinmaze
3039	長柄早生	Nugaawawa
3040	長穎稻	Choei-ine
3041	松江米	Maz-a-mae
3042	淺香	Asaka
3043	東鄉	Towogooh
3044	京見17號	Kyomi 17
3045	若葉	Wakaba

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
3046	相川	Aikawa
3047	相川44號	Aikawa No. 44
3048	保村 8 號	Homura No. 8
3049	岩手良溫1號	Idalauwon No. 1
3050	前澤	Maezawa
3051	南榮	Nanei
3052	神力	Shinriki
3053	神力	Shinriki
3054	中等神力	Chudouo-Sinriki
3055	晚生神力	Ohkudeshinriki
3056	神山	Kamiyama
3057	酒井金子	Sakaikanekeo
3058	郡益	Ko-onimas
3059	岡山	Okayama
3062	陸羽132號	Riku-u No. 132
3063	黃金丸	Koganemaru
3065	黃玉	Kogyoku
3066	萬作	Mansaku
3068	朝日3號	Asahi No. 3
3069	盤田朝日	Iwata Asahi
3070	盤田朝日	Iwata Asahi
3071	新莊內	Shinshonai
3072	新7號	Shin No. 7
3073	新榮	Shinei
3074	豐國1號	Toyokuni No. 1
3075	豐稔	Toyomiroli
3076	豐千本	Yutakasenbon
3077	豐光	Toyohikari
3078	矮性福	Waiseito
3079	愛國	Aikoku
3080	愛國1號	Aikoku No. 1
3081	愛國3號	Aikoku No. 3
3082	無芒愛國	Aikoku (awnless)
3083	改良愛國	Kairyo-Aikoku
3084	早生愛國	Waseaikoku
3085	瑞穗	Mizo
3086	富國	Tomikuni
3088	廣島晚2號	Hiroshimaban No. 2
3089	福助	Fukusuke
3090	榮光	Eiko
3091	榮光	Eiko
3092	晚生榮光	Bansei Eiko
3093	畿內至上	Kenaishigiyao
3094	玉錦	Tamanishiki

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
3095	綾錦	Ayanishiki
3096	綾錦	Ayanishiki
3097	巴錦	Tomoenishiki
3098	早生錦	Wase Nishiki
3099	富錦	Tominishiki
3101	戰捷	Sinceyauo
3102	澤田2號	Sawada No. 2
3103	霧島	Kirishima
3104	霜月	Shimotsuki
3105	龜治	Kameji
3106	龜尾4號	Kamenoo No. 4
3107	關東53號	Kanto No. 53
3108	藤坂5號	Fuzisaka No. 5
3109	シモツキ	Shimotsuki
3110	シナノ早生	Shinanowase
3111	ナカセンゴク	Nakasengoku
3112	クセシラズ	Kaseshirazu
3113	ツルギバ	Tsurugiba
3114	ミノル	Minoru
3115	モロコシ稻	Morokosi-ine
3116	ギンマサリ	Ginmasari
3117	トネ早生	Tonewase
3118	ハツニシキ	Hatsunishiki
3120	短金秀	Tankinshu
3121	若葉	Wakaba
3122	八重穗	Yae-ho
3123	ツモト錦	Tsumoto Nishiki
3124	秀峰	Shuho
3125	黄金千本	Kogane Senbon
3126	中生新千本	Nakate Shin senbon
3127	近畿33號	Kinki No. 33
3128	花明山	Kamejan
3129	ミホ錦	Minhonishiki
3130	タレ穗	Tareho
3131	十石穗農	Jukkoku-ho
3302	農林1號 (新)	Nohrin No. 1 (new)
3303	農林 1號	Nohrin No. 1
3304	農林 3號	Nohrin No. 3
3305	農林 4號	Nohrin No. 4
3306	農林 6號	Nohrin No. 6
3307	農林 8號	Nohrin No. 8
3308	農林 9號	Nohrin No. 9
3309	農林 10號	Nohrin No. 10
3310	農林 10號	Nohrin No. 10

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
3311	農林 11號	Nohrin No. 11
3312	農林 12號	Nohrin No. 12
3313	農林 12號	Nohrin No. 12
3314	農林 13號	Nohrin No. 13
3315	農林 14號	Nohrin No. 14
3316	農林 14號	Nohrin No. 14
3317	農林 15號	Nohrin No. 15
3318	農林 16號	Nohrin No. 16
3319	農林 17號	Nohrin No. 17
3320	農林 17號	Nohrin No. 17
3321	農林 18號	No rin No. 18
3322	農林 19號	Nohrin No. 19
3323	農林 20號	Nohrin No. 20
3324	農林 20號	Nohrin No. 20
3325	農林 21號	Nohrin No. 21
3326	農林 22號	Nohrin No. 22
3328	農林 22號	Nohrin No. 22
3330	農林 23號	Nohrin No. 23
3331	農林 24號	Nohrin No. 24
3332	農林 25號	Nohrin No. 25
3333	農林 25號	Nohrin No. 25
3334	農林 26號	Nohrin No. 26
3336	農林 27號	Nohrin No. 27
3337	農林 28號	Nohrin No. 28
3338	農林 29號	Nohrin No. 29
3340	農林 30號	Nohrin No. 30
3341	農林 32號	Nohrin No. 32
3342	農林 33號	Nohrin No. 33
3343	農林 34號	Nohrin No. 34
3344	農林 35號	Nohrin No. 35
3345	農林 36號	Nohrin No. 36
3347	農林 37號	Nohrin No. 37
3349	農林 37號	Nohrin No. 37
3350	農林 38號	Nohrin No. 38
3351	農林 39號	Nohrin No. 39
3352	農林 41號	Nohrin No. 41
3353	農林 43號	Nohrin No. 43
3354	農林 44號	Nohrin No. 44
3355	農林 46號	Nohrin No. 46
3356	農林 47號	Nohrin No. 47
3357	農林 48號	Nohrin No. 48
3358	農林 49號	Nohrin No. 49
3359	農林 50號	Nohrin No. 50
3360	農林 51號	Nohrin No. 51

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
3361	農林 54號	Nohrin No. 54
3362	農林 55號	Nohrin No. 55
3363	農林 56號	Nohrin No. 56
3364	農林 60號	Nohrin No. 60
3365	農林 61號	Nohrin No. 61
3368	農林 66號	Nohrin No. 66
3369	農林 69號	Nohrin No. 69
3370	農林 70號	Nohrin No. 70
3371	農林 71號	Nohrin No. 71
3372	農林 72號	Nohrin No. 72
3373	農林 73號	Nohrin No. 73
3374	農林 74號	Nohrin No. 74
3375	農林 76號	Nohrin No. 76
3376	農林 79號	Nohrin No. 79
3377	農林 80號	Nohrin No 80
3378	農林 81號	Nohrin No. 81
3379	農林 82號	Nohrin No. 82
3380	農林 83號	Nohrin No. 83
3382	農林 85號	Nohrin No. 85
3383	農林 86號	Nohrin No. 86
3384	農林 87號	Nohrin No. 87
3385	農林 90號	Nohrin No. 90
3386	農林 91號	Nohrin No. 91
3387	農林 93號	Nohrin No. 93
3388	農林 96號	Nohrin No. 96
3389	農林 97號	Nohriu No. 97
3390	農林100號	Nohrin No. 100
3391	農林101號	Nohrin No. 101
3392	農林 48號	Nohrin No. 48
3393	農林 49號	Nohrin No. 49

* The Name of Japanese Varieties is translated into English according to the Japanese Pronunciation.

韓國稻

(Korean Varities)

3501	南韓212號	Nan-han No. 212
3502	水原149號	Shui-yuan No. 149
3503	水原150號	Shui-yuan No. 150
3504	裡里228號	Li-li- No. 228
3505	裡里239號	Li-li No. 239

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
3506	瑞光	Jui-kuang
3507	韌光	Ch'o-kuang
3508	鮮瑞	Hsien-jui
3509	倍達	Pei-ta
3510	八達	Pa-ta
3511	八紘	Pa-hsien
3512	豐玉	Feng-yu
3513	晚勝	Wan-sheng
3514	日進	Jih-chin
3515	高矢	Kao-shih

臺灣蓬萊陸稻

(Taiwan Ponlai Upland Varieties)

4401	臺東育46號	Tai-tung-yu No. 46
4402	臺東育48號	Tai-tung-yu No. 48
4403	臺東育49號	Tai-tung-yu No. 49

臺灣在來陸稻

(Taiwan Native Upland Varieties)

4501	白殼早仔	Pai-k'o-tsao-tzu
4502	白殼早仔	Pai-k'o-tsao-tzu
4504	赤殼	Ch'ih-k'o
4505	林芒	Lin-mang
4506	紅脚清流	Hung-chueh-ching-liu
4507	白脚清流	Pai-chueh-ching-liu
4508	清油	Ching-yu
4509	七十日	Chi-shih-jih
4510	員粒	Yuan-li
4511	白殼員粒	Pai-k'o-yuan-li
4512	烏殼	Wu-k'o
4513	烏殼早仔	Wu-k'o-tsao-tzu
4514	補早	Pu-tsao
4515	高脚烏占	Kao-chueh-wu-chan
4516	雷槌	Lei-ch'ui
4517	饒腰	Jao-yao

臺灣山地陸稻
(Taiwan Mountainous Varieties)

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
4601	拉卡斯	Ragasu
4602	拍伊鴨鳥哇嚕	Pairauwar
4603	奴資哩哇伊	Nutsurikui
4604	咪獨恩	Midon
4605	不哩耶鳥囉喔資	Burieuraozu
4606	怕皮托	Papito
4607	媽恩達拉克伊枯	Mandarakiku
4608	怕伊鴨鳥嚕	Pairaur
4609	他恩開恩開恩拉恩卡資	Tangengenrankatsu
4611	朴喔怕卡伊阿禾恩	Paotsupagaiahon
4612	摸恩他那	Montana
4613	畝帖伊卡	Muteka
4614	哈伊乎哥鴨	Haifugoya
4615	那他拉	Nata-ra
4616	卡伊些恩帖資甚資	Kaisentetsuchitsu
4617	怕資媽他媽嚕	Pazumatamaru
4618	卡鉢乎	Kabofu
4620	他禾喔皮恩	Tahobin
4621	那鉢喔哈伊	Nabohai
4623	那卡伊哩斯	Nakairitsu
4625	畝那姑嚕斯	Munagurusu
4628	資怕拉恩	Tsuparan
4630	姑嚕斯	Gurusu
4631	舖拉哈伊他伊哩恩	Purahaitairin
4632	媽他拉	Matara
4635	卡鉢資媽美	Kabotsumame
4637	那他怕斯 S_2	Napatsupai S_2
4638	那他拍斯 S_3	Napatsupai S_3
4640	鉢哈伊	Bohai
4641	納鉢哈伊	Nobohai
4642	怕拉哈伊那科嚕	Parahainakoru
4643	哈不恩 1號	Habun No. 1
4644	那卡囉乎卡拉怕伊 S_1	Nakarofukarapai S_1
4646	那拍拍伊	Napatsupai
4648	撰2號	Chuan No. 2
4649	撰3號	Chuan No. 3
4650	撰4號	Chuan No. 4
4652	拉卡拉斯	Ragarasu

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
4654	他朴舖哩	Tapopuri
4655	卡斯喔阿恩	Kasoan
4656	失名陸稻	失名陸稻
4657		Vnknown 1
4658		Vnknown 2
4659		Vnknown 3
4661	拔哩黎恩	Baridon
4662	怕喔柯伊鳥捏枯	Pakaikauneku
4663	禾朴喔他伊鴨嚕	Hopots utaiyaru

日本陸稻
(Japan Upland Varieties)

4701	大畑早生123號	Ohhobatwase No. 123
4702	平山	Hirayama
4704	長柄早生浦26號	Nagaiwasewora No. 26
4705	東京戰捷	Tokyosinceyauo
7706	浦三	Orazoo
4707	雄町	Omachi
4708	淺賀	Asaga
4709	黑禾	Kuroca
4710	農林9號	Nohrin No. 9
4711	福富	Fukutomi
4712	熊本1號	Kumamodoe No. 1
4713	戰捷穗	Sinceyuaoho
4714	農林1號	Nohrin No. 1
4715	戰捷	Sinceyauo

中國大陸糯稻
(Mainland China Glutinous Varieties)

5004	大粒黃占	Ta-li-huang-chan
5005	上季早稻	Shang-chi-tsao-tao
5015	早酒谷	Tsao-chiu-ku
5016	老脫鬚	Lao-t'o-hsu
5018	長鬚糯	Chang-hsu-no(glutinous)
5020	金色糯	Chin-se-no(glutinous)
5023	紅糯	Hung-no(glutinous)
5024	紅殼糯	Hung-k'o-no(glutinous)
5023	岩糯	Yen-no(glutinous)
5029	烏糯稻	Wu-no-tao

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
5030	鄂農3號	O-nung No. 3
5033	晚糯稻240	Wan-no-tao No. 204
5035	團粒糯	T'uan-li-no(glutinous)
5035	醉樂谷	Tsui-lo-ku
5036	黔農55號 (黑糯)	Ch'ien-nung No. 55
5037	金門斗門朮米(青)	Chin-men-tou-men-chu-mi (green)
5038	金門斗門朮米(紅)	Chin-men-tou-men-chu-mi (red)
5039	丹陽糯	Tan-yang-no(glutinous)
5040	中秋糯	Chung-chiu-no (glutinous)
5041	小糯	Shiau-no(glutinous)
5042	羅糯 4 號C	Lo-no No. 4C

臺灣在來糯稻
(Taiwan Native Glutinous Varieties)

5103	雙冬朮	Shuang-ton-chu
5108	占仔朮	Chan-tzu-chu
5109	尖仔朮	Chien-tzu-chu
5110	芒花朮	Mang-hua-chu
5122	赤脚朮	Ch'ih-chueh-chu
5123	紅脚朮	Hung-chueh-chu
5124	紅脚朮	Hung-chueh-chu
5128	紅脚朮	Hung-chueh-chu
5133	對鹽性朮	Tui-yen-hsing-chu
5134	蕃仔朮	Fan-tzu-chu
5139	雙冬秧	Shuang-tung-juan
5142	臺中大甲灶脚秧	Tai-chung-ta-chia-tsao-chueh-juan
5143	臺中竹山雙冬秧	Tai-chung-chu-shan-shung-tong-juan
5144	臺中芒花朮	Tai-chung-mang-hua-chu
5145	臺中赤脚朮	Tai-chung-ch'ih-chueh-chu
5146	臺中對鹽性朮	Tai-chung-tui-yen-hsing-chu
5147	臺中尖仔朮	Tai-chung-chien-tzu-chu

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
5148	赤殼朮	Ch'ih-k'o-chu
5149	鵝卵朮 (花蓮)	O-loan-chu(Hualien)
5150	紅脚朮	Hung-chueh-chu
5151	烏殼朮	Wu-k'o-chu
5152	竹絲(1)	Chu-hsi-chu(1)
5153	竹絲朮(2)	Chu-hsi-chu(2)
5201	大朮	Ta-chu
5202	大脚蒲朮	Ta-chueh-p'u-chu
5207	反鹽朮	Fan-yen-chu
5209	反鹽朮	Fan-yen-chu
5212	白殼朮	Pai-k'o-chu
5213	白殼大朮	Pai-k'o-ta-chu
5217	白朮	Pai-chu
5219	紅殼朮	Hung-chueh-chu
5223	赤殼朮	Chih-k'o-chu
5225	芒花朮	Mang-hua-chu
5227	芒花朮	Mang-hua-chu
5228	青稿朮	Ching-kao-chu
5231	鵞卵朮	O-luan-chu
5232	虎頭卵鵞卵朮	Fu-t'ou-o-luan-chu
5238	官眞朮	Kuan-chen-chu
5241	馬尾絲朮	Ma-wei-hsi-chu
5242	馬尾朮	Ma-wei-chu
5246	烏殼朮	Wu-k'o-chu
5251	烏殼芒花朮	Wu-k'o-mang-hua-chu
5253	高脚烏占朮	Kao-chueh-wu-chan-chu
5254	烏尖朮	Wu-chien-chu
5255	烏鼠牙朮	Wu-shu-ya-chu
5257	秧枝朮	Juan-chih-chu
5259	高龍朮	Kao-lung-chu
5260	高雄大朮 1 號	Kao-hsiung-ta-chu No. 1
5261	高雄大朮 2 號	Kao-hsiung-ta-chu No. 2
5263	穆公朮	Mu-kung-chu
5264	店葉朮	Tein-yeh-chu
5265	潛葉朮	Ch'ien-yeh-chu
5266	穩葉朮	Wen-yeh-chu
5267	烏殼朮	Wu-k'o-chu

日本糯稻
(Japan Glutinous Varieties)

5301	七面鳥糯	Shichimancheue-Mochi
5302	八仙糯	Hassen-Mochi
5303	大正糯	Taisheyuo-Mochi

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
5304	美濃糯特1號	Miro-Mochi-toku No. 1
5305	金時糯	Kintoki-Moci
5306	明神糯	Miyuoshin-Mochi
5307	紀念糯	Kilien-Mochi
5308	滋賀白糯	Shiasher-Mochi
5309	黑糯22號	Kuroo-Mochi No. 22
5310	越後水糯	Aehegomiz-Moohi
5311	滞下糯	Mizshita-Mochi
5313	槓槌糯	Kitsuchimochi
5314	藤藏糯	Foujikura-Mochi
5315	小針糯	Kohari-Mochi
5316	太平糯	Taihei-Mochi
5319	黑糯22號	Kuroo-Mochi No. 22
5320	崎玉糯1號	Saitama-Mochi No. 1
5321	三井	Mii
5322	旱不知	Hiderishirazu
5323	金光大盜稻	Ginkotaikaidou
5324	鹿兒島葉冠1號	Kagoshemauocan No. 1
5325	荔枝紅	Reishiko
5326	コトブキモチ	Kotobukimochi
5327	農林糯5號	Nohrin-Mochi No. 5
5328	農林糯53號	Nohrin-Mochi No. 53

日本陸糯稻
(Japan Upland Glutinous Varieties)

5331	土佐糯	Tosou-Mochi
5332	木下糯	Kirosheta-Mochi
5333	白禾糯	Shiroga-Mochi
5334	美濃崎糯1號	Mirozaki-Mochi No. 1
5335	藤藏糯16號	Fujiura-Mochi No. 16
5336	東京藤藏糯	Tokyofhujra-Mochi
5337	夜ノ雪糯	Yuronoyuki-Mochi
5338	陸羽糯22號	Roku-u-Mochi No. 22
5339	國光糯	Kunimiz-Mochi
5340	凱旋糯	Gaisen-Mochi
5341	農林糯1號	Nohrin-Mochi No. 1
5342	囮子糯	Taiz-Mochi

臺灣蓬萊糯稻
(Taiwan Ponlai Glutinous Varieties)

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
5401	臺農糯8號	Tainung-Glutinous No. 8
5501	農育糯3號	Nung-yu-Glutinous No. 3
5502	農育糯11號	Nung-yu-Glutinous No. 11
5503	農育糯13號	Nung-yu-Glutinous No. 13
5504	農育糯20號	Nung-yu-Glutinous No. 20
5505	農育糯24號	Nung-yu-Glutinous No. 24
5506	農育糯25號	Nung-yu-Glutinous No. 25
5507	農育糯30號	Nung-yu-Glutinous No. 30
5508	農育糯34號	Nung-yu-Glutinous No. 34
5509	農育糯35號	Nung-yu-Glutinous No. 35
5511	農育糯54號	Nung-yu-Glutinous No. 54
5512	農育糯57號	Nung-Yu Glutinous No. 57
5513	農育糯59號	Nung-yu-Glutinous No. 59
5514	農育糯64號	Nung-yu-Glutinous No. 64
5515	農育糯66號	Nung-yu-Glutinous No. 66
5516	農育糯68號	Nung-yu-Glutinous No. 68
5517	農育糯76號	Nung-yu-Glutinous No. 76
5518	農育糯83號	Nung-yu-Glutinous No. 83
5519	農育糯87號	Nung-yu-Glutinous No. 87
5520	農育糯110號	Nung-yu-Glutinous No. 110

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
5522	農育糯146號	Nung-yu-Glutinous No. 146
5523	農育糯174號	Nung-yu-Glutinous No. 174
5524	農育糯179號	Nung-yu-Glutinous No. 179
5526	農育糯197號	Nung-yu-Glutinous No. 197
5527	農育糯201號	Nung-yu-Glutinous No. 201
5601	臺中糯46號	Taichung-Glutinous No. 46
5602	臺中糯59號	Taichung-Glutinous No. 59
5603	臺中糯60號	Taichung-Glutinous No. 60
5606	臺中糯66號	Taichung-Glutinous No. 66

臺灣山地陸糯稻
(Taiwan Mountain Glutinous Varieties)

5801	佩耶喱資糯	Paerizumochi
5803	他嚕那斯糯	Tarunatsumochi
5804	哇喱薩恩糯 1	Warisanmochi 1
5805	哇喱薩恩糯 2	Warisanmochi 2
5807	失名陸稻糯 2	
5808	科媽阿怕他伊	Komapatai
5809	怕阿卡伊資伊他伊鴨嚕	Pagaitsuitaiyaru
5810	阿伊拉囉畝	Airaromu
5811	怕阿資媽他哈嚕	Pazumataharu
5814	那卡那 2	Nakara 2
5815	那卡鉢	Nakabo
5816	拔姑托恩	Naguton
5817	科摸那哇伊	Komonawai
5819	拍資拍資	Patsupatsu
5820	拉鉢黑克伊喱	Rabohekiri
5821	撰6號	Chuan No. 6
5822	皮殷托彎 1	Pintowan 1
5823		Banadoion

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	
5824	科嚨登卡阿伊	Koodngoi
5825	那禾嚕伊	Kahorui
5823	堂西甕	Tongsisai

The name of all Ponlai, China mainland, Korea, Taiwan native and Mountain Varieties are translated into English according to Chinese pronunciation.

錫蘭引進稻
(Ceylonese Varieties)

8001	Cy. 6
8002	Cy. 10

埃及引進稻
(Egyptian Varitiy)

8101	Nahda

印度引進稻
(Indian Varieties)

8201	M. T. V. 14
8202	India 13
8203	India 17
8204	Vallai pewnel
8205	India 32
8206	P. T. B. 9
8207	India 10
8208	India 31
8209	Indidsol Dinoj
8210	India 9
8211	India 17

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name
8212	P. T. B. 16
8213	India 26
8214	A. D. T. 4
8215	India 15
8216	A.D.T. 14
8217	India 3
8218	India 24
8219	Paddy Type 21
8220	India 1
8221	India 14
8222	India 8
8223	India 25
8224	India 29
8225	India 28
8226	India 30
8227	India 6
8228	India 27
8229	India 33
8230	India 5
8231	India 9
8232	India 20
8233	India 21
8234	India 34
8235	India 22
8236	India 7
8237	India 23
8238	India 11
8239	India 16
8240	India 18
8241	Badlcalamkati
8242	Bahasmanik
8243	Marichbuti
8244	Tilakkachray
8245	ASC 313-11
8246	AS. 48
8247	AS. 86
8248	MS. 2 karabath
8249	Dumrai 204-1
8250	SC. 1177-6
8251	Bhasamanik
8252	Bandshahbhog
8253	Patnai-23
8254	Seetasail-499
8255	Dular-Hybrid

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name
8256	Badkalamkati-65
8257	Jhanji-34
8258	Ashkata
8259	Badkalamkati-141
8260	Nonaramsail
8261	Randhunipagal
8262	S. 661
8263	S. 699
8264	S. 701
8265	S. 718
8266	S. 1079
8267	S. 1092
8268	A. 64
8269	N. 22
8270	N. 32
8271	T. 136
8272	T. 138
8273	Luchai × Gurmatia × Burma 2
8274	Luchai×Gurmatia 18

印尼引進稻

(Indonesian Vrieties)

8401	Java 44
8402	Java 41
8403	Kariiranga
8404	Mantja Nangge
8405	Java 42
8406	Java 48
8407	Kapanto
8408	Java 43
8409	Karike
8410	Linoetoeng
8411	Java 40
8412	Java 47
8413	Ladang (Pal Wongahoe-ma)
8414	Laka
8415	Lantjang
8416	Java 45

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name
8417	Lapang
8418	Montja naq
8419	Boenar
8420	Benggala
8421	Java 46
8422	Poetih menek Don 1
8423	Kanti
8424	Potik Tjem Poka
8427	Ladang
8428	Guinangang
8429	Boegi boera
8430	Boegi inda
8431	Tjempa roat
8432	Saratoes Hari
8433	Deudah
8435	Monda (Sawah)
8436	Montja mengi
8437	Lege menir
8438	Lege pisak
8439	Haloes Koening
8440	Mapili
8441	Baka toi
8442	Bako (Ladang)
8443	Dara peran
8444	Dewa
8446	Gadi boera
8447	Gamal
8448	Gropak seroeng
8449	Keke kala
8450	Keke modja
8451	Lendak kesaming
8453	Mee woeri
8455	Montja
8457	Montja Loi
8458	Montja tjampa
8459	Tanga
8460	Ajella No. 1
8461	Anadara
8462	Atji
8463	Atji
8464	Bakka
8465	Banda 387
8466	Banda 390
8467	Banda 399

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name
8468	Baranda
8469	Boelaan
8470	Boelo
8471	Daeri
8472	Ase Darok mani-mani
8473	Lasse
8474	Linoetoeng (mosaang)
8475	Mandi
8476	Maraja
8477	Maraja
8478	Mepanga
8479	Oenji hare
8480	Ase poeloe Balong
8481	Poeloet Oeban
8482	Poeloet Teboe berboeloeh
8483	Poetih No. 2
8484	Sahe
8485	Serajae
8486	Ase Tjalla
8487	Tjina 324
8488	Gebod
8489	Beak ganggas
8490	Boentaktoewoeng gangsar
8491	Djogading meneugah
8492	Indjin
8493	No. 2402 (dari djawa)
8494	No. 2403 (dari djawa)
8495	Atji
8496	Land bauw
8497	Palar
8498	Ase poeloe Bolong
8499	Poeloe poetih
8500	Djamnoe
8501	Pare
8502	FJ20
8503	Ketan Poetih
8504	Keta mec
8505	Ase pindjau
8506	Ase poeloe Bolong
8507	Bengauan
8508	Cendjah Banten
8509	Intan
8510	Sukamandi

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name

意大利引進稻
(Italian Varieties)

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name
8601	R. Bersami
8602	Rijjotto
8603	Sesia

獅子山引進稻
(Sierra Leone Variety)

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name
8801	D. 99

菲律賓引進稻
(Philippines Varieties)

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name
8901	Bulastog
8902	Philippoines Kinan Kuda
8903	Philippoines Macan Binong pate
8904	Macan Caranglan
8905	Macan Binong pate
8906	Kinan kuda
8907	Lin Leng
8908	Macan Binong pate
8909	Binangh
8910	Inapostol
8911	Milagrosa
8912	Pauning Govierns
8913	Inapuston
8914	Dadd
8915	Davao
8916	Garum Balay
8917	Macan Barret
8918	Macan Binundoh
8919	Apostol
8920	Davao 3
8921	Sapok
8922	Davao 2
8925	Macan Talipina
8926	Kasungsung
8927	Malagkit Sunsong
8928	Olay ayan
8930	Balid
8932	Malagkit Pirurutong
8933	Malagkit Sinaguing
8934	Miefor 6 (2)
8935	Badlcalamkati
8936	BPI-76
8937	Aluminos
8938	Arimongmong
8939	Bandera
8940	Binacroy
8941	Binalasang
8942	Cprasisi
8943	Galaygay-1
8944	Galaygay-3
8945	Macanining
8946	Macaning Pugot
8947	Muguen-2
8949	Muguen-5
8950	Panesopec
8951	Pinanique-1
8952	Salayosay
8953	Sinarocot
8954	Simpolet-1
8955	Simpolet-2
8956	Simpolet-3
8958	Peta
8960	Mangarez
8961	Maginsalay
8962	Buenketan
8963	Apostol
8964	Chaw Bao Shri
8965	Okinawa
8967	Emmaramang
8968	Guinobierno
8969	Aluminos
8972	Eleon-B
8973	Balilin

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name
8974	Waglon
8975	Las Buen
8976	Paneaopec
8977	Pinili sa Mitao
8978	Ampipit
8979	Mitao
8980	Cayanga
8981	Sinariaya
8982	Arabon
8983	Binalasang
8984	Bandera
8985	Sinibling
8986	Elon-elon
8987	Consejala
8988	Dinominga
8989	Balasang
8990	Binonton
8991	Macan Lamio
8992	Balibod
8993	Milagrosa
8994	Malyok
8995	Ramilon
8996	Provincial
8999	Binuhangin
9000	Salayosay
9001	Pinutucan
9002	Corasisi
9005	Pangasinan

巴基斯坦引進稻
(Pakistani Varieties)

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name
9101	Dharial
9102	Dular

西班牙引進稻
(Spainish Varieties)

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name
9201	Insen×Tremesinis
9202	Dreeoz Verde

泰國引進稻
(Thailand Varieties)

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name
9301	Thong Roya Dum
9302	Thing Roya Dum
9303	Khao Tah Haeng 17
9304	Leuang Awn 29
9305	Leuang Rahaeng 8
9306	Nahng Mon S-4
9307	Puang Nahk 16

美國引進稻
(American Varieties)

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name
9401	Cody
9402	Caloro
9403	Colusa
9404	Zenith
9405	Magnolia
9406	Arkrose
9407	Kamrose
9408	Calrose
9409	Lacrose
9410	Bluebonnet 50
9411	Century patna 23
9412	Rexark
9413	Ark Fortana
9414	Nira 43
9415	Prelude
9416	Century 231

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name
9417	Rexoro Purpleleat × Magnolia
9418	R-D ("Scented")
9419	231A-14-1-2
9420	R-27
9421	Hy Mix Slender
9422	California Composite
9423	R-54
9424	S 417 A 3
9425	Kinia 195
9426	California 1469
9427	R-50
9428	Hill×Zenith
9429	B 4512A 1-20
9430	B 4512A 1-32
9431	Ho-421-2-1-1-1
9432	B45-15-1-8-2
9433	Gulfrose
9434	B 546 A-1-1-3-1
9435	CI 9416
9436	PI 215,936
9437	55-13065-76
9438	4626 A1-13-3
9439	Nato
9440	250-2-2×250-Magnalia
9441	Lacrosse×Arkrose
9442	Lacrosse×Arkrose
9443	Zenith×B433A2-6
9444	CP 231/2×Bluebonnet
9445	Bbt ×CP 231
9446	CP 231/3×Bbt
9447	(Rex-CI 7689)×(Texas patna× Rexoro-Supreme Blue Rose)
9448	CI 9273×Texas Patna
9449	Bbt×CP 231
9450	CI 9258×CI 9122
9451	CI 9122×Rexoro
9452	CI 9122×Rexoro
9453	CI 9122×Rexoro
9454	CP 231×CI 9122
9455	B 575A1-26-4, CI 9214×(B 5117A 2-4)
9456	231×Ho 12

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name
9457	B 5464A 2-20-1-3, Hyb Mix×Red CP 231
9458	B 5464A 2-5-2-3, Hyb Mix×Red CP 231
9459	B 5464A 2-5-4-4, Hyb Mix×Red CP 231
9460	B 5464A 2-5-1-3, Hyb Mix×Red CP 231
9461	B 5464A 2-19-1-5, Hyb Mix×Red CP 231
9462	B 563A1-5-2, CP 231 Irrad, Dwarf×Bbt 50
9463	Texas Patna

越南引進稻

(Vietnam Varieties)

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name
9601	57 gie
9602	19 giau hen
9603	241 Lun chin
9604	R.T.S. 29
9605	4 Tam Xoan
9606	70^{b} som cau
9607	77 Tam Xoan
9608	Iv Tam lun
9609	33^{b} gie noi
9610	R.T.S. 3
9611	R.T.S. 23
9612	19 Tam X oan
9613	1 Tam noi
9614	89^{b} giau cao
9615	125 Duang nghe
9616	II Danh
9617	R.T.S. 4
9618	R. T.S. 27
9619	R.T.S. 4
9620	R.T.S. 25
9621	R.T.S. 26
9622	527 gir hoa
9623	V^{a} hop
9624	XX111 Gian muon

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name
9625	$V11^{d2}$ Tam muon
9626	I Tam lun
9627	547 Tam muon
9628	558 giau nghe
9629	$V11^{d1}$ Tam muon
9630	R.T.S. 5
9631	R.T.S. 11
9632	R.T.S. 17
9633	R.T.S. 23
9634	R.T.S. 31
9635	48 gie hieu
9636	giong trang
9637	194^{a} goai hun
9638	R.T.S. 24
9639	IX^{a} Tam cau
9640	R.T.S. 15
9641	24 gie hoa
9642	R.T.S. 14

其他

(Others)

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name
9801	外國 51
9802	外國 52
9803	外國 55
9804	外國 56
9805	外國 53
9806	外國 54
9807	外國 50
9808	新來南洋 67
9809	新來南洋 71
9810	新來南洋 73
9811	新來南洋 62
9812	新來南洋 72
9813	新來南洋 64
9814	新來南洋 65
9315	新來南洋 19
9816	新來南洋 68
9817	新來南洋 59
9818	新來南洋 74
9819	新來南洋 61
9820	新來南洋 57
9821	新來南洋 70
9822	新來南洋 58
9823	新來南洋 60
9824	新來南洋 66
9825	新來南洋 69

一、緒　言(Introduction)

本所爲增加水稻雜交育種及其他有關試驗研究之材料，先後從國外引進稻種及保存本省土種或各場所育成品種共達 3,103 種，爲明瞭其生態方面之特性及其利用價値，自民國50年（1961）獲農復會補助，曾先後按照品種引進之地區或類別，加以整理，分組舉行特性觀察，並以所得結果，供給雜交育種及其他試驗研究時之參考。

稻種特性調查及整編，係由本所技士馮朝程及臨時技術員許東暉負責，並有黃眞生、楊方平、陳源泉等技士之協助，又苗稻熱病、葉稻熱病與穗頸稻熱病等之檢定，則由簡錦忠技士及嘉義分所負責。

此次本所稻種特性誌之編印費係由農復會補助，書成之後復蒙臺灣省農林廳張廳長憲秋博士賜序，謹申衷心之謝忱。

本誌因編印匆促，錯誤遺漏之處在所難免，尚祈諸專家先進不吝賜正，俾在再版時得以修正。

二、調查材料(Materials)

供諸調查之稻種，依其來源及性質可分爲23類，經整理淘汰混種與重複品種，至今尚保存 2344 品種，其詳細情形，有如下表：

表一、供試品種的類別及品種數

Table 1. The classification and number of varieties tested

分　類 Classification	編　號 Code Number 起 From——訖 To	總　數 Total Number of Varieties
1 臺灣蓬萊稻 (Taiwan Ponlai Variety)	01——713	416
2 臺灣蓬萊陸稻 (Taiwan Ponlai Upland Variety)	4401——4403	3
3 臺灣蓬萊糯稻 (Taiwan Ponlai Glutinous Variety)	5401——5606	29
4 中國大陸稻 (Mainland Chinese Variety)	1001——1877	660
5 中國大陸糯稻 (Mainland China Glutinous Variety)	5004——5042	21
6 臺灣在來稻 (Taiwan Native Variety)	2001——2820	396
7 臺灣在來陸稻 (Taiwan Native Upland Variety)	4501——4517	16
8 臺灣在來糯稻 (Taiwan Native Glutinous Variety)	5103——5267	54
9 臺灣山地陸稻 (Taiwan Mountainous Variety)	4601——4663	46
10 臺灣山地陸糯稻 (Taiwan Mountain Glutinous Variety)	5801——5828	21
11 日本稻 (Japanese Variety)	3001——3393	203
12 日本陸稻 (Japanese Upland Variety)	4701——4715	14
13 日本糯稻 (Japan Glutinous Variety)	5301——5328	23

14	日本陸糯稻 (Japan Upland Glutinous Variety)	5331——5342	12
15	韓國稻 (Korean Variety)	3501——3515	15
16	錫蘭稻 (Ceylonese Variety)	8001——8002	2
17	埃及稻 (Egyptian Variety)	8101—— —	1
18	印度稻 (Indian Variety)	8201——8274	72
19	印尼稻 (Indonesian Variety)	8401——8510	104
20	意大利稻 (Italian Variety)	8601——8603	3
21	獅子山稻 (Sierra Leone Variety)	8801—— —	1
22	菲律賓稻 (Philippines Variety)	8901——9005	91
23	巴基斯坦稻 (Pakistani Variety)	9101——9102	2
24	西班牙稻 (Spainish Variety)	9201——9202	2
25	泰國稻 (Thailand Variety)	9301——9307	7
26	美國稻 (American Variety)	9401——9463	63
27	越南稻 (Vietnam Variety)	9601——9642	42
28	其 他 (Others)	9801——9825	25
	計 (Total)		2344

* 不包含五十二年度引進者。

三、調查方法(Methods)

1 處理：

所有保存的稻種，於五十年舉行特性調查時，無論其爲第一期性或第二期性者，均按照農時，而同時在第一期作及第二期作栽培，用以測驗那些品種，不能在第一期作抽穗，以及所謂第二期性之臺灣在來稻品種，是否確不能在第一期作時抽穗。肥料試驗與抗病性之檢定，係於五十一年度的第一、二期作分別實施，其中抗病性檢定主要爲稻熱病與紋枯病二種。

特性調查本田之肥培及一切管理，均按照慣例實施，調查工作分爲田間及室內進行。肥料反應試驗，爲顧及品種之類別不同，故氮肥之施用量亦不相同，在每類品種之氮肥標準中分爲三種不同之數量，其施用量如下：

蓬萊稻及日本稻種：

a：標準施肥區：每公頃施用80公斤之N素。

b：½量增施區：每公頃施用 120 公斤之N素。

c：倍量增施區：每公頃施用 160 公斤之N素。

其他各類稻種：

a：標準施肥區：每公頃施用60公斤之N素。

b：½量增施區：每公頃施用90公斤之N素。

c：倍量增施區：每公頃施用 120 公斤之N素。

磷肥及鉀肥之施用量，不管品種類別及不同之氮肥施用區，均一律按照本省現行之標準量，即每公頃施用 p_2o_5 及 k_2o 各約 60 公斤。氮肥之一半，作爲基肥，所剩之一半量，則作爲追肥，在第一期作時，於第二、三次除草前施用，而在第二期作時，則分別於第一、二次除草前施用，磷肥及鉀肥，則均作爲基肥一次施用之。肥料反應試驗，各類稻種，除蓬萊稻種及日本稻種，於第一、二期作同時參加試驗外，其餘均按期作性參加試驗。

2 試驗設計：

所有供諸調查之品種，按其來源及類別，以及品種名相同或品種名相類似者，相隣順序栽培田間。每一品種均栽培爲 3 行區，各品種之間空隔一行，每行五株，單本植，行距25公分，株距20公分。

肥料反應試驗，在每區中栽培爲一單行區，蓬萊稻及日本稻之栽培，行距爲25公分，其他品種之行距，則爲40公分，株距則爲20公分，每行栽植 5 株，每株 3 本苗。

稻熱病檢定，每品種二重複，皆以罹病較嚴重爲準，不以二重複之平均數爲準。所不同者幼苗稻熱病，重複50粒於玻璃房進行，而葉、穗頸稻熱病檢定爲避免混什則於田間採用直播式單行區。

3 特性調查項目及準則：

調查的項目，分爲形態的特性，生理的特性與穀粒的特性三大類，每類之中，再擇若干項目舉行調查每其標準如下：

(一) 形態上的特性

(1) 植高 (Plant height)

成熟期，選每一小區之中間一行量，由地面量至最高穗頂之高度，但芒長不計在內，然後五株平均計算。(用cm表示之)

(2) 有效分蘗 (Number of tillers)

於成熟期調查之，就上列調查株高之材料，同時調查有效分蘗，計算每株有效分蘗平均數。

(3) 葉色 (Color of leaf blade)

葉色常因施肥量之多寡及品種抽穗期的遲早，而變異頗大，故葉色於秧苗期調查，可分爲濃綠 (Deep Green)、綠 (Green) 與淡綠 (Light Green) 等三種不同顏色。

(4) 莖基色 (Color of basal portion of culm)

於抽穗期，以肉眼鑑定，莖部之顏色，可分爲綠 Gn (Green)，與紫 P (Purple) 二種。

(5) 穗重 (Weight of panicle)

水稻成熟之後，每一品種從各小區之中間，一行割取五個主穗，携回室內秤其平均穗重。用克 (gr) 表示之。

(6) 芒 (Awn)

分爲有芒與無芒二大類。無芒以「一」表示，有芒種則依其芒之長短與多少，再細分如下：

a 芒之長短：

長：超過 2 公分以上者，以「L」表示之。

中：在 1 — 2 公分之間者，以「M」表示之。

短：在 1 公分以下者，皆列入短芒，以「S」表示之。

b 芒之多少：

多：一穗中75%以上的谷粒，有芒者，以「F」表示之。

中：一穗中30%—75%的谷粒，有芒者，以「P」表示之。

少：一穗中有芒之谷粒，在30%以下者，以「R」表示之。

(7) 柱頭色 (Color of stigma)

於抽穗期調查之，分爲着色與不着色（不着色即指白色而以「W」表示，着色者包括紫、紫黑分別以 P 與 BP 表示）即觀察當時顏色，用肉眼鑑定之。

(8) 稃尖色 (Color of apiculus)

在抽穗期及成熟後分別調查兩次，用肉眼鑑定，成熟後分爲有色「○」(Coloured) 與無色「×」(Colourless)。抽穗期依當時顏色記載，可分爲淡綠 LGn (Light Green)，紫紅 RP (Reddish Purple) 與紫黑 BP (Blackish Purple)。

(9) 稃色（穎色）(Color of lemma)

a 藁黃色：(Yellow Straw) 以「YS」記號表示。

b 灰黃色：(White Straw) 「WS」記號表示。

c 金黃色：(Gold) 以「G」記號表示。

d 淡金黃：(Light Gold) 以「LGd」表示。

e 黃　褐：(Brown Furrows) 以「BF」表示。

f 紅　褐：(Reddish Brown) 以「RB」表示。

g 紫　褐：(Dark Purple) 以「DP」表示。

(二) 生理的特性：

(1) 抗病性檢定

a 稻熱病 (Blast)

所有稻品種於民國五十一年第一期作，於本所病理系，舉行稻熱病苗期接種檢定，根據此檢定所選出之抗病品種，再委托嘉義分所在天然發病環境下，進一步測定其葉稻熱病與穗頸稻熱病，調查之標準如下：

苗稻熱病：(Seedling blast)

O：無病斑 (No infection)

R：小斑點或小病斑 (Resistant)

M：各種形性的病斑 (Moderate)

S 大型方錘形或類似的形狀 (Susceptible)

葉稻熱病 (Leaf blast) 依其罹病程度，分爲五個等級。

0＝極抗 (Very highly resistant)。　3＝中感 (Moderately Susceptible)

1＝抗病 (Highly resistant)。　4＝感染 (Susceptible)。

2＝中抗 (Moderately resistant)。　5＝極感 (Very susceptible)。

穗頸稻熱病 (neck blast)，即每品種之總穗數，被罹病穗數除，即得罹病率，用%表示，其標準爲：

0－10＝極抗 (Very highly resistant)　51－70＝中感 (Moderately Susceptible(

11—30＝抗病 (Highly resistant)　71—90＝感染 (Susceptible)

31—50＝中抗 (Moderately resistant)　91—100＝極感 (Very susceptible)

b 紋枯病 (Sheath blight spot of rice plant)

此項試驗係在民國51年，第二期作舉行，先以病原菌培養於蔗糖稻藁培養基，採用田間接種方式，接種之時期，水稻移植後35天，即將切斷而病原菌已長滿之稻藁，夾於每一稻叢中，並於出穗後成熟前，以每品種爲單位，調查被害率（%表示）；自基部割下，調查爲害程度。

紋枯病被害度計算公式如下：

$$H(\%)=\frac{3n_1+2n_2+1n_3+0n_4}{3N}\times 100$$

$N=n_1+n_2+n_3+n_4$（調查總莖本數）

n_1＝劍葉（止葉）第2，3，4葉之各葉鞘或葉身上，有形成病斑者。

n_2＝第2，3及4葉之各葉鞘或葉身上，有形成病斑者。

n_3＝第3及4葉或以下葉鞘或葉身上，有形成病斑者。

n_4＝任何葉鞘或葉身，均無病斑，即健全基本數。

(2) 抗倒伏性 (Lodging resistance)

倒伏性於成熟期調查，分爲倒伏（"—" Lodged），斜（"／"Bending）及直立（"|"Erect）三種。

(3) 耐旱性檢定 (Drought resistant)

採用幼苗檢定法：即種子依消毒，催芽等程序，每一品種取出40粒，置於發芽皿內，令其發芽，等到幼苗長出2－3公分長時，用0.2%之 $kclc_3$ (Potassium Chlorate) 溶液處理十天，則根據其發生病斑以及枯死數目之多寡，分爲極强、强、中等、弱、極弱等五個等級。其分別用下列記號表示：

－：極强 (Little or no injury)。　卄：弱 (Much injury)。

±：强 (Slight injury)。　d：極弱 (Dead or nearly dead)。

＋：中等 (Moderate injury)。

(4) 脫粒性 (Shattering habit)

採用「穗重」五個主穗爲材料，即將該五個稻穗置於一公尺長，30公分寬，一邊5公分高的傾斜木板之2/3處上，（由高的一端數起）則用1.5公斤重，25公分長之圓筒鐵棒滾動三次，稱其脫粒種子重量之百分率，用%表示。

(5) 出穗期 (Date of heading)

當供試品種，出穗達50%時，記載其日期。

(三) 穀粒的特性

(1) 穀粒形狀

用幻燈機 (Projector) 放大測定，量10粒穀子之長及寬，然後平均之，長度被寬除而得之。

(2) 胚乳性質 (Endosperm)

分爲粳性 Gl (Non-glutinous) 及糯性 gl (glutinous) 二種。

(四) 肥料反應試驗 (Response to Nitrogen)

各品種耐肥性之調查標準，係按照有效分蘗、穗重、倒伏性等特性而決定。依其耐肥程度，可分爲極强、强、中、弱、極弱等五個不同等級，其標準如下：

(1) 極强 (Very high N. response)，各品種之理論產量（有效分蘗×穗重）則依氮肥之增施而有顯著之增加，氮肥1/2之增施理論產量高於一般施肥量，倍增量施高於1/2增施量，且其植株仍直立而不倒伏者，以「A」記號代表之。

(2) 强 (high response)：各品種之理論產量，依氮肥之增施而有顯著之增加，但不抗倒伏者。以「B」代表之。

(3) 中 (response)：氮肥1/2增施量之各品種理論產量高於一般施肥量，與加倍增施量者，以「C」代表之。

(4) 弱 (Low response)：各品種之理論產量，依氮肥之增施，而呈遞減現象，且其植株在一般施肥之條件下不倒伏者以「D」代表之。

(5) 極弱 (Very Low response)：各品種之理論產量，不但因氮量之增施而有減少現象，且該品種在一般施肥量之環境下亦易倒伏者，以「E」代表之。

(6) 不定 (Uncertain)：各品種之理論產量，由於施氮量之增減，呈一種不規則狀態，即普通與加倍施氮量之理論產量皆高於1/2增施量者屬之。以「△」記號代表之。

4 播種期：

表二、供試各類稻種之播種及移植期

Table 2. Date of Sowing and Transplanting in 1961 and 1962

作期別	期	日期	民國 50 年	日期	民國 51 年
第一期作	播種期	19/1	蓬萊各類稻種。	26/1	日本引進以及蓬萊各類稻種。
		20/2	大陸引進稻，本省在來各類稻種以及南方稻	27/1	大陸稻。
		3/3	日本引進之各類稻、韓國稻、美國稻、以及本省高山稻等。	19/2	本省在來各類稻以及山地稻、南方稻、美國稻與大陸糯稻。
	移植期	17/3	蓬萊各類的稻種。	5/3	日本引進與蓬萊各類稻種。
		24/3	大陸引進稻；本省在來各類的稻種。	10/3	大陸稻。
		27/3	日本引進之各類稻、韓國稻、美國、稻南方稻以及本省高山等稻。	16/3	本省在來各類以及山地稻、美國稻；南方稻以及大陸糯稻。
中間作			第一批自南1號至282號5月15日播種6月14日移植。第二批自南283至410號6月3日播種，7月8日移植。		南方稻之中間作5月22日播種；6月20日移植。
第二期作	播種期	24/7	日本引進之各類稻種。		參加二期肥料反應品種於7月18與19兩日播種，並於8月8；9兩日移植。
		20/7	日本引進之各類稻種以外之品種。		
	移植期	9/8	日本引進之各類稻種。		
		8/8	日本引進各類稻種以外之品種。		
註備			本年度以品種特性調查為主。		本年度以品種肥料反應試驗為主。

四、調查結果(Results)

表三：保存稻種之特性調查結果表

Table 3. Results of Investigation of Preserved Rice Varieties

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	98.6	103.8	111.4	107.6	101.4	91.6	106.8	106.2	108.4	111.8
①株高 ③第二期	83.8	99.0	102.3	101.4	93.1	81.3	91.0	94.6	95.8	102.3
④有效分蘖 ②第一期	16.4	12.0	13.0	12.6	13.2	14.8	14.8	14.4	14.6	13.6
④有效分蘖 ③第二期	14.4	10.2	11.2	11.6	10.8	13.0	12.8	12.2	12.8	14.8
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.42	2.90	3.68	3.88	2.64	1.76	2.62	2.90	3.10	2.94
⑧芒	R L	—	—	—	—	R S	—	R M	R M	P M
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	○	○	×	○	○	○	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_5	S_3	S_5	S_6	S_7	S_2	S_6	S_5	S_4	S_7
⑮葉稻熱病		3				4				
⑯穗頸稻熱病		15				0				
⑰紋枯病 ⑱被害率%	43.1	41.4	19.4	24.0	24.7	33.5	41.1	30.8	26.5	19.3
⑰紋枯病 ⑲被害度%	20.0	7.7	3.7	2.9	3.9	14.0	4.2	5.5	14.3	5.0
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	／
㉑耐旱性	±	+	—	+	d	+	d	+	±	卄
㉒耐肥性	C	C	C	C	C	C	B	C	C	△
㉓脫粒性	9.9	7.6	15.7	16.2	14.7	15.6	12.3	∠1	14.7	13.7
㉔出穗期 ②第一期	6.14	6.16	6.5	6.10	6.3	6.12	6.11	6.14	6.11	6.11
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.9	10.15	10.6	10.10	9.28	10.6	10.11	10.16	10.14	10.12
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.44	2.09	2.02	2.04	2.11	1.98	2.03	2.02	2.06	2.02
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調査項目 Items \ 品種代號 Variety Number	12	13	14	15	16	17	18	19	41	42
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	103.8	106.4	113.4	101.6	101.0	103.6	106.8	106.2	105.6	105.2
①株高 ③第二期	99.8	96.4	105.3	100.3	96.3	91.6	93.0	101.8	108.2	103.4
④有效分蘖 ②第一期	11.6	12.8	11.0	10.0	11.8	13.0	12.4	12.4	10.4	11.4
④有效分蘖 ③第二期	10.4	13.0	9.5	8.4	11.9	11.2	11.0	11.7	7.7	11.1
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	4.30	3.66	3.64	3.92	1.64	3.30	3.16	3.36	2.52	3.50
⑧芒	—	—	—	—	R S	—	—	—	R M	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	P	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_7	S_6	S_1	S_2	S_5	S_7	S_7	S_7	S_5	S_6
⑮葉稻熱病			4	3						
⑯穗頸稻熱病			100	95						
⑰紋枯病 ⑱被害率%	37.9	48.6	32.5	45.6	24.3	39.9	43.1	44.0	22.1	27.4
⑰紋枯病 ⑲被害度%	26.1	3.8	18.4	5.9	17.9	18.4	15.3	19.9	17.1	18.3
⑳倒伏性	／	／	／	／	／	／	／	／	／	｜
㉑耐旱性	d	⧺	＋	±	＋	⧺	⧺	＋	＋	d
㉒耐肥性	C	C	D	D	C	B	△	C	D	△
㉓脫粒性	12.8	14.0	14.7	18.0	2.04	16.0	13.1	10.1	∠1	12.3
㉔出穗期 ②第一期	6.11	6.12	6.7	6.6	6.9	6.10	6.10	6.9	6.7	6.9
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.9	10.7	10.5	10.6	10.13	10.11	10.8	10.12	10.15	10.9
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.00	2.12	2.17	2.16	2.05	2.05	2.09	2.05	2. 11	2.12
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調査項目 Items \ 品種代號 Variety Number	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	96.8	102.8	102.8	118.0	102.2	104.6	107.2	115.2	96.2	111.0	104.6	107.4	105.8
①株高 ③第二期	97.6	97.7	97.2	111.0	100.4	93.2	98.1	103.2	89.6	104.2	108.6	108.8	97.7
④有效分蘖 ②第一期	11.6	12.0	12.4	10.6	12.0	13.2	12.4	12.6	10.8	10.0	10.6	10.4	9.4
④有效分蘖 ③第二期	10.2	10.0	10.4	9.4	7.9	11.8	9.3	13.0	11.1	12.2	9.7	8.8	8.0
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.66	3.12	3.32	3.82	4.04	3.66	3.84	2.46	2.36	3.44	4.08	2.70	4.08
⑧芒	—	R S	—	—	—	—	—	R M	R M	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	R P	R P	R P	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	○	○	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_6	S_5	S_4	S_3	S_6	S_6	S_4	S_6	S_7	S_7	S_7	S_7	S_5
⑮葉稻熱病				4									
⑯穗頸稻熱病				90									
⑰紋枯病 ⑱被害率%	49.2	30.2	26.2	11.0	28.0	42.5	13.7	17.3	41.4	55.3	27.8	22.4	29.2
⑰紋枯病 ⑲被害度%	15.3	8.6	15.9	10.1	20.4	17.3	4.2	15.2	33.9	11.3	17.3	16.2	27.1
⑳倒伏性	｜	｜	｜	／	／	／	／	／	／	｜	｜	｜	｜
㉑耐旱性	—	＋	⧺	±	⧺	⧺	±	d	＋	d	＋	d	d
㉒耐肥性	C	C	C	B	D	D	D	△	D	C	C	C	D
㉓脫粒性	15.6	14.2	3.0	2.6	12.4	4.9	11.5	7.2	∠1	15.9	18.0	8.9	17.0
㉔出穗期 ②第一期	6.9	6.9	6.13	6.13	6.3	6.13	6.12	6.10	5.28	6.11	6.2	6.17	6.6
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.10	10.8	10.11	10.13	9.28	10.7	10.5	10.18	9.18	10.12	10.4	10.4	10.5
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	1.97	2.02	2.04	2.14	2.39	2.06	2.04	2.01	2.23	1.94	2.08	2.10	1.97
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	119.2	123.2	105.4	101.0	104.6	107.4	121.6	92.2	81.6	103.6
①株高 ③第二期	110.5	111.8	95.6	92.6	98.2	101.6	109.7	86.9	90.6	103.6
④有效分蘗 ②第一期	10.6	9.4	11.6	10.6	11.8	10.2	10.0	12.6	13.6	9.8
④有效分蘗 ③第二期	8.4	6.8	10.0	8.6	9.0	13.8	10.8	13.3	11.1	8.6
⑤葉色	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.86	4.10	3.84	3.90	2.92	2.58	2.02	2.60	2.54	3.16
⑧芒	—	RM	—	—	—	—	—	RM	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	P	L Gn	L Gn	P	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○
⑬稃色	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_5	S_7	S_7	S_6	S_5	S_6	S_7	S_6	S_6	S_5
⑮葉稻熱病										
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%	26.7	19.3	33.8	45.2	20.3	14.9	33.8	34.1	29.0	21.6
⑰紋枯病 ⑲被害度%	17.5	15.7	15.5	5.5	17.8	9.1	31.4	7.1	1.2	3.1
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	±	±	±	±	±	+	−	+	d	d
㉒耐肥性	C	B	B	C	C	C	△	D	D	C
㉓脫粒性	10.4	∠1	14.7	∠1	12.0	13.0	15.8	20.0	10.8	15.5
㉔出穗期 ②第一期	6.13	6.5	6.10	6.12	6.11	6.2	6.4	6.4	5.21	5.24
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.7	9.30	10.12	10.14	10.8	9.28	9.30	9.28	9.24	9.29
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.14	2.34	1.92	2.02	2.01	2.06	1.96	2.20	2.37	2.11
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	66	67	68	69	70	73	74	75	76	77	78	79	80
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	94.8	106.0	110.2	124.0	112.0	108.0	106.4	103.4	104.6	110.8	108.8	100.8	100.2
①株高 ③第二期	97.4	103.5	99.2	112.0	99.4	95.4	95.6	92.2	101.4	105.0	99.4	88.4	95.2
④有效分蘗 ②第一期	10.0	10.8	10.4	13.6	12.8	12.8	13.2	13.0	11.4	11.4	10.6	11.8	12.6
④有效分蘗 ③第二期	8.6	10.8	8.4	11.4	11.0	12.8	11.2	10.8	12.4	10.5	12.2	12.2	14.0
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.60	2.98	2.82	2.48	2.94	3.62	3.14	2.96	3.46	3.44	3.52	2.78	2.86
⑧芒	—	PM	PM	PM	RM	—	PM	—	—	—	—		—
⑨柱頭色	W	W	RP	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	RP	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
⑬稃色	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_3	S_4	S_7	S_3	S_4	S_6	S_5	S_4	S_5	S_4	S_4	S_5	S_1
⑮葉稻熱病	3			4									3
⑯穗頸稻熱病	100			100									90
⑰紋枯病 ⑱被害率%	55.7	51.8	71.7	62.7	51.9	48.8	42.9	59.6	59.4	62.4	56.3	47.8	47.1
⑰紋枯病 ⑲被害度%	27.2	16.3	33.3	23.1	7.0	12.5	17.4	20.4	6.8	12.1	8.0	5.6	11.6
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	/	/	|	|	|	/	/	/
㉑耐旱性	卄	±	−	±	+	±	±	卄	卄	−	d	±	±
㉒耐肥性	△	D	C	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D
㉓脫粒性	13.2	∠1	2.8	5.6	10.6	14.8	14.7	12.2	10.6	14.2	16.8	∠1	∠1
㉔出穗期 ②第一期	5.30	6.11	6.5	6.13	6.13	6.10	6.11	6.11	6.10	6.10	6.12	6.11	6.11
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	9.27	10.6	10.5	10.11	10.11	10.10	10.10	10.11	10.11	10.14	10.12	10.11	10.12
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.12	1.99	2.06	2.23	1.99	2.05	2.06	2.03	2.06	2.10	2.07	2.13	2.08
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	101.2	94.8	104.2	106.0	108.4	105.0	105.2	108.2	116.8	107.6
①株高 ③第二期	92.6	89.0	95.6	104.6	104.0	96.6	97.4	107.2	107.2	100.2
④有效分蘖 ②第一期	13.8	14.2	14.2	9.4	12.6	13.2	12.6	10.8	9.8	11.2
④有效分蘖 ③第二期	12.4	15.4	11.6	10.3	11.2	15.0	11.6	11.3	11.4	13.4
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.38	2.36	2.52	4.68	3.58	3.30	3.92	3.30	3.22	3.34
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_3	S_3	S_3	S_3	S_3	S_5	S_1	S_5	S_5	S_3
⑮葉稻熱病	3	4	4	3	3					3
⑯穗頸稻熱病	100	100	20	20	10					100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	47.9	41.2	56.3	62.6	32.1	51.2	50.2	41.9	53.1	56.8
⑰紋枯病 ⑲被害度%	28.9	37.1	23.3	19.2	17.9	20.4	25.1	11.3	11.9	22.5
⑳倒伏性	／	／	／	／	／	／	／	／	|	|
㉑耐旱性	−	−	±	±	+	±	±	+	+	−
㉒耐肥性	B	C	C	C	C	C	D	D	C	D
㉓脫粒性	∠1	∠1	∠1	9.0	10.6	11.9	10.2	5.5	11.0	12.4
㉔出穗期 ②第一期	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.12	6.12	6.11	6.13	6.10
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.11	10.6	10.8	10.10	10.8	10.14	10.10	10.13	10.14	10.11
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.13	2.07	2.09	2.06	3.04	2.01	2.08	1.94	2.03	2.09
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	96.8	115.4	108.9	118.8	111.2	110.6	117.0	112.6	110.0	111.0	109.2	102.4	109.6
①株高 ③第二期	95.2	106.2	97.8	108.5	103.5	102.0	111.4	101.7	98.0	101.6	100.1	100.3	102.8
④有效分蘖 ②第一期	11.6	12.4	11.0	9.4	11.8	12.6	9.6	11.0	11.2	12.0	10.2	12.2	12.2
④有效分蘖 ③第二期	10.5	10.0	12.6	10.2	9.8	12.4	9.4	10.6	11.2	10.4	11.2	11.7	14.0
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.86	3.16	3.86	4.52	4.40	3.16	4.40	3.74	4.14	3.64	4.06	3.42	3.70
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	B F	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_3	S_1	S_3	S_4	S_4	S_3	S_3	S_1	S_1	S_2	S_4	S_4	S_5
⑮葉稻熱病	4	3	4			4	4	3	3	3			
⑯穗頸稻熱病	100	5	100			100	100	10	80	65			
⑰紋枯病 ⑱被害率%	54.1	57.8	54.6	51.6	49.0	51.3	50.0	63.3	56.8	43.9	26.4	46.5	55.9
⑰紋枯病 ⑲被害度%	39.8	11.1	19.0	16.8	5.6	11.8	12.0	26.6	2.4	13.1	11.1	20.6	22.9
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	±	++	++	++	+	±	+	−	±	+	d	±	++
㉒耐肥性	D	C	C	D	C	C	D	D	D	C	C	D	D
㉓脫粒性	19.0	21.5	6.2	11.5	15.2	11.3	8.2	10.8	10.1	12.3	15.7	12.8	3.2
㉔出穗期 ②第一期	6.9	6.16	6.11	6.12	6.12	6.13	6.12	6.10	6.12	6.13	6.9	6.10	6.12
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	9.28	10.13	10.11	10.11	10.12	10.15	10.9	10.3	10.12	10.4	10.12	10.12	10.13
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.12	2.11	2.04	1.98	2.03	2.13	2.49	2.07	1.99	1.94	1.99	2.09	1.95
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調査項目 Items \ 品種代號 Variety Number	104	105	106	107	108	109	110	112	113
一、形態的特性									
①株高 ②第一期	103.6	103.6	97.8	111.8	116.0	107.8	107.2	108.8	108.2
①株高 ③第二期	95.8	105.0	90.0	104.8	105.4	103.3	105.2	106.4	100.6
④有效分蘗 ②第一期	12.6	9.4	13.8	13.4	12.4	11.8	10.4	12.4	17.0
④有效分蘗 ③第二期	10.8	10.0	13.6	14.4	12.8	10.8	11.9	11.6	11.4
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.54	3.90	3.24	3.18	2.94	3.70	3.94	4.60	3.44
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	×	○	○	×	○	○	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性									
⑭幼苗稻熱病	S_2	S_3	S_4	S_1	S_3	S_3	S_5	S_7	S_6
⑮葉稻熱病	3	3			4	4			
⑯穗頸稻熱病	50	20			80	100			
⑰紋枯病 ⑱被害率%	49.8	45.3	45.3	41.8	24.9	51.0	40.5	61.1	44.5
⑰紋枯病 ⑲被害度%	10.6	11.8	11.6	9.8	13.2	6.3	16.8	6.1	30.3
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	+	+	±	d	—	±	d	卄	d
㉒耐肥性	C	D	D	C	C	C	C	D	C
㉓脫粒性	13.4	6.2	9.9	11.2	10.6	15.0	13.3	6.5	16.7
㉔出穗期 ②第一期	6.11	6.7	6.10	6.10	6.10	6.6	6.9	6.11	6.11
㉔出穗期 ㉕中間作									
㉔出穗期 ③第二期	10.11	10.7	10.7	10.8	10.7	10.6	10.9	10.12	10.11
三、穀粒的特性									
㉖穀粒形狀	1.91	2.00	1.98	2.05	2.08	2.08	2.09	2.00	2.13
㉗胚乳性質	Cl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考									

調査項目 Items \ 品種代號 Variety Number	122	124	126	127	128	129	130	131	133	134	136	138	139
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	118.8	112.0	113.2	101.2	103.4	109.6	104.6	111.6	106.8	111.4	114.2	111.6	104.2
①株高 ③第二期	114.6	111.4	112.3	93.0	96.4	107.6	100.8	108.8	105.8	110.4	107.0	101.8	99.8
④有效分蘗 ②第一期	11.0	13.0	14.4	11.0	15.0	12.4	17.8	14.2	13.0	12.8	11.8	10.2	10.4
④有效分蘗 ③第二期	10.2	10.2	12.3	13.2	10.4	12.4	15.4	12.4	11.4	11.2	11.4	8.9	9.2
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.14	5.06	3.36	2.72	3.26	3.50	2.80	3.78	3.86	3.32	3.42	3.38	4.10
⑧芒	—	—	—	—	—	—	RM	RM	—	RM	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	○	×	×	○	○	×	○	○	○	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_4	S_5	S_6	S_5	S_4	S_3	S_5	S_3	S_6	S_7	S_7	S_6	S_4
⑮葉稻熱病						3		4					
⑯穗頸稻熱病						10		100					
⑰紋枯病 ⑱被害率%	49.9	57.6	49.1	43.8	59.4	63.6	46.0	42.7	42.7	50.4	56.5	40.1	46.6
⑰紋枯病 ⑲被害度%	17.5	20.9	14.7	20.8	5.2	14.7	22.2	17.6	17.6	50.2	7.8	19.4	15.8
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	卄	—	—	卄	±	+	+	+	卄	d	卄	卄	+
㉒耐肥性	D	C	D	D	B	D	C	D	C	C	D	C	B
㉓脫粒性	8.9	13.2	12.9	17.9	10.7	8.0	14.2	8.9	5.2	10.2	8.8	7.7	14.6
㉔出穗期 ②第一期	6.11	6.11	6.9	6.11	6.12	6.11	6.13	6.11	6.12	6.11	6.11	6.12	6.11
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.9	10.6	10.16	10.12	10.11	10.12	10.11	10.9	10.11	10.9	10.10	10.10	10.11
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.20	2.12	2.16	2.08	2.11	2.01	2.12	2.13	2.09	2.16	2.18	2.04	2.04
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number	140	141	142	143	141	145	146	147	148	149
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	109.2	101.4	106.2	105.4	112.0	109.6	105.6	110.0	110.8	105.0
①株高 ③第二期	97.6	101.8	103.8	100.2	101.0	107.4	99.6	103.2	101.4	91.4
④有效分蘖 ②第一期	11.0	11.6	11.8	15.0	12.6	13.6	12.8	11.4	12.0	14.4
④有效分蘖 ③第二期	8.8	9.8	11.2	12.2	10.6	14.2	12.2	12.4	10.0	12.4
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.94	3.58	3.86	3.84	2.64	3.18	3.88	3.88	4.14	4.18
⑧芒	RM	—	—	—	RM	—	—	—	—	RM
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	○	×	○	○	×	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_5	S_3	S_3	S_4	S_4	S_5	S_5	S_3	S_6	S_5
⑮葉稻熱病		5	4					4		
⑯穗頸稻熱病		100	100					100		
⑰紋枯病 ⑱被害率%	41.8	46.6	46.1	61.7	58.6	53.4	73.0	58.0	68.9	55.6
⑰紋枯病 ⑲被害度%	10.8	11.0	21.2	12.5	21.8	9.8	21.9	27.5	23.6	15.3
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	++	d	d	++	+	d	+	++	d	d
㉒耐肥性	C	C	C	C	C	C	B	C	C	D
㉓脫粒性	11.9	13.8	11.9	10.4	11.2	11.2	11.9	9.3	13.8	11.9
㉔出穗期 ②第一期	6.12	6.12	6.13	6.12	6.61	6.13	6.11	6.12	6.11	6.12
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.12	10.12	10.13	10.11	10.11	10.12	10.9	10.10	10.10	10.9
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.11	2.11	2.08	2.14	2.12	2.10	2.07	2.13	2.03	2.14
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number	150	151	152	153	154	155	156	157	158	160	162	163	164
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	102.2	103.6	107.0	108.8	119.4	103.2	104.2	101.4	110.6	103.4	108.4	114.4	107.6
①株高 ③第二期	94.8	108.2	97.4	96.6	110.6	93.8	99.4	99.0	100.4	85.6	95.6	103.6	97.2
④有效分蘖 ②第一期	14.8	11.4	13.0	14.8	11.0	12.2	12.6	12.8	12.4	12.4	11.6	9.6	10.8
④有效分蘖 ③第二期	15.4	12.6	14.0	13.4	9.2	11.8	10.2	9.8	10.0	11.6	10.6	11.4	9.0
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.84	3.18	4.56	2.92	3.42	3.62	3.94	3.46	3.52	4.02	4.02	2.88	3.28
⑧芒	—	—	RM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_3	S_5	S_5	S_5	S_4	S_4	S_3	S_5	S_5	S_4	S_4	S_5	S_5
⑮葉稻熱病	4						4						
⑯穗頸稻熱病	90						95						
⑰紋枯病 ⑱被害率%	50.7	53.8	56.8	54.7	58.5	49.0	71.0	70.6	61.4	79.0	11.4	39.0	43.2
⑰紋枯病 ⑲被害度%	41.9	22.4	24.3	13.8	19.9	12.2	32.3	13.1	26.4	32.6	6.0	2.9	7.9
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	d	++	+	+	+	+	++	±	±	±	±	+	+
㉒耐肥性	B	C	C	D	C	C	D	C	B	C	D	C	D
㉓脫粒性	12.1	11.9	11.7	10.9	11.1	9.9	12.2	13.7	12.0	6.0	11.9	11.8	10.4
㉔出穗期 ②第一期	6.12	6.12	6.15	6.17	6.14	6.12	6.14	6.13	6.11	6.12	6.11	6.12	6.14
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.11	10.9	10.10	10.7	10.7	10.9	10.11	10.10	10.6	10.14	10.9	10.7	10.10
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	1.97	1.98	2.02	2.04	2.15	1.97	2.11	2.00	2.05	1.96	2.04	2.08	2.06
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	165	166	167	169	170	171	172	173	174	175
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	106.2	165.8	103.4	111.6	107.2	108.6	105.0	105.2	116.2	110.0
①株高 ③第二期	101.8	100.4	103.8	101.9	95.0	100.6	101.4	116.8	103.2	102.2
④有效分蘖 ②第一期	10.6	12.2	12.0	11.0	11.2	10.4	12.4	15.2	12.6	12.2
④有效分蘖 ③第二期	7.0	11.4	9.8	7.4	10.4	8.0	11.8	12.8	10.2	12.8
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.52	3.66	3.86	2.94	3.44	3.08	3.52	3.58	2.98	3.04
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	×	×	×	×	○	○	○	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_5	S_6	S_6	S_5	S_4	S_5	S_6	S_6	S_5	S_6
⑮葉稻熱病										
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%	46.5	46.7	56.4	68.0	79.5	41.3	50.6	59.3	55.3	59.7
⑰紋枯病 ⑲被害度%	13.1	18.6	24.4	22.1	20.4	15.3	25.3	33.3	19.6	5.8
⑳倒伏性	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜
㉑耐旱性	d	d	d	d	⧺	+	+	⧺	⧺	—
㉒耐肥性	C	C	C	C	C	D	C	D	C	C
㉓脫粒性	12.8	10.9	13.1	11.9	9.9	13.0	4.5	10.6	11.8	8.6
㉔出穗期 ②第一期	6.12	6.12	6.12	6.13	6.11	6.11	6.11	6.12	6.13	6.18
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.13	10.9	10.11	10.10	10.11	10.13	10.10	10.10	10.11	10.14
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.11	2.03	2.07	2.11	2.02	2.10	2.08	2.09	2.14	1.96
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	113.6	116.8	105.6	108.8	114.2	106.8	104.4	103.0	116.2	103.2	113.0	115.6	103.0
①株高 ③第二期	100.9	107.2	96.2	104.2	102.6	93.4	93.5	93.8	111.0	99.6	107.2	109.0	103.0
④有效分蘖 ②第一期	11.4	13.0	10.6	11.6	14.4	14.4	12.0	12.6	8.6	13.4	13.4	13.2	12.0
④有效分蘖 ③第二期	10.2	13.2	9.8	9.0	12.4	11.4	9.2	10.6	9.8	13.6	11.8	10.4	9.0
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.70	2.82	2.90	3.10	3.06	3.52	2.54	3.02	3.70	3.48	2.72	3.66	2.82
⑧芒	—	—	—	—	—	R S	R S	R S	—	R S	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	×	×	×	○	○	○	×	○	×	×	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_7	S_6	S_4	S_5	S_4	S_5	S_5	S_4	S_4	S_6	S_5	S_7	S_6
⑮葉稻熱病													
⑯穗頸稻熱病													
⑰紋枯病 ⑱被害率%	48.2	56.1	61.9	48.5	50.4	58.6	33.8	56.4	54.9	32.7	44.7	39.5	68.9
⑰紋枯病 ⑲被害度%	8.8	28.7	33.3	27.1	12.3	11.5	33.3	6.9	6.1	9.4	8.0	4.1	25.5
⑳倒伏性	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜
㉑耐旱性	d	+	+	±	+	+	⧺	+	d	⧺	+	d	±
㉒耐肥性	D	C	D	D	C	D	C	C	C	D	C	△	C
㉓脫粒性	13.3	15.0	6.2	6.5	5.4	10.2	7.9	3.3	10.8	10.3	9.6	6.0	11.5
㉔出穗期 ②第一期	6.12	6.16	6.12	6.14	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.10	6.12	6.12
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.10	10.11	10.10	10.11	10.12	10.12	10.11	10.12	10.12	10.11	10.12	10.13	10.12
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.13	2.21	2.07	1.97	1.94	1.99	2.03	1.99	2.10	1.94	1.94	2.17	2.04
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number		189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
一、形態的特性											
①株高	②第一期	107.4	103.6	102.8	106.2	113.0	108.6	112.0	109.6	105.8	123.0
	③第二期	113.2	90.8	93.2	101.0	103.2	100.0	102.2	99.0	95.6	110.2
④有效分蘖	②第一期	11.4	13.0	13.6	14.6	13.2	13.4	12.4	12.4	14.2	13.0
	③第二期	12.4	11.2	11.0	12.0	10.6	14.2	12.8	10.4	14.8	12.2
⑤葉色		D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)		3.96	2.94	3.74	3.64	3.18	3.98	3.86	3.70	3.50	3.30
⑧芒		—	PM	PM	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
	⑫已熟	×	○	○	○	×	○	○	○	×	×
⑬稃色		Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		S_6	S_7	S_5	S_4	R_3S_3	S_6	S_4	S_4	S_4	S_6
⑮葉稻熱病						3					
⑯穗頸稻熱病						100					
⑰紋枯病	⑱被害率%	42.2	55.5	60.4	58.3	52.8	30.7	46.4	63.0	63.0	67.1
	⑲被害度%	13.8	16.5	16.0	23.9	12.0	13.0	10.6	20.1	15.9	22.0
⑳倒伏性		|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性		±	+	±	卄	d	±	d	d	d	d
㉒耐肥性		C	B	D	D	D	C	D	C	C	D
㉓脫粒性		11.4	10.2	10.7	8.8	2.5	8.5	12.0	4.8	9.1	11.5
㉔出穗期	②第一期	6.12	6.12	6.12	6.10	6.13	6.12	6.12	6.10	6.16	6.13
	㉕中間作										
	③第二期	10.11	10.11	10.9	10.9	10.11	10.11	10.12	10.7	10.10	10.9
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		2.05	2.01	1.96	2.14	2.18	2.02	2.04	1.93	1.98	2.22
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考											

		199	200	201	202	203	204	205	207	208	209	210	211	212
一、形態的特性														
①株高	②第一期	112.6	126.0	117.6	123.6	124.6	108.8	116.8	115.8	115.8	112.4	113.8	115.4	110.8
	③第二期	96.2	112.2	106.2	108.4	105.6	103.2	105.0	102.6	106.3	104.0	96.8	108.5	102.6
④有效分蘖	②第一期	13.8	13.8	13.0	14.0	14.0	12.0	12.4	11.6	13.2	10.0	10.4	10.2	12.2
	③第二期	11.4	11.8	11.8	11.4	12.2	13.6	11.2	10.4	11.0	11.6	11.8	9.8	9.2
⑤葉色		D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)		3.30	4.18	3.54	3.20	4.38	4.28	3.74	4.42	3.88	3.98	3.84	4.10	3.04
⑧芒		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	RM	RM
⑨柱頭色		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
	⑫已熟	○	×	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×
⑬稃色		Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性														
⑭幼苗稻熱病		S_5	S_4	S_5	S_4	S_6	S_6	S_6	S_7	S_5	S_4	S_1	S_4	S_4
⑮葉稻熱病														
⑯穗頸稻熱病														
⑰紋枯病	⑱被害率%	59.2	66.9	66.9	58.5	55.9	56.9	42.9	30.0	44.3	41.2	49.8	67.9	65.1
	⑲被害度%	13.1	29.2	22.9	11.4	21.5	6.5	2.8	10.6	13.3	35.5	15.5	29.3	25.0
⑳倒伏性		|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性		卄	d	+	卄	+	卄	卄	+	卄	卄	±	±	d
㉒耐肥性		D	B	C	B	B	△	D	B	B	B	C	D	C
㉓脫粒性		8.3	13.2	12.8	11.1	12.1	17.7	11.3	8.6	9.3	11.1	12.6	7.3	11.5
㉔出穗期	②第一期	6.16	6.16	6.13	6.18	6.18	6.13	6.12	6.11	6.12	6.12	6.12	6.18	6.13
	㉕中間作													
	③第二期	10.11	10.10	10.11	10.6	10.7	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.9	10.15	10.5
三、穀粒的特性														
㉖穀粒形狀		2.01	2.11	2.16	2.12	2.09	2.02	2.02	1.88	2.06	1.93	1.94	2.04	2.04
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考														

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number	213	214	215	216	217	218	219	220	221	223
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	109.2	118.2	102.8	115.8	113.8	100.5	113.4	113.8	120.6	121.8
①株高 ③第二期	105.8	108.2	95.2	100.2	99.8	101.6	100.2	102.2	107.8	111.0
④有效分蘖 ②第一期	12.6	10.4	12.0	11.8	12.8	10.4	10.8	12.4	12.2	12.4
④有效分蘖 ③第二期	10.4	12.0	10.0	13.2	10.2	10.6	11.0	13.8	10.2	11.0
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.90	3.60	3.16	3.58	3.14	3.14	3.92	3.78	3.12	3.34
⑧芒	—	—	—	—	RM	RM	PM	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_5	S_7	S_6	S_4	S_5	S_4	S_4	S_4	S_3	S_5
⑮葉稻熱病									4	
⑯穗頸稻熱病									100	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	82.6	67.9	62.7	81.1	61.1	71.1	54.3	54.7	53.5	38.9
⑰紋枯病 ⑲被害度%	14.8	5.2	10.2	23.0	15.7	16.9	5.4	11.2	12.1	16.9
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	±	+	⧺	±	⧺	±	+	±	⧺	±
㉒耐肥性	B	C	C	C	C	D	D	B	C	B
㉓脫粒性	10.3	11.8	11.7	9.7	7.0	7.6	9.7	11.1	10.9	11.6
㉔出穗期 ②第一期	6.9	6.19	6.17	6.11	6.17	6.25	6.13	6.11	6.12	6.15
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.9	10.6	10.10	10.5	10.6	10.17	10.6	10.9	10.9	10.9
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.06	1.99	2.01	1.94	2.10	1.95	1.98	2.03	2.10	2.08
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number	224	225	226	228	242	244	245	248	249	250	251	252	253
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	123.6	122.7	118.4	112.4	113.6	103.2	103.0	108.2	111.6	110.4	112.0	109.6	118.0
①株高 ③第二期	113.8	112.4	112.0	103.0	94.6	92.6	95.5	98.0	102.4	108.8	105.6	100.5	108.2
④有效分蘖 ②第一期	11.8	14.0	12.2	14.2	13.2	12.0	11.2	12.4	12.2	13.0	13.4	13.0	11.8
④有效分蘖 ③第二期	10.2	13.0	11.8	12.0	10.6	11.7	10.1	11.4	10.2	12.4	13.8	10.0	8.9
⑤葉色	Gn	Gn	D Gn	D Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.18	2.08	16.6	3.02	2.98	2.76	2.76	3.44	2.94	2.86	3.34	3.66	3.34
⑧芒	—	—	—	—	RM	PM	PM	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_7	S_5	S_7	S_6	S_3	S_1	R_2	S_2	S_3	S_4	S_3	S_1R_2	S_2
⑮葉稻熱病					3	3	3	4	4		4	4	
⑯穗頸稻熱病					60	100	100	100	60		100	100	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	52.1	47.6	36.7	61.9	67.8	69.4	46.4	57.4	63.0	63.6	36.0	46.7	79.0
⑰紋枯病 ⑲被害度%	3.8	8.0	0.2	8.1	12.4	7.4	4.7	10.6	10.0	18.5	7.7	9.0	13.2
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	±	±	+	+	±	⧺	⧺	+	⧺	−	±	+	±
㉒耐肥性	B	B	C	C	△	B	B	C	C	B	C	C	C
㉓脫粒性	11.9	14.3	14.7	5.9	11.4	∠1	∠1	11.8	11.9	11.6	9.0	14.7	2.1
㉔出穗期 ②第一期	6.12	6.7	6.11	6.11	6.9	6.5	6.3	6.12	6.9	6.10	6.10	6.9	6.18
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.8	10.15	10.18	10.9	10.5	9.30	9.30	10.9	10.12	10.10	10.10	10.11	10.15
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.08	2.18	2.18	2.12	2.12	2.15	2.18	2.08	1.99	2.08	2.05	2.05	1.99
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	255	256	257	258	259	260	261	262	281	282
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	112.6	113.6	112.4	110.6	114.8	107.6	108.6	111.0	116.2	116.4
①株高 ③第二期	106.7	101.8	101.0	103.8	103.4	100.0	102.6	104.7	102.0	106.1
④有效分蘗 ②第一期	12.8	11.2	13.6	11.8	13.4	12.2	11.4	10.2	11.8	11.8
④有效分蘗 ③第二期	10.8	10.6	12.2	9.1	12.2	10.4	10.8	10.0	11.2	9.4
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	4.76	3.02	2.88	3.56	3.96	3.56	3.74	4.58	3.98	4.88
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	×	○	○	×	×	○	○	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_5	S_3	S_3	S_4	S_4	S_4	S_3	S_3	S_4	S_4
⑮葉稻熱病		4	4				4	3		
⑯穗頸稻熱病		60	20				20	40		
⑰紋枯病 ⑱被害率%	49.3	72.5	75.2	67.4	40.9	72.5	74.3	34.3	49.5	53.6
⑰紋枯病 ⑲被害度%	9.4	19.0	12.4	11.5	14.9	19.5	7.2	8.7	26.5	10.4
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	+	+	++	+	±	+	+	++	±	+
㉒耐肥性	△	D	D	B	C	A	B	C	D	D
㉓脫粒性	13.2	6.2	9.1	3.5	9.2	10.3	9.6	5.2	6.5	6.9
㉔出穗期 ②第一期	6.12	6.10	6.19	6.4	6.11	6.18	6.10	6.10	6.11	6.11
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.16	10.9	10.14	9.29	10.9	10.13	10.11	10.9	10.10	10.14
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.16	1.98	2.03	2.17	2.01	2.01	1.96	2.08	1.99	2.03
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	104.8	123.0	124.4	119.0	124.8	121.8	120.6	118.6	104.4	105.6	102.0	103.0	112.2
①株高 ③第二期	101.3	114.3	110.3	113.5	110.3	108.1	107.7	107.3	92.3	99.6	95.1	96.3	93.2
④有效分蘗 ②第一期	9.8	10.6	8.0	8.0	8.0	8.4	9.2	8.0	11.2	11.2	11.0	11.6	12.2
④有效分蘗 ③第二期	8.5	6.6	7.6	6.5	5.9	5.7	5.4	12.0	8.2	12.6	8.2	8.7	9.7
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	4.80	4.70	4.52	4.70	5.20	4.46	3.94	5.32	3.80	3.86	4.28	4.28	4.02
⑧芒	—	PM	—	—	FS	FS	—	—	—	—	RS	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_5	S_4	S_3	S_3	S_6	S_4	S_2	S_5	S_4	S_3	S_2	S_2	S_3
⑮葉稻熱病			4	4						5		3	
⑯穗頸稻熱病			80	90						100		20	
⑰紋枯病 ⑱被害率%					19.2	45.5	34.7	34.2	39.8	65.2	55.1	52.5	51.4
⑰紋枯病 ⑲被害度%					2.3	8.3	19.0	19.6	10.8	11.9	22.1	19.6	14.1
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	±	±	±	±	±	±	±	±	+	d	d	d	d
㉒耐肥性	C	D	D	△	D	C	△	C	C	B	C	C	D
㉓脫粒性	8.3	8.9	7.3	4.7	5.8	2.2	3.0	12.3	7.4	3.1	4.5	∠1	8.0
㉔出穗期 ②第一期	6.11	6.11	6.12	6.13	6.13	6.13	6.13	6.11	6.10	6.11	6.12	6.12	6.14
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.11	10.12	10.10	10.11	10.17	10.16	10.17	10.9	10.15	10.10	10.10	10.17	10.16
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.04	1.97	1.92	1.95	1.92	1.98	2.02	1.92	2.15	2.03	2.14	2.01	2.10
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	296	297	322	323	325	326	328	329	330	331
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	118.4	110.6	111.2	104.0	104.4	105.8	102.4	103.8	106.8	101.6
①株高 ③第二期	109.6	103.2	102.8	88.0	99.6	97.0	98.7	99.8	93.4	91.4
④有效分蘗 ②第一期	12.4	13.0	11.8	15.2	14.4	13.2	15.8	13.6	14.2	11.2
④有效分蘗 ③第二期	9.0	12.4	9.2	13.0	14.2	12.8	12.4	12.2	11.8	9.8
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.12	3.72	2.88	3.12	2.78	3.22	2.92	3.34	2.58	3.60
⑧芒	—	—	—	—		RM	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	○	×	×	×	×	○	×	○
⑬稃色	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_5	S_4	S_4	S_5	S_7	S_6	S_5	S_7	S_6	S_7
⑮葉稻熱病										
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%	60.0	57.6	44.8	54.8	29.7	42.8	60.8	43.8	66.4	55.5
⑰紋枯病 ⑲被害度%	25.1	19.7	9.6	4.4	24.9	5.9	12.6	14.2	19.2	9.4
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	+	+	±	d	±	++	+	++	±	±
㉒耐肥性	D	A	C	C	D	C	C	△	C	C
㉓脫粒性	15.5	1.1	11.6	5.8	12.8	14.0	12.4	12.4	7.0	6.7
㉔出穗期 ②第一期	6.14	6.10	6.14	6.12	6.10	6.12	6.7	6.11	6.12	6.14
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.12	10.11	10.9	10.7	10.6	10.7	10.5	10.9	10.7	10.10
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	1.98	2.02	2.02	2.30	2.08	2.17	2.08	2.02	2.01	1.92
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	333	335	336	337	338	339	341	345	346	347	348	349	351
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	117.2	108.8	106.0	109.8	101.4	102.6	107.8	116.4	118.2	115.4	117.0	109.0	107.6
①株高 ③第二期	107.4	100.6	100.0	103.0	91.8	99.4	100.0	103.0	115.0	103.8	105.2	97.2	103.6
④有效分蘗 ②第一期	16.6	10.4	10.8	12.6	11.8	12.4	13.6	15.0	12.8	11.6	12.4	10.0	11.8
④有效分蘗 ③第二期	13.6	8.6	8.6	13.5	10.8	11.0	11.8	13.4	12.4	11.6	11.2	11.6	11.6
⑤葉色	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.68	2.90	3.70	3.50	2.96	3.64	3.22	2.70	4.20	3.34	3.68	4.04	3.82
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	○	○	×	○	○	○	×	×	×	×
⑬稃色	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_7	S_8	S_7	S_6	S_6	S_7	S_7	S_7	S_6	S_7	S_5	S_5	S_4
⑮葉稻熱病													
⑯穗頸稻熱病													
⑰紋枯病 ⑱被害率%	26.2	36.5	18.8	41.2	65.9	47.1	47.2	61.6	41.0	51.6	64.7	45.5	49.5
⑰紋枯病 ⑲被害度%	1.7	13.1	10.5	1.5	26.1	9.9	13.2	14.2	5.0	7.9	24.7	9.6	18.5
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	++	+	—	±	±	±	±	±	±	±	+	+	+
㉒耐肥性	△	C	D	C	C	D	C	C	C	C	C	C	C
㉓脫粒性	15.9	11.0	7.0	9.1	4.6	9.3	9.9	∠1	5.6	6.6	8.7	13.3	21.5
㉔出穗期 ②第一期	6.16	6.13	6.11	6.11	6.10	6.10	6.10	6.10	6.18	6.17	6.17	6.12	6.10
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.11	10.5	10.7	10.16	10.6	10.5	10.10	10.10	10.14	10.14	10.14	10.13	10.9
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.07	1.93	1.95	2.11	1.97	1.91	2.07	2.05	1.99	2.07	2.04	2.11	2.05
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	111.4	110.6	99.8	107.0	111.4	108.8	116.6	112.2	116.8	97.8
①株高 ③第二期	101.0	97.6	91.6	95.6	97.2	101.8	101.9	105.0	109.0	84.1
④有效分蘖 ②第一期	11.2	11.2	12.8	13.4	14.0	11.6	13.0	16.0	13.2	13.6
④有效分蘖 ③第二期	10.6	9.4	12.2	12.8	12.0	10.8	10.6	13.8	12.4	11.9
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Cn	D Cn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Cn	Cn	Gn
⑦穗重（g）	3.70	2.31	3.14	3.28	2.91	3.46	4.12	3.40	4.30	3.10
⑧芒	R S	—	—	P M	P M	P M	P M	R M	R M	R M
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Cn	L Gn	L Cn	L Gn	L Gn	L Cn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	×	○	○	○	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_2	S_3	S_6	S_5	S_5	S_5	S_2	S_4	S_3	S_4
⑮葉稻熱病	3								3	
⑯穗頸稻熱病	50								20	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	29.9	47.5	47.5	41.7	42.7	42.2	27.2	15.9	25.1	25.1
⑰紋枯病 ⑲被害度%	15.5	17.7	17.7	12.1	7.5	34.1	3.6	4.5	6.9	6.9
⑳倒伏性	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜
㉑耐旱性	+	±	±	+	±	+	±	+	+	+
㉒耐肥性	D	C	B	B	D	D	C	B	D	D
㉓脫粒性	7.6	9.5	10.2	5.5	8.4	3.5	4.4	7.6	3.7	19.0
㉔出穗期 ②第一期	6.16	6.21	6.12	6.10	6.17	6.20	6.13	6.10	6.12	5.31
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.10	10.12	10.5	10.7	10.9	10.12	10.13	10.9	10.13	9.28
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.02	2.01	2.01	2.14	2.05	2.09	1.95	2.10	2.10	2.21
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	363	364	365	366	367	368	369	370	371	373	375	376	401
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	123.2	113.0	108.2	107.4	104.6	100.8	102.8	109.6	112.4	102.6	105.4	102.6	110.6
①株高 ③第二期	110.4	104.7	107.2	96.7	100.8	91.3	89.1	99.0	106.8	75.2	99.6	101.1	102.2
④有效分蘖 ②第一期	15.4	15.2	7.6	11.4	11.8	9.6	11.8	12.8	11.8	12.4	8.6	15.4	13.4
④有效分蘖 ③第二期	12.0	13.0	8.7	7.7	10.4	10.6	11.1	10.4	11.2	11.1	11.8	13.8	10.4
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Cn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	D Gn	D Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.02	3.46	5.54	4.22	3.78	3.66	3.88	3.58	2.98	2.84	2.33	3.10	3.48
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R M	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Cn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	○	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_3	S_5	S_4	S_4	S_3	S_5	S_4	S_6	S_2	S_3	S_4	S_4	S_4
⑮葉稻熱病	5				5				3	5			
⑯穗頸稻熱病	60				50				30	100			
⑰紋枯病 ⑱被害率%	24.7	40.8	25.8	65.8	47.8	35.8	54.2	43.0	53.5	68.6	37.2	36.9	50.1
⑰紋枯病 ⑲被害度%	0.8	6.0	5.4	9.8	6.7	33.3	5.1	19.9	17.9	9.0	6.7	10.7	6.7
⑳倒伏性	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜
㉑耐旱性	+	+	±	±	+	+	—	+	+	+	±	+	±
㉒耐肥性	D	C	D	C	D	C	C	C	C	C	C	B	C
㉓脫粒性	10.6	11.9	14.0	4.3	12.9	<1	11.9	13.2	12.1	18.5	1.9	11.3	9.8
㉔出穗期 ②第一期	6.13	6.11	6.17	6.16	6.13	6.6	6.3	6.11	6.10	6.3	6.16	6.8	6.15
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.15	10.11	10.13	10.16	10.9	10.5	10.9	10.16	10.8	9.26	10.11	10.8	10.11
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.12	2.13	1.85	1.95	1.99	1.97	1.97	2.10	1.96	2.17	1.84	2.12	1.98
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number		403	405	407	409	411	413	415	417	419	420
一、形態的特性											
①株　高	②第一期	116.8	101.8	107.4	105.6	110.8	116.4	109.0	106.0	109.2	107.0
	③第二期	113.0	95.8	103.4	100.8	97.2	104.6	102.4	94.2	93.2	97.8
④有效分蘖	②第一期	10.0	11.4	11.2	12.8	14.2	12.0	13.2	12.0	13.4	9.8
	③第二期	9.8	10.2	9.0	10.0	12.6	11.2	10.4	10.8	10.8	10.2
⑤葉色		D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Cn	D Cn	D Cn	D Gn	D Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Cn	Cn
⑦穗重（g）		4.14	4.14	3.42	3.90	3.94	2.76	3.86	3.84	4.32	4.40
⑧芒		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P
	⑫已熟	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
⑬稃色		Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		S_4	S_3	S_5	S_3	S_3	S_4	S_5	S_5	S_3	S_4
⑮葉稻熱病			4		5	5				4	
⑯穗頸稻熱病			90		90	90				20	
⑰紋枯病	⑱被害率%	64.7	66.4	67.3	65.6	61.1	48.6	45.0	70.3	59.0	44.4
	⑲被害度%	14.6	11.5	14.1	6.7	8.4	8.5	10.1	16	11.1	10.4
⑳倒伏性		|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性		+	±	±	±	±	±	+	+	+	+
㉒耐肥性		D	D	C	B	B	C	C	C	C	C
㉓脫粒性		6.7	10.1	6.1	11.8	13.2	10.9	14.1	13.1	12.4	11.2
㉔出穗期	②第一期	6.21	6.13	6.16	6.17	6.11	6.18	6.13	6.12	6.9	6.11
	㉕中間作										
	③第二期	10.14	10.11	10.10	10.10	10.10	10.14	10.12	10.10	10.13	10.10
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		1.98	1.97	1.97	1.95	2.10	1.91	2.07	1.96	1.98	2.03
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Cl
㉘備考											

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number		421	422	423	426	427	423	429	430	432	433	434	436	437
一、形態的特性														
①株　高	②第一期	113.4	116.4	113.2	110.4	108.4	112.0	108.0	107.8	121.8	120.0	112.4	121.2	115.4
	③第二期	93.9	101.8	95.7	98.8	93.3	92.4	93.6	98.2	103.8	105.0	100.6	110.8	106.1
④有效分蘖	②第一期	12.0	11.0	13.4	13.2	13.4	11.6	14.0	13.6	12.0	13.2	13.0	12.0	12.0
	③第二期	9.8	11.2	11.4	12.2	11.0	11.6	12.0	11.0	12.4	10.0	14.6	10.4	9.8
⑤葉色		D Gn	D Gn	Gn	D Cn	D Gn	D Gn	Gn	D Gn	D Cn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Cn	Gn	Gn	Cn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）		4.00	4.28	3.88	4.44	4.16	4.40	3.68	4.32	4.46	3.32	3.92	4.10	4.38
⑧芒		—	—	F L	—	—	—	R M	—	R S	—	—	—	—
⑨柱頭色		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	B P	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Cn	L Gn	L Cn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	B P	L Gn
	⑫已熟	○	○	×	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○
⑬稃色		Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性														
⑭幼苗稻熱病		S_3	S_4	S_3	S_3	S_4	S_4	S_4	S_4	S_4	S_3	S_5	S_3	S_3
⑮葉稻熱病		4											4	4
⑯穗頸稻熱病		40											90	80
⑰紋枯病	⑱被害率%	56.2	31.4	46.8	44.6	54.2	44.5	54.5	40.3	47.1	35.6	45.4	52.7	39.7
	⑲被害度%	17.1	11.3	10.4	5.2	17.6	14.5	13.8	9.1	11.6	17.1	16.4	13.2	18.7
⑳倒伏性		|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性		±	±	+	+	+	—	+	+	±	±	d	±	±
㉒耐肥性		C	C	B	C	C	C	C	C	B	D	C	C	C
㉓脫粒性		7.0	7.0	16.1	11.5	12.9	11.3	19.8	14.2	13.0	6.6	12.8	7.8	7.8
㉔出穗期	②第一期	6.12	6.12	6.12	6.13	6.9	6.11	6.13	6.11	6.19	6.17	6.13	6.10	6.10
	㉕中間作													
	③第二期	10.11	10.11	10.12	10.10	10.10	10.8	10.6	10.10	10.10	10.15	10.9	10.11	10.10
三、穀粒的特性														
㉖穀粒形狀		1.96	1.96	2.05	2.00	1.96	1.97	2.03	2.12	2.06	2.18	2.14	2.29	2.30
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Cl	Gl	Gl	Gl
㉘備考														

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number	440	441	442	443	445	446	447	448	449
一、形態的特性									
①株高 ②第一期	122.2	112.0	111.0	123.8	115.0	109.2	108.6	116.6	109.4
①株高 ③第二期	103.6	96.6	101.5	105.8	103.8	100.6	99.4	103.4	97.4
④有效分蘖 ②第一期	13.4	17.0	15.6	12.0	14.4	13.2	12.8	14.8	13.4
④有效分蘖 ③第二期	11.2	13.2	18.0	13.0	11.2	15.6	11.2	12.6	11.0
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.38	3.86	3.52	4.50	3.06	4.10	3.12	3.54	3.60
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	B P	W	B P	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	B P	L Gn	B P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	○	○	×	×	×	×	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性									
⑭幼苗稻熱病	S_3	S_5	S_4	S_4	S_4	S_3	S_5	S_3	S_3
⑮葉稻熱病								3	5
⑯穗頸稻熱病								0	40
⑰紋枯病 ⑱被害率%	43.3	35.9	33.3	47.0	27.9	27.5	49.5	33.0	26.8
⑰紋枯病 ⑲被害度%	12.9	19.8	14.2	11.9	2.5	2.6	7.6	14.5	7.4
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	++	+	+	±	+	+	±	±	+
㉒耐肥性	C	C	C	D	C	C	C	C	D
㉓脫粒性	11.6	12.5	6.8	8.4	7.2	6.3	5.7	12.3	7.2
㉔出穗期 ②第一期	6.11	6.11	6.11	6.18	6.12	6.13	6.12	6.12	6.12
㉔出穗期 ㉕中間作									
㉔出穗期 ③第二期	10.14	10.10	10.10	10.12	10.14	10.14	10.11	10.12	10.10
三、穀粒的特性									
㉖穀粒形狀	2.26	2.05	2.27	1.91	2.10	2.05	2.01	1.97	2.02
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考									

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number	450	451	452	453	454	455	456	457	482	484	486	487	488
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	111.2	110.6	111.0	108.0	110.0	113.8	114.6	114.0	113.0	118.8	111.2	122.2	111.4
①株高 ③第二期	102.2	99.0	99.2	96.4	96.4	99.4	100.8	103.8	113.4	105.2	105.8	113.8	99.8
④有效分蘖 ②第一期	11.2	15.0	13.8	14.2	17.6	15.8	17.2	16.6	13.8	11.0	13.2	12.4	11.6
④有效分蘖 ③第二期	11.4	13.4	11.0	11.4	13.0	14.2	11.4	14.8	12.0	10.4	13.0	8.6	9.8
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.76	3.94	2.94	3.32	3.22	3.96	3.18	2.84	2.80	4.48	2.90	4.24	4.20
⑧芒	—	—	—	—	RM	RM	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_5	S_3	S_4	S_3	S_3	S_4	S_4	S_4	S_3	S_4	S_5	S_4	S_3
⑮葉稻熱病		5		4	4				4	4			
⑯穗頸稻熱病		60		20	15				10	20	37.8		
⑰紋枯病 ⑱被害率%	38.3	35.6	52.0	47.1	39.0	41.6	37.5	38.9	37.9	52.7	6.4	34.0	
⑰紋枯病 ⑲被害度%	14.9	24.5	21.3	25.8	2.9	9.8	4.4	6.6	3.6	10.4	6.4	4.3	
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	+	+	+	±	+	+	±	±	+	+	—	±	±
㉒耐肥性	C	D	C	C	C	C	C	C	D	C	C	D	D
㉓脫粒性	11.7	15.8	10.2	8.4	5.6	13.3	10.1	14.3	10.0	9.0	3.4	12.1	3.8
㉔出穗期 ②第一期	6.14	6.12	6.14	6.11	6.12	6.13	6.12	6.13	6.15	6.13	6.17	6.17	6.20
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.12	10.12	10.15	10.9	10.11	10.11	10.12	10.15	10.14	10.11	10.15	10.14	10.16
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.08	2.00	1.92	1.91	1.96	2.10	2.18	2.03	1.91	2.14	2.13	2.18	1.90
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gn	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	489	490	491	492	521	523	526	527	529	531
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	115.6	112.0	108.2	100.6	117.6	113.2	106.0	114.0	117.8	122.8
①株高 ③第二期	117.6	100.8	99.4	92.4	104.2	104.2	102.0	101.0	110.8	108.4
④有效分蘗 ②第一期	11.4	12.4	13.2	12.8	11.0	12.4	12.2	12.4	13.0	11.6
④有效分蘗 ③第二期	13.2	9.0	10.6	10.0	11.2	10.0	9.5	10.5	12.0	10.8
⑤葉色	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.76	3.22	3.06	4.50	3.32	3.96	3.56	4.30	4.52	4.16
⑧芒	—	—	—	RM	—	PS	—	—	RM	RS
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	○	×	×	○	○	○	×	×
⑬稃色	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_4	S_5	S_4	S_5	S_4	S_4	S_6	S_4	S_2	S_3
⑮葉稻熱病									4	5
⑯穗頸稻熱病									50	90
⑰紋枯病 ⑱被害率%	26.2	32.2	44.2	37.7	37.1	33.0	35.7	25.7	19.8	30.2
⑰紋枯病 ⑲被害度%	7.4	15.6	18.2	3.0	6.0	17.0	1.0	3.2	18.5	5.5
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	+	+	+		++	+	±	+	+	+
㉒耐肥性	C	C	C	D	C	D	C	B	C	C
㉓脫粒性	8.5	5.1	3.9	6.2	13.5	14.7	3.9	7.3	9.3	4.8
㉔出穗期 ②第一期	6.13	6.13	6.12	6.12	6.11	6.13	6.20	6.16	6.12	6.12
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.14	10.15	10.14	10.10	10.11	10.14	10.26	10.26	10.15	10.12
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.20	2.11	2.06	2.10	2.12	2.05	1.93	2.00	2.01	2.05
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	533	535	536	537	539	541	543	544	546	547	548	549	550
①株高 ②第一期	113.2	113.0	111.2	112.2	107.8	107.6	109.6	105.6	109.8	110.6	110.0	108.8	115.8
①株高 ③第二期	99.4	101.0	98.6	101.2	102.0	103.8	98.2	95.6	101.6	101.4	98.8	96.3	102.9
④有效分蘗 ②第一期	12.8	13.2	16.4	13.8	13.8	12.8	11.4	11.4	13.8	13.8	13.4	12.0	12.0
④有效分蘗 ③第二期	11.6	11.6	14.2	12.4	12.2	12.4	9.4	10.2	11.8	10.8	11.3	9.6	10.7
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn	D Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	4.52	3.98	3.70	4.54	4.20	4.52	4.34	4.26	4.06	4.32	3.62	4.76	3.86
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○
⑬稃色	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS
⑭幼苗稻熱病	S_2	S_4	S_3	S_5	S_3	S_1	S_1	S_3	S_4	S_3	S_4	S_4	S_3
⑮葉稻熱病	5		5	5	5	5	5	5		5			
⑯穗頸稻熱病	80		80	50	60	60	95	90		95			
⑰紋枯病 ⑱被害率%	30.9	36.7	15.0	59.8	51.0	29.2	42.6	39.6	39.0	54.3	50.8	45.4	39.6
⑰紋枯病 ⑲被害度%	13.5	16.3	12.5	14.6	11.6	3.7	14.0	23.8	19.0	11.8	7.6	7.9	1.7
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	+	+	±	+	+	+	±	±	±	+	+	+	+
㉒耐肥性	D	C	C	C	D	C	C	C	D	C	C	D	C
㉓脫粒性	12.6	8.5	4.9	4.0	10.5	11.3	12.2	11.1	13.3	12.6	12.9	7.1	13.1
㉔出穗期 ②第一期	6.14	6.14	6.13	6.13	6.12	6.12	6.8	6.10	6.12	6.9	6.9	6.12	6.11
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.11	10.11	10.11	10.12	10.13	10.5	10.6	10.11	10.13	10.15	10.16	10.13	10.18
㉖穀粒形狀	1.85	1.99	1.97	2.04	1.97	1.93	2.01	1.97	1.93	1.90	1.97	1.93	1.95
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items		551	552	553	554	555	556	557	558	559	560
一、形態的特性											
①株高	②第一期	117.0	111.8	114.4	114.0	119.2	117.0	108.0	101.8	105.0	111.8
	③第二期	103.0	98.8	102.0	100.0	104.6	103.0	96.8	94.4	92.2	101.0
④有效分蘖	②第一期	12.0	9.8	10.2	11.0	10.6	10.6	11.2	14.6	13.4	11.8
	③第二期	9.7	8.8	9.2	8.6	8.1	8.0	10.2	11.8	10.4	7.8
⑤葉色		Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)		4.80	5.00	4.62	4.70	4.56	4.24	4.26	4.06	3.38	3.32
⑧芒		—	R S	R S	—	P M	—	—	—	—	—
⑨柱頭色		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色	⑪未熟	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
	⑫已熟	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○
⑬稃色		Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		S_4	S_3	S_4	S_3	S_3	S_3	S_2	S_3	S_4	S_5
⑮葉稻熱病			5		4	5	5	5	5		
⑯穗頸稻熱病			20		50	20	20	0	40		
⑰紋枯病	⑱被害率%	30.3	41.1	45.4	38.4	34.1	32.5	28.7	10.9	37.6	37.0
	⑲被害度%	3.9	16.3	8.4	11.9	1.0	4.5	25.1	2.7	14.5	2.9
⑳倒伏性		|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性		±	+	±	±	±	+	±	+	±	±
㉒耐肥性		C	C	C	C	D	C	D	D	D	D
㉓脫粒性		10.0	7.6	10.4	13.0	12.9	11.8	11.7	8.4	12.8	11.0
㉔出穗期	②第一期	6.9	6.11	6.10	6.12	6.11	6.11	6.13	6.11	6.11	6.10
	㉕中間作										
	③第二期	10.18	10.19	10.14	10.15	10.14	10.15	10.17	10.15	10.18	10.18
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		2.02	1.99	2.14	2.01	2.04	2.00	2.06	2.01	1.96	2.03
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考											

561	562	563	564	565	566	567	568	570	572	574	576	577
102.0	97.6	110.4	101.0	102.2	104.4	98.4	112.2	106.4	108.2	113.6	109.2	109.2
95.2	89.6	101.8	94.6	97.6	101.0	91.6	99.6	95.6	96.6	102.2	99.4	99.2
11.0	11.6	9.4	10.4	12.4	11.4	10.0	11.6	11.8	9.8	11.6	10.4	10.2
9.0	9.6	9.6	11.6	9.6	9.6	11.0	8.8	9.2	8.0	10.2	9.0	9.2
D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
4.20	3.32	3.78	4.00	3.80	4.30	4.34	3.88	4.44	4.10	5.10	3.32	4.90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×
Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
S_2	S_3	S_2	S_3	S_4	S_3	S_2	S_2	S_5	S_4	S_3	S_4	S_5
4	5	5	5		4	4	5			4		
50	60	40	30		10	100	20			20		
41.6	49.4	45.1	54.6	52.7	47.3	60.4	42.4	49.1	52.3	43.3	48.6	46.3
19.0	11.6	13.6	20.6	10.8	18.1	28.7	7.2	8.5	8.8	12.8	23.6	11.0
|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
±	+	±	±	±	+	±	+	+	±	+	±	+
B	C	C	C	D	C	△	△	C	C	C	C	C
4.8	7.8	11.1	6.5	11.1	7.0	11.4	7.7	3.2	3.4	1.5	5.4	8.2
6.13	6.13	6.13	6.14	6.15	6.12	6.11	6.14	6.13	6.11	6.15	6.14	6.11
10.18	10.18	10.18	10.16	10.16	10.14	10.14	10.16	10.16	10.19	10.26	10.20	10.19
2.04	2.04	2.04	1.96	1.96	1.98	1.89	1.91	2.04	2.06	2.04	1.96	1.98
Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	578	579	580	581	582	583	602	604	605	606
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	101.4	111.6	108.6	107.2	106.4	103.2	108.6	110.4	106.8	120.2
①株高 ③第二期	90.8	99.6	97.2	95.8	96.0	91.6	96.4	99.7	96.0	106.0
④有效分蘖 ②第一期	13.6	12.0	13.6	11.2	13.2	12.8	12.0	11.8	14.0	10.6
④有效分蘖 ③第二期	11.0	10.2	10.9	8.4	12.6	10.8	10.0	10.2	13.0	8.5
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	4.14	4.80	3.78	4.20	4.28	4.30	4.34	4.22	3.86	4.88
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_6	S_4	S_3	R_1	S_1	R_1	S_2	R_2S_1	S_4	S_6
⑮葉稻熱病			5							
⑯穗頸稻熱病			20							
⑰紋枯病 ⑱被害率%	45.8	29.7	29.7	30.8	42.9	32.6	50.9		33.7	
⑰紋枯病 ⑲被害度%	14.7	7.1	8.1	15.3	3.9	4.0	3.5		3.6	
⑳倒伏性	ǀ	ǀ	ǀ	ǀ	ǀ	ǀ	ǀ	ǀ	ǀ	ǀ
㉑耐旱性	±	＋＋	＋	＋	±	±	＋	±	±	＋
㉒耐肥性	B	D	D	C	C	B	C	C	C	C
㉓脫粒性	6.8	4.2	3.7	5.2	3.7	7.4	11.9	12.7	9.8	2.5
㉔出穗期 ②第一期	6.11	6.12	6.14	6.13	6.13	6.13	6.24	6.13	6.13	6.18
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.15	10.20	10.24	10.13	10.16	10.21	10.20	10.10	10.19	10.5
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.01	2.04	2.07	1.99	1.92	2.02	2.00	1.97	2.04	2.00
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	108.2	119.4	107.8	114.0	108.6	104.6	112.2	111.4	105.6	106.8	109.6	102.2	106.6
①株高 ③第二期	98.6	106.9	95.7	92.0	100.0	90.2	100.6	99.0	92.1	94.9	95.8	91.1	93.3
④有效分蘖 ②第一期	11.6	9.2	12.4	11.8	10.4	11.0	11.8	9.0	11.2	11.6	11.4	11.4	10.4
④有效分蘖 ③第二期	8.3	7.9	8.6	9.7	11.6	8.2	9.8	9.8	8.2	8.1	8.8	9.3	8.8
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	4.44	4.96	4.36	3.36	3.82	4.30	3.80	4.56	3.70	4.48	4.88	4.54	4.66
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	×	×	○	○	○	×	×	○	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_4	R_3M_3	S_5	S_7	S_7	S_6	S_7	S_5	R_2S_1	S_5	S_3	S_5	S_7
⑮葉稻熱病		4							5		5		
⑯穗頸稻熱病		0							100		30		
⑰紋枯病 ⑱被害率%	32.5				30.9	34.0	43.5	49.6			34.1	39.9	34.5
⑰紋枯病 ⑲被害度%	7.7				3.9	6.9	2.2	17.2			4.5	20.8	14.4
⑳倒伏性	ǀ	ǀ	ǀ	ǀ	ǀ	ǀ	ǀ	ǀ	ǀ	ǀ	ǀ	ǀ	ǀ
㉑耐旱性	＋	＋	＋	＋	＋	±	＋	＋	＋	＋	±	＋	±
㉒耐肥性	D	D	D	D	D	C	C	D	C	D	D	D	C
㉓脫粒性	11.2	4.8	9.2	13.7	13.3	3.7	16.0	15.2	8.1	4.2	8.2	8.4	16.0
㉔出穗期 ②第一期	6.10	6.16	6.13	6.13	6.13	6.11	6.11	6.12	6.13	6.13	6.12	6.15	6.13
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.8	10.11	10.12	10.12	10.16	10.9	10.4	10.9	10.7	10.10	10.16	10.15	10.15
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	1.88	1.94	1.92	1.89	2.25	1.91	2.05	1.91	1.90	1.99	1.90	1.98	1.90
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	117.4	109.4	108.8	110.0	116.6	115.8	113.2	110.8	112.0	107.0
①株高 ③第二期	107.0	96.5	95.4	100.8	104.4	103.4	99.0	98.2	99.0	96.2
④有效分蘗 ②第一期	10.4	10.6	10.4	12.6	10.8	10.6	10.8	11.0	10.8	12.6
④有效分蘗 ③第二期	8.2	8.9	8.1	11.1	10.0	13.2	8.1	10.0	9.8	10.2
⑤葉色	Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	4.94	4.52	3.86	3.42	4.02	2.98	4.00	3.22	3.92	3.26
⑧芒	—	—	—	—	—	—	RM	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_3	S_5	S_6	S_6	S_7	S_6	S_5	S_5	S_6	S_6
⑮葉稻熱病										
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%		25.1	41.1	31.8	24.3	25.3	27.1	37.9	33.7	22.0
⑰紋枯病 ⑲被害度%		12.9	33.7	6.1	6.8	3.8	6.4	4.0	3.2	9.9
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	／
㉑耐旱性	+	+	±	+	±	±	±	±	±	+
㉒耐肥性	D	C	D	C	C	C	B	C	C	C
㉓脫粒性	5.7	6.6	5.7	12.6	10.4	11.1	8.0	9.3	11.7	11.7
㉔出穗期 ②第一期	6.13	6.12	6.14	6.13	6.11	6.11	6.18	6.10	6.10	6.11
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.9	10.15	10.6	10.13	10.7	10.9	10.15	10.10	10.6	10.14
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.00	1.97	1.95	1.91	2.03	1.87	2.06	1.92	2.00	2.22
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number	630	631	632	633	634	635	636	637	638	641	643	681	682
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	112.4	110.8	107.0	107.8	115.0	88.4	101.0	108.8	104.8	113.6	101.8	107.6	111.4
①株高 ③第二期	99.4	99.0	95.8	99.0	102.4	78.2	89.8	98.2	99.8	99.2	87.4	99.8	99.0
④有效分蘗 ②第一期	11.4	10.6	11.0	10.0	10.6	10.8	10.2	10.6	10.4	11.4	13.8	12.6	11.6
④有效分蘗 ③第二期	11.8	12.2	9.2	10.0	8.2	11.8	8.1	8.6	12.6	9.5	14.2	9.0	12.6
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	4.26	4.00	4.56	4.34	3.68	3.98	4.70	4.82	4.78	4.08	3.84	4.76	4.66
⑧芒	RM	—	—	F S	F S	—	—	—	—	F S	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	○	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_7	S_7	S_5	S_4	S_3	S_2	S_3	S_3	S_4	S_4	S_3	S_3	S_4
⑮葉稻熱病						5	5						
⑯穗頸稻熱病						80	100						
⑰紋枯病 ⑱被害率%	21.4	23.0	28.2	16.4	21.8	40.8	31.2	35.7	36.0	31.8	46.6	46.3	45.8
⑰紋枯病 ⑲被害度%	1.2	4.0	7.2	8.5	2.3	38.3	5.9	6.7	6.0	13.0	9.4	5.3	2.7
⑳倒伏性	／	／	／	|	|	|	|	|	|	|	／	／	／
㉑耐旱性	+	±	±	±	+	+	+	±	−	+	±	±	+
㉒耐肥性	B	C	C	△	C	B	B	C	△	C	△	B	D
㉓脫粒性	11.3	12.0	5.3	11.4	12.8	11.1	12.5	8.7	1.9	10.8	1.6	11.4	8.6
㉔出穗期 ②第一期	6.12	6.13	6.11	6.11	6.13	6.11	6.8	6.11	6.13	6.9	6.18	6.10	6.10
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.12	10.12	10.16	10.10	10.16	10.6	10.9	10.14	10.14	10.8	10.10	10.20	10.20
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	1.94	1.97	2.00	2.07	2.22	1.96	1.99	1.94	1.97	1.98	2.03	2.11	2.17
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調査項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	633	684	701	702	703	704	705	706	707	703
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	101.0	98.6	117.8	114.4	114.0	113.0	110.4	119.8	113.8	113.2
①株高 ③第二期	87.8	96.5	94.6	103.4	106.0	99.2	98.6	114.2	104.4	104.0
④有效分蘖 ②第一期	11.6	12.6	12.6	11.8	11.3	11.0	11.6	11.2	11.2	11.8
④有效分蘖 ③第二期	12.0	14.2	10.8	10.8	12.0	9.2	11.2	9.0	10.8	12.4
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.84	2.86	2.74	4.46	2.54	3.52	3.56	4.10	3.94	3.28
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	V S	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	×	○	×	○	×	○	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	W S	W S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_3	S_5	$S_{8\cdot5}$	$S_{8\cdot5}$	S_5	S_5	S_6	S_4	S_8	S_2
⑮葉稻熱病										
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%	30.3	40.4	8.0			19.9		25.6	13.4	
⑰紋枯病 ⑲被害度%	8.1	5.2	0.8			0.9		15.9	6.6	
⑳倒伏性	／	／	／	／	／	｜	｜	｜	｜	｜
㉑耐旱性	±	＋	＋	＋＋	±	＋	＋	＋＋	＋＋	±
㉒耐肥性	C	B	D	△	D	D	D	D	C	C
㉓脫粒性	11.0	13.1	11.4	9.9	3.2	5.6	2.8	9.8	4.6	6.7
㉔出穗期 ②第一期	6.10	6.10	6.16	6.16	6.16	6.16	6.14	6.16	6.20	6.18
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.8	10.10	10.21	10.23	10.22	10.21	10.18	10.20	10.23	10.18
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.02	1.97	2.19	2.18	2.03	2.08	2.43	2.29	2.24	2.20
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調査項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	709	710	711	712	713
一、形態的特性					
①株高 ②第一期	110.2	104.6	97.2	105.4	110.4
①株高 ③第二期	98.8	92.8	93.3	93.2	97.2
④有效分蘖 ②第一期	11.6	10.4	12.4	11.8	11.2
④有效分蘖 ③第二期	9.8	7.8	12.7	9.0	9.4
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Dn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	4.14	3.48	3.64	3.12	4.08
⑧芒	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	L Gd	W S	Y S	Y S
二、生理的特性					
⑭幼苗稻熱病	S_4	S_3	S_3	S_5	S_7
⑮葉稻熱病					
⑯穗頸稻熱病					
⑰紋枯病 ⑱被害率%		11.0	26.4		28.3
⑰紋枯病 ⑲被害度%		10.2	3.5		3.0
⑳倒伏性	｜	｜	／	｜	｜
㉑耐旱性	±	＋	±	±	＋
㉒耐肥性	D	C	C	C	D
㉓脫粒性	3.9	4.0	7.7	5.6	6.9
㉔出穗期 ②第一期	6.15	6.14	6.15	6.14	6.15
㉔出穗期 ㉕中間作					
㉔出穗期 ③第二期	10.20	10.16	10.22	10.19	10.23
三、穀粒的特性					
㉖穀粒形狀	2.04	2.01	2.08	2.03	2.04
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考					

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number		1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
一、形態的特性											
①株高	②第一期	120.4	120.6	119.2	117.0	113.2	117.6	86.8	129.6	110.8	
	③第二期	103.8	103.6	105.8	102.4	102.2	100.5	83.2	115.2	101.8	131.4
④有效分蘖	②第一期	13.0	12.8	11.8	17.0	14.8	14.2	11.6	10.6	14.0	
	③第二期	12.8	13.2	11.9	14.0	12.0	13.5	12.4	9.6	13.8	14.0
⑤葉色		L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）		3.56	2.74	3.84	2.24	2.48	3.48	1.98	4.32	3.24	2.32
⑧芒		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Cn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
	⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
⑬稃色		Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		R_2	R_1	R_2M_2	R_4M_1	R_1	R_1	R_1M_1	R_1	R_1	R_1
⑮葉稻熱病		4	5	5	5	4	4	5	4	3	
⑯穗頸稻熱病		90	100	100	100	100	100	100	100	100	
⑰紋枯病	⑱被害率%	24.2	45.7	27.0	36.3	37.7	33.5	44.9	32.9	41.2	12.0
	⑲被害度%	3.2	2.8	3.5	1.1	3.3	4.1		2.0	0.9	1.6
⑳倒伏性		1	|	|	|	|	—	—	|	—	|
㉑耐旱性		d	d	d	d	d	╫	╫	d	d	d
㉒耐肥性		D	C	△	D	C	C	C	C	C	△
㉓脫粒性		17.4	29.2	10.4	11.1	10.5	15.3	16.2	13.9	19.8	7.9
㉔出穗期	②第一期	6.8	6.8	6.11	6.14	6.7	6.15	5.22	6.6	6.4	
	㉕中間作										
	③第二期	10.3	10.6	10.6	10.11	10.4	10.15	9.22	10.6	10.2	10.9
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		2.63	2.63	2.89	2.88	2.92	2.51	2.65	2.58	2.93	2.65
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考											

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number		1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1021
一、形態的特性											
①株高	②第一期	102.8	137.4	112.9	128.8	121.8		85.2	126.0	118.8	122.8
	③第二期	102.2	111.2	103.0	102.2	106.4	118.2	74.6	117.2	102.4	107.2
④有效分蘖	②第一期	11.6	10.6	13.2	11.0	12.8		14.8	13.4	11.8	11.6
	③第二期	12.2	12.0	14.6	12.2	13.0	9.8	15.0	12.5	11.8	10.4
⑤葉色		L Gn	L Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色		P	P	P	P	P	Gn	Gn	Gn	Gn	P
⑦穗重（g）		3.06	4.06	3.62	3.42	3.16	4.74	2.32	3.94	3.04	2.84
⑧芒		—	—	—	—	—	—	PL	—	—	—
⑨柱頭色		BP	BP	BP	BP	BP	W	W	W	W	BP
⑩稃尖色	⑪未熟	RP	RP	RP	RP	RP	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	RP
	⑫已熟	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
⑬稃色		YS	YS	BF	YS	YS	BF	YS	BF	BF	BF
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		RS_1	R_2	R_1S_1	R_2	R_1	R_2	S_6	R_2	S_3	R_1
⑮葉稻熱病			4		5	5	5				4
⑯穗頸稻熱病			100			100	100				100
⑰紋枯病	⑱被害率%	53.1	36.6	16.4	18.6	25.8	35.1	26.5	23.1	24.8	39.3
	⑲被害度%	43.8	33.3	0.4	0.3	0.7	3.0	1.0	2.9	6.6	11.0
⑳倒伏性		|	|	／	|	／	／	|	—	—	—
㉑耐旱性		♯	d	d	d	d	d	±	d	d	d
㉒耐肥性		D	D			C	A	D	△	B	C
㉓脫粒性		10.2	11.3	8.3	18.1	17.1	12.6	18.1	17.5	14.5	16.2
㉔出穗期	②第一期	6.2	6.8	6.11	6.12	6.10		5.28	6.14	6.15	6.10
	㉕中間作										
	③第二期	10.1	10.5	10.13	10.9	10.6	10.13	9.22	10.15	10.11	10.3
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		2.70	2.68	2.66	2.86	2.68	2.48	2.38	2.85	2.41	2.97
㉗胚乳性質		Cl	Gl	Cl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Cl	Gl
㉘備考											

調查項目 Items		1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034
一、形態的特性														
①株高	②第一期		121.2	112.4	106.4	100.0	116.0	130.0	109.1	137.2	125.3	127.4	135.6	133.4
	③第二期	106.0	108.0	101.2	95.6	96.2	109.4	120.8	97.6	117.2	111.4	111.4	115.2	112.8
④有效分蘖	②第一期		12.2	12.4	10.6	12.4	12.0	13.2	12.8	11.4	9.3	13.2	11.2	13.6
	③第二期	10.4	10.6	10.2	12.2	13.2	11.2	11.9	9.8	9.9	8.6	11.4	7.8	10.2
⑤葉色		L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	P	P	Gn	Gn	P	Gn
⑦穗重（g）		2.64	3.18	3.08	2.22	3.82	3.42	3.84	2.36	3.06	2.45	3.18	3.54	2.78
⑧芒		—	FL	—	—	—	FL	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色		W	W	W	BP	W	W	W	BP	BP	W	W	BP	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	RP	L Gn	L Gn	L Gn	RP	RP	L Gn	L Gn	RP	L Gn
	⑫已熟	×	×	×	○	×	×	×	○	○	×	×	○	×
⑬稃色		YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	L Gd	YS	YS	YS
二、生理的特性														
⑭幼苗稻熱病		R_2	R_1S_2	R_3M_1	R_2	R_2M_1	S_2	R_1	R	0	R_1	R_2	R_1	R_2M_1
⑮葉稻熱病		4		4	4	5		4	4	4	5	5	5	4
⑯穗頸稻熱病				100	100			100	100	100	100	100	100	60
⑰紋枯病	⑱被害率%	26.9	31.2	24.9	31.1	36.3	43.4	27.0	34.4	33.6		31.8	43.2	26.5
	⑲被害度%	14.8	0.8	0.9	3.3	19.3	5.9	25.0	0.4	7.0		1.1	3.7	1.2
⑳倒伏性		|	|	|	|	|	|	—	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性		d	±	d	♯	d	±	+	d	D	d	d	d	d
㉒耐肥性		C	D	D	C	D	C	△	D	G	C	E	△	B
㉓脫粒性		6.8	24.5	13.6	21.6	14.1	15.7	8.9	11.0	14.4	5.1	9.4	16.9	11.5
㉔出穗期	②第一期		6.10	6.6	6.5	6.6	6.13	6.10	6.12	6.10	6.28	6.12	6.10	6.12
	㉕中間作													
	③第二期	10.8	10.11	10.4	10.3	10.9	10.13	10.13	10.11	10.9	10.18	10.7	10.6	10.13
三、穀粒的特性														
㉖穀粒形狀		2.98	2.66	2.34	2.80	2.57	2.05	2.57	2.54	2.95	2.80	2.54	2.98	2.68
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考														

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items		1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044
一、形態的特性											
①株高	②第一期		110.5	104.0	127.6	128.8	112.0	111.4	110.1		109.8
	③第二期	116.4	105.8	102.6	105.0	102.0	101.8	97.8	104.6	116.2	102.2
④有效分蘖	②第一期		12.0	12.4	13.2	10.8	13.2	15.2	16.2		12.2
	③第二期	12.4	11.6	10.6	14.0	11.0	11.2	15.8	14.6	13.8	10.4
⑤葉色		L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	P	P	Gn	Gn	Gn	Gn	P	P
⑦穗重(g)		3.06	3.20	2.78	2.54	2.66	2.02	2.52	2.90	1.92	2.38
⑧芒		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色		W	W	B P	B P	W	W	W	W	W	B P
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	R P	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P
	⑫已熟	×	×	○	○	×	×	×	○	○	○
⑬稃色		B F	W S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	L Gn	Y S
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		R_2	S_1	R_1	R_2	R_1	R	R_2	R_2	R_2	R_1
⑮葉稻熱病		5		4	4	4	5	5	2	5	4
⑯穗頸稻熱病		15		100	100	80	100	90	100	100	100
⑰紋枯病	⑱被害率%	17.3	37.9	37.9	35.3	33.9	28.8	37.3	41.7	29.8	45.7
	⑲被害度%	1.9	3.7	37.5	1.6	3.4	3.5	0.4	32.8	20.6	4.2
⑳倒伏性		—	|	|	|	|	|	|	|	／	／
㉑耐旱性		d	d	d	d	d	d	d	d	d	卄
㉒耐肥性		B	△	C	C	C	B	B	D	B	C
㉓脫粒性		11.8	10.14	11.5	7.1	24.8	10.0	16.7	11.7	13.2	7.1
㉔出穗期	②第一期		6.17	5.22	6.10	6.11	6.7	6.7	6.28		5.29
	㉕中間作										
	③第二期	10.9	10.14	9.28	10.7	10.7	10.6	10.5	10.3	10.5	9.24
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		2.51	2.23	2.62	2.74	2.53	2.71	3.21	2.75	3.12	2.72
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gn	Gl
㉘備考											

		1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057
一、形態的特性														
①株高	②第一期	115.6	131.4	128.2	124.0		121.2	131.2	122.4	125.6		112.2	106.2	130.4
	③第二期	100.0	107.4	105	104.6	115.2	91.0	105.8	104.8	106.6	102.4	93.0	99.8	105.0
④有效分蘖	②第一期	13.4	12.4	11.6	16.0		14.8	14.8	12.0	14.6		15.2	10.0	12.4
	③第二期	10.4	10.0	8.6	16.0	12.4	14.2	14.6	9.0	11.6	18.2	16.4	10.6	13.8
⑤葉色		L Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色		Gn	P	P	Gn	Gn	Gn	P	P	Gn	Gn	Gn	Gn	P
⑦穗重(g)		2.70	3.38	2.82	1.94	2.42	2.26	2.78	2.52	2.56	1.90	2.34	3.94	2.30
⑧芒		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色		W	B P	B P	W	W	W	B P	B P	W	W	W	W	B P
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	R P	R P	L Gn	L Gn	L Gn	R P	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P
	⑫已熟	×	○	○	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○
⑬稃色		Y S	Y S	L Gd	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	B F	Y S	Y S
二、生理的特性														
⑭幼苗稻熱病		R_2	R_3	R_3	R_2M_2	R_3M_1	R_1	R_2	R_1	R_1	R_3	R_2	R_1	M_1
⑮葉稻熱病		5	4	3	3	4	3	4	4	4	4	5	4	4
⑯穗頸稻熱病		100	100	100	100	100	100	20	80	100	10	100	100	100
⑰紋枯病	⑱被害率%	21.4	48.1		29.5	29.6	42.3	23.9	36.6	44.9	16.2	25.9	42.2	39.0
	⑲被害度%	0.8	4.4		2.7	7.1	39.4	3.8	27.9	37.3	2.9	4.2	7.5	0.8
⑳倒伏性		|	|	／	|	／	|	|	／	／	|	|	／	|
㉑耐旱性		卄	d	±	d	d	d	d	d	d	d	d	卄	d
㉒耐肥性		D	C	C	△	C	C	D	C	△	△	C	C	C
㉓脫粒性		17.0	19.5	10.6	14.4	7.5	10.0	18.0	11.9	18.8	7.4	21.0	13.2	4.5
㉔出穗期	②第一期	6.11	6.7	6.19	6.10		6.2	6.9	6.12	6.9		6.8	5.29	6.17
	㉕中間作													
	③第二期	10.8	10.3	10.19	10.6	10.8	9.26	10.12	10.5	10.6	10.12	10.7	9.26	10.16
三、穀粒的特性														
㉖穀粒形狀		2.55	2.73	2.75	3.12	3.55	2.65	2.93	2.82	2.47	2.57	2.90	2.26	2.47
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考														

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067
一、形態的特性										
①株高 ②第一期		135.8	137.0	126.4	123.8	116.0	105.0	126.8	114.6	1310.
①株高 ③第二期	107.2	112.2	122.8	113.4	98.0	108.6	87.4	97.8	95.6	108.6
④有效分蘗 ②第一期		12.4	12.2	14.4	13.8	12.6	15.2	10.6	14.8	8.4
④有效分蘗 ③第二期	13.6	10.2	9.8	13.4	13.0	12.4	13.0	11.4	14.0	9.6
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P
⑦穗重（g）	3.44	3.38	4.52	2.86	2.38	3.54	3.08	4.54	3.62	3.62
⑧芒	—	—	R S	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
⑬稃色	B F	Y S	Y S	Y S	B F	B F	Y S	Y S	Y S	B F
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_3	R_2	R_2S_1	R_1M_1	R_1	R_2	S_3M_1	R_2	M_2	R_1
⑮葉稻熱病	4	4		5	5	4		4	4	4
⑯穗頸稻熱病	20	100		100	100	100		100	100	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	31.0	27.6	32.6	35.7	29.4	34.1	18.2	36.9	27.2	31.7
⑰紋枯病 ⑲被害度%	2.7	1.7	2.3	6.2	3.4	5.0	3.9	3.7	2.3	1.0
⑳倒伏性	|	|	|	／	|	|	—	—	|	|
㉑耐旱性	d	d	‡‡	d	‡‡	d	±	d	d	d
㉒耐肥性	△	D	△	C	C	△	D	B	C	△
㉓脫粒性	9.9	8.0	5.8	19.5	7.6	10.7	9.0	9.7	21.0	9.9
㉔出穗期 ②第一期		6.22	6.14	6.9	6.20	6.12	6.12	6.7	6.9	6.11
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.10	10.15	10.14	10.11	10.23	10.13	9.24	10.10	10.5	10.9
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.56	2.43	2.49	2.66	2.52	2.35	2.35	2.65	2.76	2.71
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調查項目 Items	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1079	1084	1085	1086	1087	1088
①株高 ②第一期	98.2	91.8	87.6	105.8	114.8	118.6	127.8	133.0	131.8	138.4	107.6	101.2	126.0
①株高 ③第二期	91.2	84.2	80.4	91.0	96.6	103.8	108.0	115.4	120.8	112.2	99.4	74.5	110.6
④有效分蘗 ②第一期	12.6	12.2	10.4	15.0	14.0	14.4	13.8	14.4	14.2	15.2	13.8	12.2	14.6
④有效分蘗 ③第二期	12.2	12.8	10.6	13.8	12.8	13.0	12.4	12.0	14.2	14.0	11.8	14.3	13.8
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	P	P	Gn	Gn
⑦穗重（g）	2.56	2.63	2.78	2.52	2.48	3.44	2.82	3.34	3.80	3.90	2.92	2.70	3.18
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	F l	P M
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	B P	B P	B P	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	R P	R P	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	R_1	R_1	R_2	R_3	S_1R_1	S_1	S_4	R_2	R_2	R_1	R_1M_1	S_4	R_1
⑮葉稻熱病	4	5	4	5				3	4	5	4		4
⑯穗頸稻熱病	100	100	100	100				60	80	100	90		100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	47.8	19.0	27.1		20.9	32.9	26.4	30.0	26.0	31.2	43.4	29.6	33.4
⑰紋枯病 ⑲被害度%	11.6	4.7	8.1		5.0	23.2	0.8	15.2	0.8	1.7	21.2	13.3	5.4
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	—	—	—	--	—	／	／	|
㉑耐旱性	‡‡	‡‡	d	d	d	d	d	d	d	d	‡‡	—	d
㉒耐肥性	D	E	C	E	D	D	△	D	C	△	D	△	D
㉓脫粒性	7.0	11.0	4.3	9.5	20.2	12.8	9.2	5.4	6.3	18.7	17.1	10.4	9.5
㉔出穗期 ②第一期	5.23	5.23	5.23	6.1	6.5	6.10	6.8	6.10	6.20	6.20	6.6	6.7	6.23
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	9.27	9.30	9.30	9.29	10.2	10.5	10.5	10.4	10.20	10.20	10.2	9.20	10.19
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.81	2.38	2.32	2.32	2.47	2.79	2.77	2.87	2.64	2.77	2.94	2.03	2.40
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1099
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	132.4	124.2	121.4	123.0	131.2	132.0	125.0	125.4	132.8	127.0
①株高 ③第二期	126.6	111.3	114.0	109.0	115.5	113.2	116.1	105.6	107.6	98.2
④有效分蘖 ②第一期	13.0	13.9	13.6	16.0	16.1	13.2	15.0	13.2	13.8	13.2
④有效分蘖 ③第二期	12.0	16.7	15.4	16.6	17.8	13.4	12.8	15.8	12.4	11.2
⑤葉色	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.58	2.72	2.60	2.60	2.24	3.56	2.8	3.56	2.35	3.28
⑧芒	—	—	—	—	—	PM	—	RM	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	B F	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑪幼苗稻熱病	R_2	R_1	R_1	R_1M_2	R_2	R_1	R_1M_1	R_1	R_1M_1	R_1
⑮葉稻熱病		4	4	4	4	4	4	3	4	4
⑯穗頸稻熱病		60	80	50	60	90	60	20	100	80
⑰紋枯病 ⑱被害率%	25.5	25.8	34.9	25.3	34.0	29.5	32.4	24.3	26.1	28.3
⑰紋枯病 ⑲被害度%	3.6	13.1	18.4	15.4	17.4	8.3	2.0	2.2	6.1	3.6
⑳倒伏性	／	｜	／	｜	—	—	—	｜	｜	—
㉑耐旱性	d	d	d	#	d	d	d	d	#	#
㉒耐肥性	B	△	△	C	△	△	△	D	△	C
㉓脫粒性	9.0	22.8	6.9	21.6	1.8	5.1	5.3	5.8	10.7	9.1
㉔出穗期 ②第一期	6.25	6.28	6.20	6.29	6.28	6.23	6.20	6.26	6.22	6.16
㉔出穗期 ㉕中間期										
㉔出穗期 ③第二期	10.15	10.28	10.16	10.26	10.25	10.20	10.20	10.5	10.18	10.20
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.80	2.80	2.72	2.70	2.72	2.73	2.71	2.80	2.58	2.76
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

	1100	1102	1103	1104	1105	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	128.8	122.8	126.2	124.1	75.6	124.0	137.0	109.8	103.2	125.6	94.8		
①株高 ③第二期	118.2	110.2	105.2	104.2	74.8	119.2	111.2	86.6	95.6	101.5	92.0	109.8	103.2
④有效分蘖 ②第一期	13.4	14.2	12.2	12.5	19.2	13.0	13.2	16.2	10.8	13.4	9.0		
④有效分蘖 ③第二期	11.6	11.8	11.6	13.2	15.2	11.2	10.4	13.0	10.2	10.2	9.4	13.6	14.0
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.16	3.30	2.83	1.92	1.46	3.94	3.36	2.34	3.12	2.32	2.70	1.78	2.12
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	F L	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	L G d	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	L G d	Y S
二、生理的特性													
⑪幼苗稻熱病	R_2	R_2	R_1	R_1	R_2	R_1	R_1M_1	R_2	R_2	R_1	R_1	R_1M_1	R_1
⑮葉稻熱病	4	4	5	4	5		5	4	4	4	5	5	5
⑯穗頸稻熱病	100	100	100		100		100	100	100	90	95	100	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	28.3	36.8	29.8	21.3	37.8	37.8	52.5	31.1	37.2	10.0	35.0	25.5	26.0
⑰紋枯病 ⑲被害度%	8.5	3.9	4.3	14.8	16.0	11.9	2.2	3.6	4.0	3.3	1.6	3.5	5.3
⑳倒伏性	｜	／	｜	｜	｜	／	／	｜	／	／	｜	｜	｜
㉑耐旱性	#	d	d	d	d	d	d	—	d	d	d	d	d
㉒耐肥性	D	D	D	△	D	C	△	C	D	D	D	△	△
㉓脫粒性	9.5	14.5	6.8	5.3	7.3	13.2	15.5	14.5	12.7	16.3	11.8	9.3	6.4
㉔出穗期 ②第一期	6.8	6.8	6.17	6.9	5.23	6.8	6.8	6.10	5.24	6.9	6.2		
㉔出穗期 ㉕中間期													
㉔出穗期 ③第二期	10.7	10.4	10.4	10.4	9.25	10.4	10.6	9.25	9.25	10.2	9.26	10.11	10.9
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.91	2.78	3.00	2.86	2.68	2.58	2.65	2.19	2.90	2.45	2.53	2.67	2.38
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	137.8	142.2	129.0	131.4	127.4	137.4	135.8	117.2	121.2	109.8
①株高 ③第二期	111.0	111.6	103.0	111.4	104.2	116.8	115.0	97.2	105.8	104.4
④有效分蘖 ②第一期	11.8	13.6	14.0	10.8	14.4	14.2	13.6	11.6	11.4	14.0
④有效分蘖 ③第二期	9.4	11.0	15.0	11.4	12.4	12.2	13.4	12.6	10.8	15.8
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	P	Gn	P	Gn	P	P	P	P	Gn
⑦穗重（g）	3.60	4.46	2.92	3.94	2.60	2.18	3.84	2.08	3.42	2.26
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	B P	W	B P	W	B P	B P	B P	B P	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	R P	L Gn	R P	L Gn	R P	R P	R P	R P	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	×	○	×	○	○	○	○	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_1	R_1	R_1	R_1	R_1	R_1	R_1	R_1	R_1	R_1
⑮葉稻熱病	4	5	3	4		4	4	4	5	5
⑯穗頸稻熱病	100	100	40	100		100	100	100	100	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	30.5	27.0	20.2	30.5	29.3	34.1	39.2	28.9	37.5	21.2
⑰紋枯病 ⑲被害度%	12.5	3.6	5.8	12.6	2.0	7.8	0.8	4.5	10.8	2.6
⑳倒伏性	—	|	|	|	|	|	—	|	—	—
㉑耐旱性	d	d	d	d	d	╫	d	d	d	d
㉒耐肥性	C	△	C	C	△	△	D	C	C	
㉓脫粒性	16.6	12.0	13.2	18.0	12.3	5.5	13.0	13.5	29.1	8.9
㉔出穗期 ②第一期	6.11	6.12	6.10	6.10	6.9	6.20	6.10	6.8	6.5	6.25
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.6	10.11	9.29	10.5	10.3	10.11	10.2	10.7	10.6	10.2
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.47	2.78	2.76	2.54	2.67	2.97	2.94	2.95	2.48	2.87
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	132.8			98.6	130.6	136.4	100.8	120.4	121.2		113.6	122.6	126.4
①株高 ③第二期	112.6	120.4	90.4	84.2	113.8	110.2	98.4	97.0	108.0	103.0	94.0	97.4	106.0
④有效分蘖 ②第一期	12.4			13.2	15.0	12.4	13.4	14.2	14.2		12.8	14.6	14.8
④有效分蘖 ③第二期	10.8	13.2	17.8	12.6	13.8	10.8	10.8	14.0	12.6	17.8	10.0	14.0	13.2
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.58	2.50	1.70	2.02	2.82	2.42	2.96	2.40	3.34	2.08	2.96	2.44	3.12
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	B P	W	W	B P	B P	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	R P	R P	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×	×
⑬稃色	Y S	L Gd	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	R_1	R_1	R_2	R_1	R_1	R_2	R_1	R_1	R_1	R_1	R_1	R_1	R_1
⑮葉稻熱病	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5
⑯穗頸稻熱病	60	100		100	90	80	100	100	100		100	80	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	30.8	18.0	19.8	19.8	16.1	35.3	44.6	30.9	41.6	25.1	44.8	43.1	36.6
⑰紋枯病 ⑲被害度%	2.4	7.2	4.9	3.5	5.4	3.9	14.2	10.3	9.1	5.7	9.0	3.4	6.8
⑳倒伏性	|	|	|	—	|	|	／	|	|	|	|	／	—
㉑耐旱性	d	d	d	d	d	d	╫	d	╫	╫	d	d	╫
㉒耐肥性	C	C	△	C	△	C	D	△	D	B	C	B	B
㉓脫粒性	22.4	4.2	9.4	25.7	2.1	10.8	6.9	8.3	15.5	4.8	13.5	11.5	8.9
㉔出穗期 ②第一期	6.10			6.4	6.13	6.12	5.24	6.6	6.10		6.11	6.9	6.12
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.7	10.10	10.10	10.4	10.6	10.6	9.25	9.27	10.5	10.12	10.2	10.4	10.14
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	3.69	3.04	3.03	2.67	3.24	2.54	2.77	2.70	2.84	3.37	2.79	2.61	2.63
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	127.4		125.0		130.6		129.2		128.8	112.6
①株高 ③第二期	115.8	113.8	110.8	116.4	112.0	103.8	117.8	108.4	105.6	96.4
④有效分蘗 ②第一期	15.4		12.6		14.6		14.6		13.8	120.
④有效分蘗 ③第二期	14.4	16.4	10.4	16.6	14.8	14.0	12.4	13.4	12.0	11.6
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	P
⑦穗重（g）	3.00	3.28	3.42	2.08	2.84	2.22	2.54	2.90	2.72	2.16
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	B P	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	B F	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_1	R_1	R_2	R_1	R_2	R_1	R_1	R_3	R_3	R_1
⑮葉稻熱病	5	5	5	4		4	5	5	4	4
⑯穗頸稻熱病	90	100	95				100	100	100	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	32.3	43.4	40.6	31.8	33.0	27.3	46.3	50.4	19.0	20.5
⑰紋枯病 ⑲被害度%	4.1	24.5	7.4	3.7	4.3	0.5	11.3	5.1	1.0	3.4
⑳倒伏性	／	／	／	／	／	／	／	|	／	|
㉑耐旱性	#	d	d	d	#	d	#	d	#	d
㉒耐肥性	C	C	D	△	C	B	C	△	△	C
㉓脫粒性	4.7	9.1	9.1	17.5	7.1	8.2	16.5	12.0	8.8	26.8
㉔出穗期 ②第一期	6.19		6.16		6.12		6.11		6.12	6.8
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ⑥第二期	10.17	10.8	10.19	11.10	10.12	10.13	10.6	10.4	10.14	10.9
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.44	2.77	2.59	2.95	2.91	3.17	2.62	2.66	2.78	2.77
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	116.4	103.6	137.4	120.8	112.4	118.4	120.8	121.6	124.8	119.4	127.8	134.8	124.0
①株高 ③第二期	96.2	91.0	117.4	115.2	96.8	104.8	107.2	100.4	105.4	109.4	104.8	104.8	105.6
④有效分蘗 ②第一期	13.6	11.6	13.6	13.6	11.6	12.6	13.6	12.6	13.8	12.6	13.6	14.0	12.4
④有效分蘗 ③第二期	10.2	11.0	12.8	14.2	13.0	13.6	11.4	12.0	12.4	12.6	12.2	13.2	12.7
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	P	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Cn	P	Gn	Gn	P	Gn
⑦穗重（g）	3.78	2.20	3.54	2.26	3.12	2.70	2.98	3.12	2.92	3.04	2.30	2.98	3.06
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	B P	W	W	W	W	B P	W	W	B P	W	W	B P	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	R P	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	○	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	R_1	R_1	R_3	R_2	R_2	R_1	R_1	R_1	R_3	R_1	R_2	R_1	R_1
⑮葉稻熱病	4	5	4	5	3	4	4	5	5	5	4	4	5
⑯穗頸稻熱病	100	100	100	100	100	90	100	100	100	100	90	60	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	25.4	25.7	15.5	25.4	23.8	27.1	26.4	28.2	24.4	22.1	24.1	32.4	31.8
⑰紋枯病 ⑲被害度%	2.7	1.8	1.9	5.1	1.6	3.4	9.1	14.0	3.2	4.9	2.8	3.5	2.9
⑳倒伏性	|	／	—	—	—	／	／	|	—	／	—	|	|
㉑耐旱性	d	d	#	#	d	d	d	d	#	d	+	d	d
㉒耐肥性	C	C	△	B	C	D	D	△	C	D	C	C	C
㉓脫粒性	12.6	13.7	5.8	20.4	15.4	18.5	12.1	25.7	10.9	16.5	18.3	8.1	5.2
㉔出穗期 ②第一期	6.9	5.24	6.16	6.20	6.2	6.6	6.7	6.10	6.10	6.10	6.5	6.13	6.16
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ⑥第二期	10.3	9.24	10.18	10.20	9.30	10.3	10.5	10.13	10.5	10.5	9.30	10.10	10.21
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.65	2.72	2.47	2.52	2.78	2.98	2.77	2.63	2.70	2.51	3.29	2.70	2.62
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	1162	1163	1164	1166	1167	1168	1170	1171	1172	1173
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	141.0	104.0	120.3	120.2	92.0	130.3	125.4	137.2	120.4	132.4
①株高 ③第二期	113.2	79.4	105.4	97.2	83.4	102.8	104.4	118.4	103.4	114.6
④有效分蘖 ②第一期	13.6	11.4	14.2	15.6	14.0	14.4	13.4	13.2	14.0	12.2
④有效分蘖 ③第二期	11.0	9.2	11.4	12.4	11.0	11.6	10.4	10.2	11.4	10.2
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P
⑦穗重(g)	3.18	3.42	4.00	3.16	1.86	2.98	3.70	4.24	3.32	2.98
⑧芒	—	F L	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	B F	W S	L G d
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_1	R_3	R_3	R_1	R_1	R_1M_1	S_3	R_1M_1	R_2	M_1S_2
⑮葉稻熱病	5	5		4	5	5		3	4	
⑯穗頸稻熱病	100	100		100	100	20		100	100	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	23.7	33.1	24.6	25.9	37.3	15.9	25.1	21.5	22.1	37.4
⑰紋枯病 ⑲被害度%	2.0	13.9	10.9	7.2	4.3	2.4	15.6	3.0	15.2	8.6
⑳倒伏性	／	／	|	|	／	|	／	|	|	|
㉑耐旱性	＋	—	d	卄	d	d	d	d	d	d
㉒耐肥性	△	C	△	B	C	C	A	△	△	D
㉓脫粒性	13.1	18.1	24.0	25.3	5.4	7.1	16.2	14.1	12.0	11.4
㉔出穗期 ②第一期	6.15	6.6	6.10	6.7	5.21	6.24	6.7	6.17	6.10	6.14
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.15	10.12	10.7	10.10	9.22	10.9	10.4	10.14	10.8	10.14
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.60	2.25	2.81	2.75	2.85	2.82	3.22	2.63	2.98	2.84
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Cl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	1174	1175	1177	1178	1179	1180	1181	1183	1184	1185	1186	1187	1188
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	119.6	120.4	123.8	107.6	130.6	134.8	135.6			118.6	113.2	136.2	120.0
①株高 ③第二期	107.2	105.6	109.2	90.6	108.2	1140.	106.2	92.2	111.8	101.6	105.4	126.0	104.6
④有效分蘖 ②第一期	14.4	13.4	11.8	13.2	12.8	14.2	14.0			13.4	14.2	11.8	13.8
④有效分蘖 ③第二期	11.6	10.8	9.4	12.2	9.6	10.6	10.6	13.2	9.8	11.4	13.0	11.2	11.6
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn
⑦穗重(g)	2.58	4.18	3.10	3.08	3.08	2.42	3.38	1.84	2.84	2.82	2.68	4.08	2.76
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	F L	—	F L
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	B P	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	L G d	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	R_1	R_1M_2	R_2	S_1	R_2	R_2	R_2M_1	R_1	R_2	R_2M_1	R_1	R_1M_2	R_2
⑮葉稻熱病	4	3	3		4	4	4	5	5	5	5	5	
⑯穗頸稻熱病	80	60	100		100	100	100			100	100	100	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	32.1	23.1	32.6	39.5	25.1	24.4	30.0	26.7	41.2	37.5	38.8	33.1	27.6
⑰紋枯病 ⑲被害度%	15.8	5.2	2.9	8.6	4.2	1.8	4.1	3.9	5.9	8.3	14.5	7.6	9.9
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	—	|	|	／	|	|	—
㉑耐旱性	卄	卄	d	d	卄	d	＋	d	±	卄	—	d	—
㉒耐肥性	C	C	C	C	△	△	△	△	△	C	C	C	C
㉓脫粒性	15.5	4.8	8.4	16.2	14.3	12.4	9.5	3.3	4.2	35.4	11.9	11.3	11.6
㉔出穗期 ②第一期	6.4	6.20	6.2	6.1	6.13	6.21	6.16			6.7	6.7	6.11	6.7
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.16	10.14	10.3	9.24	10.14	10.17	10.11	10.10	10.17	10.10	10.2	10.9	10.5
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.58	2.57	2.60	2.53	3.20	2.43	3.03	3.33	4.02	2.69	2.26	2.74	2.14
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	112.0	116.0	138.4	114.2	105.2	121.0	129.0	137.4	95.6	
①株高 ③第二期	103.8	102.6	123.8	106.0	93.4	107.8	116.8	115.0	79.6	108.2
④有效分蘖 ②第一期	12.6	14.2	13.0	13.8	14.0	12.6	12.6	13.4	15.0	
④有效分蘖 ③第二期	10.0	12.0	11.2	13.6	11.4	10.0	12.6	13.0	12.0	11.4
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	P	Gn	P	Gn	P	Gn	P	P	Gn	P
⑦穗重(g)	2.26	3.26	2.96	2.30	2.78	2.50	2.64	2.30	1.88	2.54
⑧芒	—	—	—	R S	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	B P	W	B P	W	B P	W	B P	B P	W	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	R P	L Gn	R P	L Gn	R P	L Gn	R P	R P	L Gn	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	○	○	×	×	○	○	×	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_2M_2	R_2	S_5	R_2	R_1M_2	R_2	R_2	R_1	R_2	R_2
⑮葉稻熱病	4	5		4	5	5	4	4	5	
⑯穗頸稻熱病	90	95		100	100	100	100	80	100	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	35.7	38.2	25.0	49.1	31.9	44.1	41.7	41.1	51.1	37.1
⑰紋枯病 ⑲被害度%	4.3	7.0	4	15.9	13.8	11.8	11.5	13.0	11.9	7.8
⑳倒伏性	／	—	|	|	|	|	／	|	|	|
㉑耐旱性	d	+	d	d	#	d	+	d	d	d
㉒耐肥性	△	△	△	B	C	D	△	△	D	C
㉓脫粒性	9.7	5.1	16.5	5.2	10.1	19.2	32.0	5.7	10.7	11.1
㉔出穗期 ②第一期	6.6	6.8	6.16	6.12	6.2	6.11	6.8	6.8	6.4	
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.3	10.5	10.20	10.18	9.24	10.6	10.8	10.6	9.21	10.7
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.70	3.21	2.79	2.95	2.83	2.70	2.92	2.79	3.05	3.21
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211
一、形態的特性													
①株高 ②第一期		100.8	102.2	119.2	124.0		134.6	94.6	140.5	110.6	119.4	108.9	128.6
①株高 ③第二期	114.6	90.2	95.4	101.0	105.0	106.8	112.2	85.0	134.8	104.6	94.0	100.5	111.4
④有效分蘖 ②第一期		13.4	11.8	11.0	13.5		11.2	10.0	9.1	14.4	12.6	12.0	9.8
④有效分蘖 ③第二期	12.0	12.2	12.2	9.8	11.2	13.6	11.6	10.6	7.2	12.0	10.4	10.9	9.2
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	P	Gn	P	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P
⑦穗重(g)	3.74	1.62	2.52	3.60	3.48	2.84	3.42	3.04	4.00	2.02	2.72	2.16	2.92
⑧芒	—	R S	—	—	P L	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	B P	W	B P	W	W	B P	W	W	W	W	W	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	R P	L Gn	R P	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	W S	Y S	Y S	B F	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	R_2	R_1	0	0	0	S_1	R_1	0	0	0	0	0	0
⑮葉稻熱病		3	4	4	4		4	5	4	4	4	5	5
⑯穗頸稻熱病		100	100	100	90		100	100	100	100	100	80	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	32.4	42.8	26.0	32.7	29.7	26.7	37.1	37.3	24.6	33.5	33.0	31.6	46.0
⑰紋枯病 ⑲被害度%	3.5	2.8	9.8	6.9	17.6	5.3	11.5	1.9	2.6	1.2	1.3	2.5	12.6
⑳倒伏性	|	／	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	／
㉑耐旱性	#	d	d	#	d	d	#	d	+	d	D	±	d
㉒耐肥性	B	D	△	B	△	△	D	△	△	D	△	C	D
㉓脫粒性	4.2	16.0	18.3	13.3	2.3	4.8	8.7	3.3	1.0	8.9	11.0	18.5	15.0
㉔出穗期 ②第一期		6.3	6.10	6.9	6.25		6.10	5.24	6.24	6.5	6.10	6.6	6.10
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.10	10.3	10.16	10.11	10.3	10.2	10.14	10.2	10.23	10.5	10.8	10.5	10.6
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	3.45	2.85	2.48	2.26	2.31	2.73	2.58	2.56	2.70	3.01	2.81	2.94	3.08
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	1212	1213	1215	1216	1217	1220	1221	1222	1223	1225
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	107.6	125.4	128.0	127.4	139.6			105.8	112.0	110.8
①株高 ③第二期	81.0	108.8	114.4	103.8	128.0	93.4	114.0	92.2	87.0	85.8
④有效分蘖 ②第一期	12.2	12.2	13.8	11.0	12.2			13.2	16.0	14.8
④有效分蘖 ③第二期	12.4	11.4	12.6	10.0	10.0	14.2	14.8	11.2	13.6	13.2
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.72	3.24	2.28	2.96	3.68	2.92	1.94	2.00	2.50	2.78
⑧芒	—	—	—	P L	—	—	—	—	—	—
⑥柱頭色	W	W	B P	W	W	B P	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×
⑬稃色	W S	Y S	L G d	Y S	Y S	G	L G d	W S	Y S	L G d
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_2	0				0	0	0	0	M_2
⑮葉稻熱病	4	3	3		4	4	4	4	5	5
⑯穗頸稻熱病	100	100	90		100			100	100	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	41.6	41.0	31.7	39.5	9.5	16.0	14.8	33.2	30.9	
⑰紋枯病 ⑲被害度%	10.6	5.4	16.8	6.3	3.2	1.9	8.9	6.2	3.2	
⑳倒伏性	/	/	—	—	/	｜	/	—	/	｜
㉑耐旱性	±	d	d	#	d	d	d	d	d	d
㉒耐肥性	C	△	C	△	C	△	△	D	B	△
㉓脫粒性	9.6	15.4	17.5	10.8	5.4	8.5	6.7	7.0	9.6	6.5
㉔出穗期 ②第一期	6.2	6.14	6.3	6.9	6.14	7.3		6.2	6.10	6.9
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	9.22	10.19	9.28	10.9	10.19	10.6	10.13	9.30	10.8	9.30
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.75	2.76	2.92	2.73	2.70	2.27	3.65	2.62	2.97	3.10
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調査項目 Items	1226	1227	1228	1229	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1239	1241
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	120.8	109.6	135.2	94.2	130.2		115.6	142.6	103.6	92.2	118.4	127.0	117.6
①株高 ③第二期	110.8	88.6	117.6	85.0	112.4	109.0	101.8	119.0	97.0	91.8	99.8	104.8	98.8
④有效分蘖 ②第一期	12.2	13.4	8.8	15.4	12.3		15.4	11.6	11.0	9.4	12.6	11.8	12.6
④有效分蘖 ③第二期	11.2	11.6	7.8	14.0	10.0	13.8	14.0	11.0	10.6	9.6	10.2	10.4	9.0
⑤葉色	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn
⑦穗重(g)	3.74	2.48	2.30	1.22	3.82	2.52	2.02	4.02	2.56	2.44	2.58	2.68	3.30
⑧芒	—	F L	F L	—	—	—	—	—	—	—	—	R M	—
⑥柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	B P	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
⑬稃色	Y S	Y S	W S	W S	Y S	Y S	L G d	Y S	B F	Y S	W S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病		S_6	S_1	R_1	M_1	R_3	S_6	0	0	S_3	R_1	0	S_2
⑮葉稻熱病	4			3	4	5		4	5		3	4	
⑯穗頸稻熱病	95			90	85			90	100		100	100	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	31.6	49.2		36.8	35.5	23.9	26.6	34.2	15.1	16.1	27.9	26.8	37.1
⑰紋枯病 ⑲被害度%	5.4	21.1		5.0	5.2	2.4	6.6	8.2	8.6	5.3	14.3	3.5	8.9
⑳倒伏性	｜	｜	/	/	｜	｜	—	｜	/	｜	/	｜	｜
㉑耐旱性	d	—	—	#	#	d	d	d	d	d	d	d	+
㉒耐肥性	△	D	D	D	△	B	E	△	B	C	△	D	D
㉓脫粒性	8.0	16.4	7.8	9.9	5.3	13.2	11.9	15.4	17.2	5.7	31.4	12.7	18.8
㉔出穗期 ②第一期	6.10	6.2	6.3	6.2	6.27		6.3	6.6	5.22	5.24	6.10	6.11	6.9
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.7	9.27	9.29	9.30	10.18	10.15	9.29	10.7	9.22	9.24	10.7	10.13	10.7
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	3.28	2.21	2.51	2.80	2.75	2.88	2.99	2.64	2.71	2.40	2.52	2.72	2.70
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	121.6	126.6	126.8	127.0	123.8	118.2			123.2	134.0
①株高 ③第二期	106.3	103.6	103.2	100.8	110.0	89.3	100.5	96.4	97.4	112.0
④有效分蘗 ②第一期	10.8	11.6	14.0	12.8	12.6	14.6			13.0	10.4
④有效分蘗 ③第二期	9.8	12.6	13.0	11.6	10.8	14.4	16.4	13.0	11.2	10.4
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	P	P
⑦穗重（g）	2.56	2.22	2.90	3.42	2.10	1.21	2.68	3.08	2.24	1.84
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	B P	W	W	W	B P	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	R P	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	○	×	×	×	○	○
⑬稃色	Y S	Y S	W S	Y S	Y S	L G d	L G d	L G d	W S	W S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	0	M_2	0	0	0	S_1	0	R_1	0	0
⑮葉稻熱病	4	4	4	5	4		5	5	4	4
⑯穗頸稻熱病	100	100	100	100	100		100	100	100	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	39.1	38.0	32.0	36.1	29.0	30.7	27.4	24.7	33.2	15.9
⑰紋枯病 ⑲被害度%	20.1	22.9	10.3	7.5	10.5	6.2	4.2	6.0	10.2	1.6
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	／
㉑耐旱性	卄	d	卄	d	d	d	d	d	d	d
㉒耐肥性	D	B	△	D	D	△	△	△	△	B
㉓脫粒性	18.0	19.7	16.6	5.7	16.2	8.5	7.5	9.2	15.2	9.8
㉔出穗期 ②第一期	6.17	6.8	6.11	6.12	6.10	6.5			6.6	6.21
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.15	10.5	10.1	10.7	10.8	9.30	10.6	10.13	10.6	10.22
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.80	3.47	3.20	3.13	2.71	3.17	2.52	2.59	2.87	2.84
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	110.6	131.2	118.6	130.0	120.4	110.4	134.8		125.0	118.6	105.4	112.6	
①株高 ③第二期	96.8	114.6	105.6	104.8	105.2	90.6	119.8	111.2	106.2	94.2	84.6	92.6	102.6
④有效分蘗 ②第一期	12.8	12.4	12.6	13.6	11.6	9.8	13.0		13.8	13.4	16.6	13.0	
④有效分蘗 ③第二期	10.0	10.0	12.8	12.2	9.6	9.4	13.6	12.4	13.5	11.6	16.6	12.8	14.8
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	2.44	2.21	2.12	3.10	3.70	2.68	3.24	3.04	3.26	2.46	1.78	2.18	2.50
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	L G d	Y S	Y S	Y S	B F	Y S	Y S	W S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	0	R_1	0	0	M_1	S_1	S_3	R_1	0	0	M_1	M_1	0
⑮葉稻熱病		4	4	4	4			4	4	4		5	5
⑯穗頸稻熱病		100	100	100	0			10	90	100		100	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	34.2	30.5	27.6	22.0	30.3	33.7	21.1	17.7	26.2	19.0	20.5	23.5	25.5
⑰紋枯病 ⑲被害度%	8.9	11.5	11.0	21.8	15.9	5.0	2.6	12.7	8.3	15.5	18.3	3.3	19.4
⑳倒伏性	—	|	|	|	|	|	|	／	／	—	／	|	／
㉑耐旱性	d	d	卄	＋	d	d	＋	d	d	d	d	d	d
㉒耐肥性	C	A	△	C	B	D	D	△	C	C	C	△	B
㉓脫粒性	10.7	5.6	20.6	13.2	14.6	9.7	13.7	7.5	4.3	18.7	11.2	16.5	2.4
㉔出穗期 ②第一期	6.9	6.15	6.18	6.14	6.8	6.2	6.13		6.24	6.13	6.3	6.6	
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.8	10.15	10.16	10.7	10.11	10.8	10.15	10.12	10.18	10.8	9.24	10.7	10.14
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.49	2.43	2.75	2.83	2.45	2.93	2.71	2.61	2.84	2.42	2.99	2.71	3.00
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1275
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	137.6	123.8	113.8	127.4	136.2	111.8	88.8	111.6	132.6	102.4
①株高 ③第二期	117.2	101.0	99.0	104.0	112.2	99.0	69.0	102.8	129.2	99.8
④有效分蘗 ②第一期	13.0	12.2	12.8	13.4	12.0	13.0	12.6	13.0	12.0	11.4
④有效分蘗 ③第二期	12.8	11.6	10.0	13.2	11.8	8.8	12.7	14.2	9.8	11.8
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P
⑦穗重（g）	2.98	2.14	2.82	2.82	4.02	2.62	2.74	3.22	2.32	3.30
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
⑬稃色	Y S	W S	Y S	L Gd	Y S	Y S	W S	Y S	W S	W S
二、生理的特性										
⑪幼苗稻熱病	0	0	R_1	R_1	0	0	0	0	R_1	S_1
⑮葉稻熱病	5	3	4	4	4	4	3	4	5	
⑯穗頸稻熱病	100	100	100	100	100	100	90	100	100	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	29.6	22.8	29.1	29.0	37.8	32.3	16.7	23.9	32.8	39.0
⑰紋枯病 ⑲被害度%	25.5	20.2	6.2	10.0	29.7	14.7	4.2	11.0	11.9	9.9
⑳倒伏性	|	|	／	|	|	／	／	／	—	／
㉑耐旱性	d	d	d	d	d	d	d	d	d	＋
㉒耐肥性	B	△	△	△	D	D	C	D	△	C
㉓脫粒性	5.3	25.2	14.2	15.6	12.8	23.6	13.9	8.7	12.8	11.5
㉔出穗期 ②第一期	6.16	6.10	6.9	6.14	6.15	6.8	5.27	6.9	6.19	5.21
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.13	10.8	10.12	10.14	10.11	10.13	9.25	10.4	10.20	9.24
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.69	2.50	3.39	2.61	3.50	2.75	2.97	2.86	3.04	2.59
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調查項目 Items	1276	1277	1278	1279	1281	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	103.0	118.8	108.2	134.6	99.0	129.6	105.4		132.4	96.8	1160.	121.8	132.6
①株高 ③第二期	96.2	96.8	85.4	111.0	80.0	109.0	87.8	95.6	109.0	81.1	97.2	104.0	117.4
④有效分蘗 ②第一期	12.0	14.2	12.6	13.6	13.2	15.8	12.2		12.4	15.2	15.8	13.4	13.4
④有效分蘗 ③第二期	12.6	13.0	11.2	12.1	11.5	13.5	11.0	14.0	12.0	13.2	13.4	13.4	13.8
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	P	Gn	P	P	Gn	P	P	Gn	P	Gn	Gn	Gn	P
⑦穗重（g）	2.78	3.42	2.94	2.94	2.10	2.84	2.60	1.76	2.56	2.08	3.04	2.30	3.08
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	B P	W	B P	B P	W	B P	B P	W	B P	W	B P	W	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	R P	L Gn	R P	R P	L Gn	R P	R P	L Gn	R P	L Gn	R P	L Gn	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	○	○	×	○	○	×	○	×	○	○	○
⑬稃色	W S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	W S	L Gd	W S	L Gd	Y S	W S	Y S
二、生理的特性													
⑪幼苗稻熱病	M_1	M_1	M_1	0	S_1	0	R_1	S_1	0	0	0	R_1	0
⑮葉稻熱病	5	4	5	5		5	5		5	5	5	4	4
⑯穗頸稻熱病	100	95	100	95			100		95	100	100	90	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	33.4	28.6	33.7	31.2	16.6	7.8	25.4	19.6	2.8	18.8	24.3	18.9	19.7
⑰紋枯病 ⑲被害度%	6.2	23.4	31.7	9.8	7.3	0.7	8.3	12.7	3.3	7.9	24.2	8.3	7.0
⑳倒伏性	／	|	／	／	|	／	／	／	／	／	／	／	／
㉑耐旱性	d	d	＋	d	—	d	＋	d	d	＃	d	—	d
㉒耐肥性	D	D	D	C	D	△	C	B	△	B	D	△	△
㉓脫粒性	7.9	8.8	10.9	12.9	12.4	8.5	3.8	4.6	18.8	18.3	5.3	12.4	8.4
㉔出穗期 ②第一期	5.21	6.19	6.9	6.13	6.8	6.15	6.1		6.12	6.6	6.15	6.11	6.17
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	9.20	10.17	10.12	10.12	10.9	10.13	9.22	10.14	10.8	10.7	10.13	10.8	10.19
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.62	2.53	2.75	2.63	2.02	2.66	2.84	3.14	3.01	2.77	2.71	2.05	2.91
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	126.4	130.0	130.0	126.2	138.4	132.8	116.4	112.4	106.2	129.0
①株高 ③第二期	107.7	110.4	108.4	108.8	110.8	114.4	97.2	94.6	91.6	116.2
④有效分蘖 ②第一期	14.2	13.5	15.8	13.8	14.8	13.4	12.2	14.8	13.6	9.6
④有效分蘖 ③第二期	15.0	12.4	14.8	13.0	12.0	11.0	12.0	14.6	14.6	9.6
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	P	P	Gn	P	P	Gn	P	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.38	2.78	2.76	2.46	3.32	2.32	2.26	2.36	2.58	4.30
⑧芒	—	—	—	—	—	R S	R S	R S	R S	R S
⑨柱頭色	B P	B P	W	B P	B P	W	B P	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	R P	R P	L Gn	R P	R P	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×
⑬稃色	W S	Y S	Y S	Y S	B F	B F	L Gd	W S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	0	0	0	0	0	S_2	0	R_2	R_2	0
⑮葉稻熱病		4	5	4	4		5	5	5	5
⑯穗頸稻熱病		95	100	80	95		95	100	100	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	22.7	31.1	28.3	23.0	23.6	24.3	21.5	40.6	51.2	17.2
⑰紋枯病 ⑲被害度%	5.8	6.4	14.2	9.0	7.0	22.7	7.6	20.5	31.1	6.8
⑳倒伏性	—	／	—	—	—	—	—	／	—	—
㉑耐旱性	卄	卄	d	d	d	d	卄	卄	d	d
㉒耐肥性	E	C	△	B	△	D	△	△	△	D
㉓脫粒性	9.2	15.8	14.5	11.4	14.5	17.2	13.3	15.3	3.9	8.8
㉔出穗期 ②第一期	6.8	6.9	6.12	6.15	6.8	6.8	6.8	6.10	6.9	6.14
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.11	10.9	9.30	10.13	10.7	10.6	9.30	9.26	9.25	10.14
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.69	2.71	3.51	2.70	2.82	2.80	2.80	3.47	3.41	3.01
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1310	1311	1312	1313	1314
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	132.6	138.8	118.4	125.6	128.0	124.2		128.2	123.4	126.2	113.8	105.0	117.2
①株高 ③第二期	116.8	115.0	109.6	110.7	109.6	108.2	99.6	104.6	106.8	108.0	102.8	95.2	110.2
④有效分蘖 ②第一期	12.4	12.2	10.4	10.6	11.6	12.8		9.8	13.0	13.6	15.6	14.6	12.4
④有效分蘖 ③第二期	12.2	11.4	11.8	9.5	9.4	11.2	12.6	11.8	10.8	10.2	13.2	12.2	11.6
⑤葉色	L Gn	L Cn	L Cn	L Cn	L Cn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	P	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.54	2.16	3.40	3.06	2.94	3.02	2.18	4.02	2.02	3.90	2.34	2.18	3.04
⑧芒	R S	R S	R S	R S	R S	—	—	—	—	—	P M	—	—
⑨柱頭色	R P	W	W	B P	W	W	W	W	B P	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	P	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	L Gd	Y S	Y S	Y S	L Gd	L Gd	Y S	Y S	W S	W S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R_1	S_1	M_1	0
⑮葉稻熱病	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5		5	
⑯穗頸稻熱病		100	100	75	100	0		100	100	100		100	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	33.6	31.7	33.0	24.1	23.8	43.1	28.9	25.6	23.3	25.6	24.8	9.0	4.2
⑰紋枯病 ⑲被害度%	30.4	30.1	12.2	9.3	15.2	30.3	3.5	10.3	8.2	6.5	22.1	6.5	3.7
⑳倒伏性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	|	—	—
㉑耐旱性	d	d	d	卄	d	d	d	d	d	卄	d	d	d
㉒耐肥性	C	△	D	△	C	C	△	C	B	C	B	C	E
㉓脫粒性	9.0	21.7	12.9	28.3	30.6	22.5	1.6	10.4	7.9	9.2	21.4	23.8	13.2
㉔出穗期 ②第一期	6.11	6.14	6.10	6.6	6.10	6.10		6.12	6.13	6.14	6.26	6.10	6.8
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.11	10.11	10.12	10.4	10.7	10.6	10.9	10.12	10.6	10.14	10.4	10.10	10.7
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.70	2.83	3.63	2.60	2.59	2.87	2.89	2.41	2.64	3.49	2.56	2.74	2.76
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調査項目 Items \ 品種代號 Variety Number	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1324
一、形態的特性									
①株高 ②第一期	128.8	113.6	110.8	114.0	121.2	120.0	114.6	125.8	115.6
①株高 ③第二期	117.8	101.4	106.6	106.6	113.4	106.0	92.6	108.8	99.4
④有效分蘖 ②第一期	12.4	14.4	13.8	14.0	11.4	12.8	13.6	13.8	11.0
④有效分蘖 ③第二期	10.4	12.8	11.0	13.8	12.0	10.4	12.0	11.6	10.6
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.92	2.52	2.64	3.06	3.10	3.10	3.04	2.84	2.80
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	○
⑬稃色	W S	Y S	Y S	W S	Y S	W S	W S	Y S	W S
二、生理的特性									
⑭幼苗稻熱病	0	S_1	0	S_1	S_1	0	S_1	0	0
⑮葉稻熱病	5		5			4		5	5
⑯穗頸稻熱病	100		100			100		100	95
⑰紋枯病 ⑱被害率%	9.0	15.9	28.5	20.7	29.1	32.0	29.6	17.3	18.0
⑰紋枯病 ⑲被害度%	0.9	5.9	24.4	14.7	18.5	9.3	22.6	5.4	14.9
⑳倒伏性	—	—	—	—	—	—	—	—	—
㉑耐旱性	d	d	d	d	+	d	d	d	d
㉒耐肥性	E	D	D	D	C	△	△	B	B
㉓脫粒性	15.8	19.8	10.4	19.0	12.9	18.4	15.8	16.2	9.4
㉔出穗期 ②第一期	6.12	6.10	6.8	6.7	6.11	6.9	6.9	6.13	6.7
㉔出穗期 ㉕中間作									
㉔出穗期 ③第二期	10.9	10.6	10.7	10.10	10.10	10.4	10.2	10.16	10.4
三、穀粒的特性									
㉖穀粒形狀	3.35	3.11	2.75	2.66	2.86	3.69	2.93	2.41	2.98
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考									

	1325	1327	1328	1329	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339
	115.8	113.0	116.2	97.6	107.8	116.0	142.0	122.8	113.4			107.8	126.4
	96.6	98.6	96.6	74.4	95.8	107.4	123.6	115.6	109.4	117.6	114.6	99.0	121.0
	12.4	14.2	17.0	13.2	11.2	14.2	14.6	13.6	10.2			16.2	13.4
	10.6	14.8	15.2	10.0	11.2	13.6	12.6	11.2	11.0	15.4	10.4	14.6	12.2
	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	P	P	Gn	Gn
	3.68	3.52	2.24	2.92	2.44	2.18	3.08	3.12	2.00	2.36	2.28	2.08	3.38
	—	—	—	F L	—	F L	—	—	—	—	—	—	—
	W	W	W	W	W	W	B P	W	W	W	W	W	W
	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	P	P	P	L Gn
	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×	×
	W S	W S	Y S	W S	Y S	Y S	W S	W S	W S	Y S	Y S	W S	W S
	0	S_1	S_3	S_4	0	S_3	S_4	R_1	0	0	R_1	S_1	R_1
	5				5			4	5	5	4		4
	95				100			100	100		100		100
	27.1	34.5	32.1	31.0	41.8	26.1	42.0	35.3	36.3	15.3	30.9	24.6	24.2
	21.4	16.0	11.4	17.8	26.5	20.1	5.8	25.1	6.5	7.6	27.8	6.6	3.9
	—	|	—	／	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d	d	d	±	d	—	—	d	d	d	d	d	⧺
	△	C	C	C	C	C	△	△	△	B	C	△	C
	23.4	3.4	3.6	17.8	18.1	7.3	6.5	9.6	15.0	1.9	4.8	11.6	6.5
	6.12	6.6	6.6	5.29	5.31	6.7	6.18	6.14	5.24			6.6	6.12
	10.14	10.2	9.30	9.24	9.29	10.2	10.22	10.12	9.27	10.10	10.11	10.11	10.12
	2.31	2.79	2.73	2.08	2.64	2.08	2.76	3.00	2.98	4.06	3.65	2.44	2.70
	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	128.0	122.4	112.8	120.8	130.8	136.2	129.8	120.6		89.0
①株高 ③第二期	120.2	107.8	93.8	111.8	123.6	120.4	115.4	103.8	93.6	93.8
④有效分蘖 ②第一期	14.6	14.6	14.2	13.2	12.0	11.0	14.6	15.2		15.8
④有效分蘖 ③第二期	12.4	11.2	11.8	13.6	11.6	9.2	12.8	13.4	27.8	14.4
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	P	Gn	P	P	P	P	P	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.54	2.80	2.46	2.10	2.62	2.32	2.62	3.00	2.10	1.92
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	B P	W	B P	B P	B P	B P	B P	B P	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	R P	L Gn	R P	R P	R P	R P	R P	R P	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×
⑬稃色	W S	W S	W S	Y S	Y S	W S	W S	Y S	B F	W S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	0	0	0	R_1	S_1M_1	0	S_2	0	R	R_1
⑮葉稻熱病	5	5	4	3		4		4	5	4
⑯穗頸稻熱病		100	100	100		100		100	80	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	20.6	42.2	32.5	17.9	33.5	28.3	26.5	24.1	22.4	0.8
⑰紋枯病 ⑲被害度%	3.0	18.6	6.3	17.2	9.4	26.0	5.6	5.3	11.9	4.0
⑳倒伏性	—	／	—	—	—	—	—	—	／	|
㉑耐旱性	卄	+	+	+	+	±	+	+	+	+
㉒耐肥性	△	C	D	△	E	△	C	△	△	△
㉓脫粒性	11.0	10.7	6.8	13.3	15.3	6.0	11.5	15.3	3.8	11.1
㉔出穗期 ②第一期	6.8	6.19	5.29	6.9	6.9	6.9	6.10	6.10		5.31
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.4	10.18	9.29	10.7	10.8	10.4	10.12	10.11	10.10	9.30
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.65	2.65	2.97	2.86	3.37	2.99	2.83	2.86	2.40	2.67
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1364
一、形態的特性													
①株高 ②第一期			110.8					132.8	109.6		123.0	112.4	121.9
①株高 ③第二期	100.0	106.6	103.4	95.4	105.8	120.6	104.8	107.7	104.8	113.6	103.0	93.2	109.0
④有效分蘖 ②第一期			14.2					10.0	12.2		12.8	13.4	12.4
④有效分蘖 ③第二期	15.4	14.2	13.6	13.4	16.0	12.2	12.6	8.7	12.4	15.0	12.6	11.6	10.4
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	P	P
⑦穗重(g)	2.36	2.44	2.20	3.80	3.04	2.64	3.38	2.16	2.58	2.00	2.52	3.18	3.84
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	B P	B P	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	R P	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
⑬稃色	Y S	L Gd	Y S	Y S	Y S	B F	Y S	R B	Y S	D P	Y S	L Gd	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	0	R	0	0	R	0	M_1	R_1	0	R	M_1	R_1	0
⑮葉稻熱病	4	5		5	5	5	5	4	5	5	5	4	5
⑯穗頸稻熱病						30		100	100	100	80	80	80
⑰紋枯病 ⑱被害率%	12.7	20.0	19.7	27.2	18.5	28.1	32.9	23.1	42.6	30.8	29.1	28.4	22.0
⑰紋枯病 ⑲被害度%	6.7	10.1	18.3	8.2	14.8	11.6	14.0	3.3	36.9	6.5	11.6	14.0	6.4
⑳倒伏性	／	|	—	—	|	|	|	—	—	|	—	—	—
㉑耐旱性	+	d	+	d	d	d	d	d	±	+	d	d	+
㉒耐肥性	B	C	D	C	△	B	B	△	△	△	C	△	C
㉓脫粒性	10.2	16.7	7.2	7.9	10.5	8.3	4.3	9.3	7.8	8.9	41.5	13.2	7.9
㉔出穗期 ②第一期			6.3					6.12	6.7		6.1	6.9	6.16
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.10	10.8	9.20	10.9	10.14	10.16	10.16	10.18	10.7	10.16	9.30	10.8	10.8
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	3.88	2.90	2.90	2.47	2.40	2.62	2.40	2.17	2.47	2.43	2.87	3.31	2.66
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	1365	1366	1367	1368	1370	1371	1372	1373	1374	1375
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	128.2	130.0	137.2	112.6	125.2	126.6	131.2	109.8	109.3	93.7
①株高 ③第二期	107.6	110.6	107.2	92.6	105.0	112.0	118.2	103.0	96.2	85.2
④有效分蘖 ②第一期	10.8	11.6	10.6	12.0	10.6	12.8	13.0	13.4	10.4	14.0
④有效分蘖 ③第二期	8.2	10.6	8.2	10.2	10.6	10.0	10.4	13.4	12.0	15.6
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	P	Gn	Gn	P	Gn	P	P	P	Gn	P
⑦穗重(g)	1.90	3.24	3.38	3.38	3.12	3.90	3.90	3.24	2.61	2.11
⑧芒	—	R S	R S	R S	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	B P	W	W	B P	W	B P	B P	B P	W	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	R P	L Gn	L Gn	R P	L Gn	R P	R P	R P	L Gn	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	×	○	×	○	○	○	×	○
⑬稃色	B F	L G d	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	B F
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	0	R_1	R_1	M_1	R_1	0	0	0	0	0
⑮葉稻熱病	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5
⑯穗頸稻熱病	100		100		100	100	100	100	100	60
⑰紋枯病 ⑱被害率%	29.7	34.4	29.9	27.1	17.2	32.2	20.1	33.2	27.6	34.7
⑰紋枯病 ⑲被害度%	11.5	26.6	7.7	7.0	7.5	8.9	3.0	22.0	19.1	2.5
⑳倒伏性	—	—	—	—	|	—	—	／	／	／
㉑耐旱性	±	+	+	d	±	+	±	+	d	+
㉒耐肥性	C	D	△	△	D	△	C	C	C	△
㉓脫粒性	17.9	11.1	11.8	19.5	10.1	7.6	7.7	6.4	12.4	18.2
㉔出穗期 ②第一期	6.6	6.10	6.10	6.16	6.17	6.11	6.17	6.12	6.16	5.29
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.5	10.14	10.11	10.7	10.14	10.8	10.21	10.10	10.12	9.25
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.75	2.41	2.41	2.62	3.10	2.84	2.74	2.27	2.21	2.75
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	120.7	115.1	128.7	111.6	119.2	113.6	115.8	115.6	118.2	112.2	137.2	113.8	124.6
①株高 ③第二期	109.2	111.0	120.6	96.0	96.8	100.2	95.8	106.2	105.2	98.6	121.6	102.0	107.8
④有效分蘖 ②第一期	10.7	9.6	10.5	12.6	12.0	13.0	11.8	13.4	16.2	14.0	10.8	12.0	11.4
④有效分蘖 ③第二期	9.0	9.2	11.6	10.2	10.8	12.8	12.0	11.8	15.8	13.6	10.8	11.2	10.8
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	P	P	P	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	P	P
⑦穗重(g)	2.67	2.53	2.45	2.84	3.02	2.70	2.78	3.18	1.90	2.26	3.70	3.00	3.80
⑧芒	—	—	—	—	R S	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	B P	B P	B P	W	B P	W	W	W	W	W	B P	B P	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	R P	R P	R P	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	R P	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	L G d	Y S	Y S	L G d	Y S	Y S	Y S	L G d	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	0	0	0	0	0	0	0	M_1	0	0	0	0	0
⑮葉稻熱病	5	5	5	5		5	4	5	4	4	5		4
⑯穗頸稻熱病	100	60	100	100		100	100	100	100	100	100		100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	26.4	37.5	32.4	40.0	28.4	23.1	32.1	45.1	34.7	29.4	23.2	44.7	33.1
⑰紋枯病 ⑲被害度%	6.0	9.7	29.8	26.0	3.8	12.4	30.8	28.0	4.8	14.5	7.1	40.0	12.7
⑳倒伏性	—	—	—	—	／	—	—	—	—	—	—	—	—
㉑耐旱性	+	+	±	d	++	d	+	+	+	+	±	+	+
㉒耐肥性	C	△	B	△	△	△	B	D	△	C	C	D	E
㉓脫粒性	17.4	8.5	12.7	16.2	13.9	9.7	8.6	11.3	11.6	71.7	4.0	19.3	8.9
㉔出穗期 ②第一期	6.9	6.9	6.17	6.7	6.9	6.12	6.8	6.11	6.16	6.6	6.16	6.9	6.9
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.5	10.6	10.9	10.5	10.4	10.10	10.4	10.12	10.20	10.5	10.6	10.6	10.7
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.31	2.47	2.74	2.78	2.43	2.82	2.80	2.59	3.24	2.86	2.93	2.67	2.48
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	106.8	91.8	117.8	129.2	129.4	126.2	122.6	117.0	99.0	
①株高 ③第二期	95.0	90.2	112.0	110.8	105.6	107.4	110.2	96.4	80.4	106.0
④有效分蘖 ②第一期	12.6	13.8	11.6	12.6	12.8	13.2	12.6	13.4	11.4	
④有效分蘖 ③第二期	13.6	14.0	10.6	10.6	12.2	11.8	11.2	13.2	11.0	12.8
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	P	Gn	P	P	Gn	Gn	P	Gn
⑦穗重(g)	2.12	2.34	2.40	3.68	3.74	2.60	2.52	3.30	2.36	2.52
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	B P	W	B P	B P	W	W	B P	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	R P	L Gn	R P	R P	L Gn	L Gn	R P	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	×	○	○	×	×	○	×
⑬稃色	Y S	L G d	Y S	Y S	L Gn	L G d	Y S	Y S	L G d	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	M_1	0	S_1	0	0	M_1	0	0	0	0
⑮葉稻熱病	5	4		5	5	5	4	5	4	5
⑯穗頸稻熱病	90	100		100	100	100	20	100	100	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	31.8	27.7	42.9	26.2	28.7	31.7	35.6	42.0	44.2	46.8
⑰紋枯病 ⑲被害度%	7.4	22.0	22.7	7.8	4.1	10.7	12.6	25.8	36.9	12.2
⑳倒伏性	—	|	—	—	—	—	—	—	—	—
㉑耐旱性	±	±	+	+	+	+	d	+	+	d
㉒耐肥性	E	D	C	△	△	D	△	△	E	C
㉓脫粒性	12.3	7.2	20.8	6.0	10.1	11.5	9.5	12.7	12.8	6.5
㉔出穗期 ②第一期	6.8	5.23	6.5	6.9	6.10	6.10	6.10	6.8	6.1	
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.5	9.26	10.4	10.12	10.6	10.11	10.4	10.6	9.29	10.18
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	3.26	2.79	2.48	2.38	2.77	2.75	2.82	2.72	2.11	2.63
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	115.0	120.0	130.8	117.6	130.0	128.4	125.4	120.8	133.0	106.8	115.2	133.0	120.4
①株高 ③第二期	97.2	100.4	114.0	114.2	107.0	105.6	105.4	100.6	102.0	82.8	95.2	110.8	101.2
④有效分蘖 ②第一期	11.6	12.8	13.0	13.6	11.6	12.8	12.6	10.8	14.4	11.2	12.4	11.2	11.6
④有效分蘖 ③第二期	11.8	12.4	11.0	14.6	10.6	10.6	12.8	9.8	12.0	8.6	13.2	9.6	12.0
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	P	P	Gn
⑦穗重(g)	2.58	3.32	3.44	2.14	3.16	3.38	2.84	4.40	4.24	3.22	3.24	3.52	3.18
⑧芒	F L	—	—	--	—	—	—	—	—	P L	--	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	B P	W	B P	B P	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	R P	R P	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	×
⑬稃色	Y S	W S	Y S	Y S	W S	Y S	L G d	Y S	L G d	L G d	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	0	0	0	0	0	0	0	M_1	M_1	0	0	0	0
⑮葉稻熱病	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
⑯穗頸稻熱病	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	30.3	30.7	54.7	40.8	49.0	47.8	28.4	57.4	33.2	45.2	40.6	21.9	25.0
⑰紋枯病 ⑲被害度%	22.2	30.2	15.8	13.9	15.4	17.0	8.3	50.3	6.7	18.8	6.4	3.4	15.8
⑳倒伏性	|	—	/	—	—	—	—	—	—	|	—	—	—
㉑耐旱性	±	d	#	d	d	+	+	±	±	−	+	+	d
㉒耐肥性	△	△	△	B	C	△	C	D	△	△	△	C	C
㉓脫粒性	15.5	15.1	13.4	22.4	6.9	21.2	7.7	7.6	6.6	15.8	11.7	6.3	10.1
㉔出穗期 ②第一期	6.9	6.9	6.19	6.5	6.12	6.15	6.16	6.8	6.15	6.13	6.6	6.15	6.7
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	9.27	10.5	10.18	10.6	10.9	10.14	10.15	10.7	10.20	9.24	9.27	10.20	10.9
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.22	3.34	2.50	2.80	2.50	2.83	2.49	2.49	2.70	2.11	2.67	92.2	2.88
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	1414	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424
一、形態的特性										
①株 高 ②第一期	134.8	124.6	125.2	125.4	117.8	121.6	121.2	120.0	123.6	
①株 高 ③第二期	114.6	107.0	102.0	104.6	99.4	114.2	104.4	103.6	108.8	109.2
④有效分蘗 ②第一期	10.8	13.0	14.2	13.8	11.8	12.6	14.2	12.8	16.6	
④有效分蘗 ③第二期	10.4	12.2	12.0	11.8	11.4	10.8	12.0	11.0	14.6	11.6
⑤葉 色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Cn	L Gn	L Gn
⑥莖 基 色	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗 重 (g)	4.06	2.92	3.58	3.76	3.38	3.56	2.84	2.80	3.06	2.66
⑧ 芒	—	—	—	—	—	—	—	—	R S	—
⑨柱 頭 色	B P	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未 熟	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已 熟	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×
⑬稃 色	Y S	Y S	W S	Y S	Y S	L G d	Y S	Y S	Y S	L G d
二、生理的特性										
⑭幼 苗 稻 熱 病	0	0	M_1	0	0	R_1	0	R_1	0	0
⑮葉 稻 熱 病	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4
⑯穗 頸 稻 熱 病	95	100	80	100	100	100	100	100	100	60
⑰紋枯病 ⑱被害率%	20.1	22.4	29.5	27.8	41.3	24.6	25.5	30.8	26.0	17.7
⑰紋枯病 ⑲被害度%	3.2	10.0	25.1	8.2	10.9	7.6	25.3	8.1	7.1	15.6
⑳倒 伏 性	—	—	—	/	—	—	—	—	—	—
㉑耐 旱 性	++	++	+	+	d	+	++	+	+	d
㉒耐 肥 性	C	C	B	C	D	△	C	△	△	B
㉓脫 粒 性	30.5	27.4	10.0	36.7	16.0	22.5	19.7	10.7	8.6	24.0
㉔出穗期 ②第一期	6.15	6.8	6.12	6.12	6.9	6.7	6.8	6.8	6.16	
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.18	10.4	10.8	10.15	10.9	10.8	10.3	10.3	10.7	10.10
三、穀粒的特性										
㉖穀 粒 形 狀	2.86	2.78	2.99	2.93	2.67	2.56	2.79	3.04	2.48	3.00
㉗胚 乳 性 質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備 考										

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	1425	1426	1427	1429	1430	1431	1432	1433	1435	1436	1437	1438	1439
一、形態的特性													
①株 高 ②第一期	122.8			130.0	119.4	131.6	124.0	144.8	104.4	130.8			116.1
①株 高 ③第二期	108.4	105.0	92.6	110.0	105.8	106.2	113.4	120.8	99.2	110.2	102.4	81.3	83.4
④有效分蘗 ②第一期	12.0			10.6	14.4	13.6	11.0	9.4	13.0	13.0			14.6
④有效分蘗 ③第二期	12.2	13.2	13.4	10.0	13.6	11.8	10.4	7.8	11.2	11.4	16.8	15.3	13.2
⑤葉 色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖 基 色	P	Gn	Gn	P	Gn	P	P	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗 重 (g)	2.70	2.32	2.64	3.42	3.22	2.62	3.66	3.56	3.30	3.72	3.04	1.86	3.22
⑧ 芒	—	—	—	—	—	—	—	—	R S	R S	—	—	F L
⑨柱 頭 色	B P	W	W	B P	W	B P	B P	B P	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未 熟	R P	L Gn	L Gn	R P	L Gn	R P	R P	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已 熟	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	×	×
⑬稃 色	W S	L G d	L G d	B F	Y S	Y S	Y S	Y S	L G d	Y S	B F	Y S	L G d
二、生理的特性													
⑭幼 苗 稻 熱 病	0	R_1	0	0	0	0	0	0	M_1	0	0	0	0
⑮葉 稻 熱 病	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5
⑯穗 頸 稻 熱 病	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	28.2	32.6	25.7	29.9	29.5	42.5	25.5	41.0	26.4	33.8	34.1	41.5	15.3
⑰紋枯病 ⑲被害度%	6.1	6.8	3.4	1.1	11.9	31.7	11.4	10.5	9.7	8.4	13.7	19.4	7.8
⑳倒 伏 性	—	|	|	—	—	—	—	/	/	—	|	|	|
㉑耐 旱 性	++	d	d	+	+	++	++	d	++	d	+	—	—
㉒耐 肥 性	B	A	B	△	D	△	D	△	△	△	B	A	D
㉓脫 粒 性	8.9	2.6	7.6	12.3	11.2	20.6	7.7	10.7	8.9	7.5	12.5	14.0	5.0
㉔出穗期 ②第一期	6.13			6.12	6.9	6.8	6.9	6.12	6.21	6.15			6.1[illegible]
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.13	10.6	10.5	10.10	10.11	10.4	10.4	10.9	10.5	10.11	10.5	9.25	10.1
三、穀粒的特性													
㉖穀 粒 形 狀	2.66	3.27	2.52	2.68	2.41	2.63	2.72	2.93	2.69	3.37	2.45	2.26	2.10
㉗胚 乳 性 質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備 考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	115.2	115.0	91.6			99.8	114.6		126.1	115.4
①株高 ③第二期	100.0	102.4	83.3	94.8	118.2	86.6	87.6	100.0	108.8	99.8
④有效分蘖 ②第一期	14.2	14.2	16.5			14.8	11.4		12.2	11.6
④有效分蘖 ③第二期	14.2	15.4	14.7	15.6	14.8	13.6	14.6	12.6	13.6	11.6
⑤葉色	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	P
⑦穗重（g）	3.38	2.18	2.74	2.38	3.44	2.62	2.68	2.22	2.82	3.02
⑧芒	P L	—	P M	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	B P	W	W	W	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	×	×	○	×	×	×	○
⑬稃色	L Gd	B F	B F	Y S	Y S	L Gd	W S	Y S	W S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	0	0	M_1	S_2	S_1	0	S_1	0	0	0
⑮葉稻熱病	3	3	5			4		5	5	3
⑯穗頸稻熱病	60	50	100			80		100	90	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	21.1	39.4	27.0	16.2	26.7	20.9	14.0	20.1	22.7	27.7
⑰紋枯病 ⑲被害度%	6.7	39.3	6.7	2.0	3.8	6.2	14.0	10.0	11.3	16.2
⑳倒伏性	|	|	|	|	／	—	—	／	—	—
㉑耐旱性	＋	±	−	−	d	d	d	d	d	＋
㉒耐肥性	B	C	A	B	C	△	B	B	B	D
㉓脫粒性	5.9	4.6	7.9	13.5	5.5	22.1	17.2	2.7	19.9	11.3
㉔出穗期 ②第一期	6.22	6.5	6.21			6.2	6.7		6.9	6.8
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.7	9.22	9.25	9.29	10.10	9.28	10.6	10.6	10.8	10.5
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.70	2.85	2.23	2.17	3.84	3.00	2.58	2.81	2.70	2.70
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Cl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	1450	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1462	1463	1465
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	120.4	106.8	120.6	118.6	125.2	122.8	126.2	126.0	115.6	130.0	126.4	85.2	132.2
①株高 ③第二期	115.0	92.5	104.8	95.2	109.9	99.8	103.2	115.4	96.4	105.0	109.4	75.0	108.6
④有效分蘖 ②第一期	11.4	15.4	11.6	12.0	13.8	14.4	9.6	13.0	11.0	14.4	13.8	11.0	10.0
④有效分蘖 ③第二期	11.8	14.4	11.4	11.2	11.2	12.4	9.6	10.0	11.4	13.0	11.2	8.2	10.6
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	P	P	Gn	Gn	P	P	Gn	P	P	P	Gn	Gn
⑦穗重（g）	2.56	2.58	3.48	3.02	2.38	2.90	2.96	2.98	2.82	3.24	2.98	1.38	2.58
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R S	F L	—
⑨柱頭色	W	B P	B P	W	W	B P	B P	W	B P	B P	B P	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	R P	R P	L Gn	L Gn	R P	R P	L Gn	R P	R P	R P	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	○	×	×	○	○	×	○	○	○	×	×
⑬稃色	L Gd	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S_3	S_1
⑮葉稻熱病	4	5	4	5	5	5	5		5	5	4		
⑯穗頸稻熱病	80	100	100	100	100	100	100		100	70	100		
⑰紋枯病 ⑱被害率%	26.9	16.8	24.1	18.8	15.7	16.6	24.3		9.0	23.2	17.3	26.9	27.2
⑰紋枯病 ⑲被害度%	8.7	3.7	8.5	7.4	12.6	6.7	14.0		4.4	20.0	4.9	7.1	23.2
⑳倒伏性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	|	—
㉑耐旱性	＋	d	＋	d	＋	＋	⧺	＋	＋	＋	＋	−	⧺
㉒耐肥性	C	D	△	C	△	C	△	△	C	△	B	C	C
㉓脫粒性	10.9	8.7	11.5	20.5	10.1	15.2	8.8	5.4	16.3	5.6	12.1	24.0	10.6
㉔出穗期 ②第一期	6.4	6.8	6.7	6.9	6.10	6.7	6.12	6.18	6.4	6.24	6.10	5.15	6.8
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.2	10.6	10.4	10.4	10.7	10.3	10.12	10.18	10.3	10.20	10.9	9.24	10.6
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.64	2.78	2.73	2.75	2.75	2.75	2.78	2.45	2.87	2.57	2.56	2.93	2.85
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	1466	1467	1469	1470	1472	1473	1474	1475	1476	1477
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	117.2	126.0	123.4		116.2		119.2	122.8	128.6	118.2
①株高 ③第二期	104.4	103.4	106.2	97.6	89.4	77.0	101.6	113.4	108.2	98.0
④有效分蘖 ②第一期	10.8	13.0	12.4		14.4		13.4	12.2	11.4	12.6
④有效分蘖 ③第二期	9.6	11.8	13.3	13.0	14.6	14.8	13.0	12.4	9.8	12.6
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	P	Gn	P	Gn	Gn	P	P	P
⑦穗重（g）	2.50	3.76	3.56	3.78	3.62	1.44	3.18	3.54	2.70	3.64
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	B P	W	B P	W	W	B P	B P	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	R P	L Gn	R P	L Gn	L Gn	R P	R P	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	×	○	×	×	○	○	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	B F	Y S	Y S	W S	Y S	Y S	W S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	0	0	M_1	0	M_2	0	0	R_1	0	0
⑮葉稻熱病	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5
⑯穗頸稻熱病	100	95	95		100	100	100	100	100	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	20.9	25.4	23.8	18.0	18.4	19.2	24.0	25.5	17.1	16.1
⑰紋枯病 ⑲被害度%	20.4	22.3	4.2	10.4	3.9	9.5	20.6	17.4	16.9	10.4
⑳倒伏性	—	—	—	—	—	/	—	—	—	—
㉑耐旱性	—	⧺	d	±	+	d	+	+	d	⧺
㉒耐肥性	D	C	C	△	D	△	D		B	C
㉓脫粒性	16.0	10.6	7.3	4.7	22.1	16.7	19.4	14.1	16.3	15.9
㉔出穗期 ②第一期	6.8	6.12	6.12		6.9		6.8	6.4	6.8	6.9
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.2	10.9	10.14	10.9	10.9	10.8	10.6	10.5	10.6	10.5
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.73	2.52	3.57	3.23	2.52	2.82	2.81	2.56	2.71	2.72
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調查項目 Items	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491
一、形態的特性													
①株高 ②第一期		118.4	121.0	122.6	119.6	121.2	110.4	120.2	136.6	121.2		116.6	117.6
①株高 ③第二期	97.2	106.8	112.0	104.0	99.8	106.0	91.2	102.4	127.8	102.8	101.0	89.6	105.4
④有效分蘖 ②第一期		8.6	11.4	12.8	17.0	14.0	11.0	14.2	8.8	11.8		13.8	10.6
④有效分蘖 ③第二期	13.0	8.0	11.0	13.7	15.4	13.8	11.8	13.6	8.8	9.8	12.7	10.4	9.8
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	P	P	P	Gn	Gn	P
⑦穗重（g）	2.02	2.96	2.70	3.06	2.82	2.18	2.78	2.68	2.72	2.20	2.82	2.48	2.24
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R S	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	B P	B P	B P	B P	B P	W	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	R P	R P	R P	R P	L Gn	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	○
⑬稃色	Y S	B F	Y S	W S	B F	W S	Y S	Y S	Y S	W S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	R_2	R_1	0	0	0	M_2	0	0	M_1	R_1	R_1	R_1	R_1
⑮葉稻熱病	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
⑯穗頸稻熱病	70	100	100	90	70	100	100	100	100	100	100	100	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	18.0	26.2	14.4	17.9	11.2	25.4	25.7	33.8	22.4	32.8	31.7	32.4	13.5
⑰紋枯病 ⑲被害度%	9.4	6.4	11.3	12.6	6.9	7.8	4.6	21.2	19.8	25.5	10.0	24.2	7.5
⑳倒伏性	|	—	—	—	—	—	—	—	—	—	/	—	—
㉑耐旱性	d	d	d	d	⧺	—	⧺	⧺	+	+	+	d	d
㉒耐肥性	△	△	△	B	A	B	△	△	D	D	A	△	C
㉓脫粒性	5.1	19.6	8.1	13.1	25.5	20.2	11.5	13.4	34.0	24.8	7.7	7.3	13.4
㉔出穗期 ②第一期		6.4	6.9	6.10	6.16	6.6	6.7	6.9	6.9	6.8		6.10	6.5
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.15	10.3	10.9	10.13	10.19	10.1	10.8	10.14	10.11	10.10	10.6	10.14	10.2
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.83	2.41	3.21	2.84	2.47	2.27	2.64	2.37	2.55	2.48	2.58	2.61	2.84
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調査項目 Items \ 品種代號 Variety Number	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	100.8	104.8	100.6	109.6	115.8	120.6	112.6	116.6	123.5	102.2
①株高 ③第二期	79.4	95.4	90.6	91.0	95.4	108.4	103.0	113.4	112.0	89.4
④有效分蘗 ②第一期	10.4	10.6	14.2	12.4	10.6	11.0	12.4	13.0	13.2	11.6
④有效分蘗 ③第二期	9.8	10.2	14.6	10.8	9.8	9.0	10.2	13.0	12.2	10.8
⑤葉色	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	P	P	P	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.18	2.88	1.86	3.02	3.18	2.86	3.38	3.50	3.46	2.16
⑧芒	R S	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	B P	B P	B P	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	R P	R P	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	×	○	○	○	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	L Gd	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_3	S_1	S_3	S_3	S_2	0	0	0	0	M_1
⑮葉稻熱病		5					5	5	5	5
⑯穗頸稻熱病		100					100	100	100	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	16.9	55.2	34.3	26.7	13.4	24.2	22.5	22.1	15.6	24.5
⑰紋枯病 ⑲被害度%	14.5	23.0	11.2	12.7	12.5	3.0	14.9	19.6	6.7	5.6
⑳倒伏性	|	|	—	—	—	—	—	—	—	／
㉑耐旱性	—	+	+	+	±	±	±	+	d	—
㉒耐肥性	C	C	C	C	C	B	D	D	D	C
㉓脫粒性	6.9	5.6	7.5	13.4	18.9	10.5	20.1	16.6	15.6	24.1
㉔出穗期 ②第一期	6.7	5.30	5.26	6.3	6.5	6.13	6.4	6.10	6.10	6.3
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.10	9.23	9.30	9.23	10.2	10.10	10.4	10.6	10.6	10.4
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.02	2.51	2.76	2.58	2.71	2.75	2.63	2.37	2.34	2.90
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調査項目 Items \ 品種代號 Variety Number	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	98.8		116.4	113.2	127.2	121.6	118.2	121.9	122.0	120.8		115.6	119.0
①株高 ③第二期	90.6	97.2	107.6	97.8	109.6	102.4	104.6	105.6	99.0	99.0	88.8	97.4	104.0
④有效分蘗 ②第一期	13.6		13.4	10.6	9.4	11.6	12.0	12.8	11.8	12.0		12.6	12.8
④有效分蘗 ③第二期	12.6	15.2	13.8	10.2	8.6	11.0	11.2	10.2	11.2	10.4	16.5	11.8	11.0
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	P	P	P	P	P	Gn	P	Gn	Gn	P	Gn
⑦穗重(g)	1.82	2.12	3.03	2.52	2.82	2.88	2.50	2.84	3.01	3.64	2.26	2.20	3.38
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	P L	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	B P	B P	B P	B P	B P	B P	W	B P	W	W	B P	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	R P	R P	R P	R P	R P	R P	L Gn	R P	L Gn	L Gn	R P	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	○	×
⑬稃色	L Gd	L Gd	Y S	Y S	Y S	W S	B F	L Gd	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	0	0	0	0	0	0	0	0	$S.M_1$	S_1	0	S_2	S_2
⑮葉稻熱病	4	5	5	5	5	5	4	5			5		
⑯穗頸稻熱病	100		100	100	70	100	100	100			100		
⑰紋枯病 ⑱被害率%	27.5	25.1	37.5	32.2	20.8	26.7	18.6	19.3	27.3	25.3	26.9	33.4	34.6
⑰紋枯病 ⑲被害度%	4.6	16.5	33.6	3.5	2.4	5.4	5.2	4.3	11.6	2.3	11.0	2.2	20.1
⑳倒伏性	|	|	|	—	—	—	—	—	—	—	／	—	—
㉑耐旱性	+	+	+	+	+	±	+	±	+	+	+	±	++
㉒耐肥性	C	B	C	D	△	E	△	C	D	E	C	C	△
㉓脫粒性	7.0	5.6	12.3	15.9	7.1	15.3	22.4	12.7	18.4	15.9	2.8	17.8	17.2
㉔出穗期 ②第一期	6.4		6.5	6.8	6.13	6.10	6.8	6.9	6.6	6.8		6.5	6.13
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.1	10.10	9.29	10.10	10.7	10.5	10.8	10.14	10.1	10.3	10.5	9.27	10.11
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.71	2.93	3.43	2.72	2.96	3.10	2.26	2.70	2.66	2.77	3.11	2.83	2.58
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調査項目 Items \ 品種代號 Variety Number	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	105.6	119.8	83.2		124.8	127.5	103.0	124.2	131.0	105.8
①株高 ③第二期	92.4	101.6	71.6	94.2	105.6	107.6	95.8	102.8	116.0	85.0
④有效分蘖 ②第一期	13.6	12.0	12.0		12.0	12.4	14.2	11.6	11.0	12.0
④有效分蘖 ③第二期	12.2	13.6	9.8	15.4	12.5	9.8	11.8	12.6	11.2	11.2
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	P	P	P
⑦穗重(g)	2.12	3.66	2.24	2.04	3.44	3.80	2.96	2.90	3.60	2.84
⑧芒	—	—	—	—	—	PM	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	B P	W	B P	B P	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	R P	R P	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	B F	W S	Y S	B F	B F	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_1	R_1	0	S_3	S_2	R_1	S_1	S_1	0	0
⑮葉稻熱病	5	4	5			5			5	5
⑯穗頸稻熱病	100	100	100			100			100	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	27.6	8.8	25.2	26.6	29.6	28.1	21.7	19.5	23.5	24.3
⑰紋枯病 ⑲被害度%	7.5	7.4	23.6	23.6	17.0	3.6	3.4	14.0	0.9	1.4
⑳倒伏性	—	—	|	|	—	—	／	—	—	／
㉑耐旱性	±	d	+	—	+	±	±	⧺	±	±
㉒耐肥性	D	D	D	A	C	C	C	△	D	C
㉓脫粒性	24.5	9.3	11.6	8.5	10.5	3.2	6.1	14.5	11.1	6.3
㉔出穗期 ②第一期	6.7	6.8	5.22		6.11	6.10	5.27	6.12	6.11	6.12
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.6	10.8	9.25	10.3	10.9	10.12	9.25	10.14	10.9	10.13
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.29	2.70	2.45	2.36	2.78	2.80	2.40	2.63	2.80	2.78
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調査項目 Items \ 品種代號 Variety Number	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	115.8	118.4	128.4	125.2	89.6	125.4	122.0	115.6	118.2	129.8	104.0	98.8	103.4
①株高 ③第二期	98.8	95.0	109.6	105.2	78.6	105.8	105.8	103.2	100.4	110.0	95.6	91.8	96.8
④有效分蘖 ②第一期	14.8	12.8	12.8	11.0	15.6	11.4	14.4	12.1	13.0	12.4	14.4	13.0	12.6
④有效分蘖 ③第二期	12.4	10.6	11.0	10.2	14.6	12.0	12.8	9.4	11.6	11.2	12.6	11.4	11.0
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	P	P	Gn	Gn	P	P	Gn	P	P	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.60	2.82	2.12	4.10	1.66	2.84	2.50	3.34	2.50	2.78	2.36	2.74	2.46
⑧芒	—	PM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	B P	B P	W	W	B P	B P	W	B P	B P	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	R P	R P	L Gn	L Gn	R P	R P	L Gn	R P	R P	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	○	×	×	○	○	×	○	○	×	×	×
⑬稃色	Y S	W S	Y S	Y S	W S	W S	B F	Y S	W S	Y S	L Gd	W S	W S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	0	R_1	0	0	0	0	0	0	M_1	R_1	R_1	0	R_1
⑮葉稻熱病	4	5	5	5	5	5	4	5	5		5	5	5
⑯穗頸稻熱病	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	30.9	26.0	9.8	22.4	19.0	11.6	17.7	17.7	19.1	1.3	29.6	24.6	31.9
⑰紋枯病 ⑲被害度%	6.6	21.4	3.9	1.7	9.1	5.1	2.1	9.7	15.9	0.5	4.3	22.2	17.6
⑳倒伏性	—	—	—	—	／	—	—	—	—	—	|	|	／
㉑耐旱性	⧺	d	+	d	d	⧺	⧺	+	+	+	d	±	d
㉒耐肥性	△	C	C	C	C	D	B	C	C	△	△	C	D
㉓脫粒性	11.5	12.8	2.8	9.6	12.0	14.1	12.0	14.4	8.0	15.8	15.1	13.9	4.9
㉔出穗期 ②第一期	6.9	6.10	6.10	6.16	5.30	6.8	6.8	6.9	6.5	6.9	5.28	6.3	5.28
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.5	10.9	10.9	10.15	9.25	10.12	10.5	10.9	9.30	10.12	9.27	9.23	9.27
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.65	2.34	2.68	2.51	2.68	2.77	2.82	2.68	2.80	2.68	2.75	2.69	2.49
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1545	1546	1547	1548
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	95.4	125.4	108.4	108.0	125.6	117.6	130.0	132.4	145.4	111.0
①株高 ③第二期	89.2	108.8	90.8	92.0	102.4	99.0	117.2	113.8	119.8	107.7
④有效分蘗 ②第一期	12.2	12.8	13.2	12.0	12.6	12.2	13.6	11.6	13.2	10.4
④有效分蘗 ③第二期	11.4	10.6	12.4	11.2	10.8	11.6	10.9	9.2	13.4	10.7
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	D P	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.11	4.32	2.38	3.20	4.22	3.98	2.70	2.54	2.47	2.92
⑧芒	—	—	—	F L	—	—	—	—	—	P M
⑨柱頭色	W	B P	W	W	W	B P	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	P	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	○	○	×	○	×	×	○	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	W S	Y S	Y S	Y S	W S	B F	W S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	0	0	0	R_1	0	0	0	0	0	S_3
⑮葉稻熱病	5	5	5	4	5		5	5		
⑯穗頸稻熱病	100	100	100	100	100		100	100		
⑰紋枯病 ⑱被害率%	39.4	24.6	21.7	23.0	20.8	25.9	17.1	21.4	23.0	21.3
⑰紋枯病 ⑲被害度%	7.9	12.1	12.8	20.2	8.6	6.4	4.8	2.5	5.2	10.7
⑳倒伏性	／	—	—	／	—	—	—	—	／	|
㉑耐旱性	d	＋	＃	—	d	＋	d	d	—	d
㉒耐肥性	C	△	B	B	△	C	D	C	C	C
㉓脫粒性	18.1	10.2	21.8	18.8	9.5	13.1	7.4	3.1	8.1	8.2
㉔出穗期 ②第一期	6.2	6.9	6.8	6.2	6.10	6.8	6.16	6.2	6.20	6.9
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.3	10.2	9.28	9.29	10.6	10.1	10.19	10.19	10.20	10.11
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.69	2.72	2.83	2.18	2.85	2.71	2.36	2.39	2.31	2.05
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1616
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	120.6	124.0	129.6	124.0	110.0	105.8	106.0	126.6	113.8	126.2	128.0	118.2	85.4
①株高 ③第二期	104.8	101.6	114.1	106.8	102.8	99.6	94.8	106.2	90.4	113.8	114.2	101.2	80.6
④有效分蘗 ②第一期	13.0	12.0	12.6	13.8	12.2	13.6	15.4	11.2	13.0	13.0	12.4	12.2	11.4
④有效分蘗 ③第二期	10.6	9.4	11.1	9.4	11.0	11.6	15.2	8.8	11.6	11.8	12.4	12.8	12.4
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	P	P	Gn
⑦穗重(g)	2.68	2.18	3.22	2.96	3.10	2.82	1.52	3.28	3.26	3.80	2.52	3.66	2.04
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	P L	R S	—	R S	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	B P	W	W	W	W	B P	W	B P	B P	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	R P	R P	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	W S	W S	W S	Y S	Y S	Y S	Y S	B F	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	0	0	0	M_1	M_1	R_1	0	S_1	M_1	0	0	S_1	0
⑮葉稻熱病	5	5	5	5	5	5	4		5		5		5
⑯穗頸稻熱病	100	100	100	100	100	100	90		100		90		100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	30.5	19.0	18.7	24.6	21.1	32.8	25.6	24.6	22.9	33.4	27.4	32.3	43.2
⑰紋枯病 ⑲被害度%	10.6	5.9	15.0	2.9	3.9	6.7	23.8	14.6	6.7	26.2	5.7	6.8	30.3
⑳倒伏性	—	—	—	—	—	—	|	／	—	—	—	—	／
㉑耐旱性	＋	d	＋	d	±	＋	＋	＋	d	＋	＋	＋	d
㉒耐肥性	△	D	△	D	△	D	C	D	△	B	△	D	D
㉓脫粒性	26.1	27.5	13.7	28.4	22.6	5.0	11.8	13.4	8.8	14.7	7.1	15.8	18.6
㉔出穗期 ②第一期	6.9	6.9	6.15	6.6	6.2	5.29	6.3	6.8	6.8	6.11	6.13	6.10	5.20
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.5	10.6	10.13	9.30	9.30	9.25	9.29	10.11	10.11	10.15	10.15	10.14	9.19
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.51	2.53	2.43	2.73	3.25	2.91	2.44	2.54	2.69	2.58	2.58	2.69	2.86
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調査項目 Items \ 品種代號 Variety Number	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	92.6	107.2	115.2	123.2	116.4	130.0	111.0	114.2	109.0	112.4
①株高 ③第二期	84.0	90.6	93.6	107.8	99.4	119.4	89.2	92.2	98.6	92.2
④有效分蘖 ②第一期	13.8	13.0	11.0	12.8	12.6	14.6	13.0	12.8	13.8	13.8
④有效分蘖 ③第二期	13.0	12.2	10.0	12.4	10.6	13.6	12.8	10.6	11.8	11.4
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P
⑦穗重(g)	2.74	2.94	2.00	4.04	2.94	4.20	2.18	3.00	2.32	3.00
⑧芒	—	P L	—	—	F l	R S	—	R S	—	—
⑨柱頭色	B P	W	B P	W	W	B P	W	W	W	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	R P	L Gn	R P	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	○	○	○	×	×	×	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	D P	Y S	L G d	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_1	M_1	0	0	0	0	S_1	R_1	M_1	R_2
⑮葉稻熱病	5		5	3	5	5		5	5	5
⑯穗・頸稻熱病	100		100	100	100	100		100	100	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	23.8	30.8	16.1	20.9	10.5	10.5	17.8	34.3	18.6	27.3
⑰紋枯病 ⑲被害度%	2.0	12.1	1.8	9.8	2.8	0.6	5.1	8.6	9.3	17.7
⑳倒伏性	／	／	—	／	—	—	／	／	／	／
㉑耐旱性	−	±	++	d	+	++	d	++	+	d
㉒耐肥性	D	D	B	D	D	D	△	D	△	B
㉓脫粒性	21.9	15.6	9.0	5.9	9.5	13.8	23.8	18.7	6.0	6.7
㉔出穗期 ②第一期	5.24	6.12	6.12	6.14	6.5	6.13	6.9	6.10	6.5	6.15
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	9.23	10.14	10.12	10.1	9.23	10.17	10.14	10.5	10.6	10.16
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.86	2.57	2.98	2.92	2.53	2.61	2.59	2.71	2.78	2.54
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調査項目 Items \ 品種代號 Variety Number	1627	1629	1630	1631	1632	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	120.8	121.2	115.8	119.2	110.6	93.6	119.8	123.6	127.0	120.2	118.6	130.8	89.4
①株高 ③第二期	102.4	99.4	106.2	95.2	93.4	77.0	103.8	114.2	109.0	99.2	101.0	115.0	72.6
④有效分蘖 ②第一期	11.2	11.4	12.2	14.2	14.0	14.6	12.0	11.4	12.2	12.2	12.2	10.2	13.2
④有效分蘖 ③第二期	9.0	11.4	10.2	13.0	12.6	14.2	11.2	11.0	12.0	10.0	12.6	10.2	12.6
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	P	Gn
⑦穗重(g)	2.62	3.44	2.91	3.92	2.04	1.90	3.58	3.16	2.42	3.88	2.30	3.44	2.34
⑧芒	P L	—	—	—	—	—	—	R S	—	--	R S	—	R S
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	B P	W	W	W	B P	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×
⑬稃色	W S	Y S	Y S	Y S	Y S	B F	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	R_2	M_1	0	0	S_2M_1	R_1	M_1	R_1	0	S_2	0	0	0
⑮葉稻熱病	5	5	5	5		4	5	5	5		5	5	5
⑯穗・頸稻熱病	100	50	100	100		100	100	100	100		100	100	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	25.4	28.3	25.0	12.2	21.2	17.2	27.1	22.6	8.9	16.4	25.9	18.9	25.0
⑰紋枯病 ⑲被害度%	7.0	19.0	3.7	1.8	3.5	1.4	21.9	4.7	5.3	7.8	11.8	12.1	16.8
⑳倒伏性	|	—	／	／	／	|	—	—	—	—	—	—	|
㉑耐旱性	+	++	±	+	±	+	+	±	+	++	+	++	+
㉒耐肥性	△	C	△	△	△	C		B	△	C	C	△	D
㉓脫粒性	6.1	9.3	13.1	7.1	7.8	6.3	12.8	3.2	28.9	11.3	7.8	7.6	11.1
㉔出穗期 ②第一期	6.15	6.9	6.5	6.11	6.8	6.1	6.8	6.3	6.14	6.8	6.12	6.5	5.29
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.9	10.10	10.1	10.8	10.11	10.3	10.9	10.1	10.15	10.6	10.11	10.1	10.2
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.85	2.82	2.53	2.50	2.69	2.44	2.52	2.49	2.39	2.54	2.65	2.99	2.96
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	1642	1643	1644	1645	1656	1657	1658	1659	1660	1661
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	132.8	111.2	106.4	113.2	122.2	125.6		100.0	106.2	125.0
①株高 ③第二期	117.6	103.8	90.1	101.6	102.4	113.5	111.2	82.4	93.0	115.0
④有效分蘗 ②第一期	10.8	13.6	13.6	13.8	10.4	11.6		13.0	12.0	12.6
④有效分蘗 ③第二期	10.2	11.4	13.3	14.8	12.0	11.8	13.6	12.2	12.6	12.8
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.52	3.68	2.40	2.86	2.12	3.40	2.72	2.38	2.68	3.88
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	F L	—	—
⑨柱頭色	W	B P	W	W	W	W	W	W	B P	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	D P	R P	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×
⑬稃色	Y S	S Y	Y S	Y S	B F	Y S	L G d	B F	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	0	R_1	S_1	S_3	0	R_2	R_1	S_5	R_1	R_1
⑮葉稻熱病	4	5			4	4	5			4
⑯穗頸稻熱病	100	100			100	100	100			100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	30.9	36.1	19.7	13.1	20.5	23.3	26.9	26.4	25.7	26.8
⑰紋枯病 ⑲被害度%	9.2	3.2	2.5	5.2	15.8	8.9	18.9	10.7	16.0	4.3
⑳倒伏性	—	—	／	—	—	—	／	|	—	—
㉑耐旱性	＋	＋	＋	⧺	⧺	±	＋	—	—	⧺
㉒耐肥性	E	D	C	D	D	B	△	A	D	△
㉓脫粒性	∠1	16.3	12.5	5.6	11.3	7.6	9.6	10.2	1.2	13.9
㉔出穗期 ②第一期	6.10	6.4	6.4	6.4	6.5	6.8		6.4	6.4	6.7
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.10	9.30	9.30	9.30	10.6	10.4	10.10	10.2	9.28	10.12
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.95	2.84	2.89	3.20	2.98	2.67	2.73	2.21	2.17	2.31
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	118.6	129.8	120.4	118.8			77.8	109.0	120.6	81.8	120.2	89.8	100.0
①株高 ③第二期	103.0	121.4	116.2	106.6	104.0	91.8	65.5	96.8	111.3	76.5	104.2	78.6	86.6
④有效分蘗 ②第一期	13.2	14.2	13.4	12.8			13.2	14.8	12.8	13.4	8.2	15.2	15.4
④有效分蘗 ③第二期	12.8	15.4	12.0	12.8	12.0	12.6	13.4	14.2	12.6	12.8	9.4	13.0	13.6
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	P	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.12	3.62	3.48	1.98	3.32	2.00	1.98	3.16	3.28	1.90	2.90	1.98	1.90
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	B P	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	B F	B F	L G d	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	R_1	M_1	M_1	0	M_1	0	0	0	R_1	S_5	R_1	M_1	R_1
⑮葉稻熱病	4	4	5	5	5	5	5					5	4
⑯穗頸稻熱病	100	100	100	100	100	100	100				100	100	90
⑰紋枯病 ⑱被害率%	12.1	19.9	26.0	25.9	19.1	22.8	37.7	18.3	14.8	28.1	15.7	19.1	17.1
⑰紋枯病 ⑲被害度%	7.1	10.6	18.5	10.9	5.9	11.1	3.0	1.0	0.3	2.1	7.1	5.7	15.5
⑳倒伏性	—	／	／	／	／	／	|	／	／	|	／	—	—
㉑耐旱性	＋	⧺	d	＋	d	d	⧺	d	d	—	±	⧺	d
㉒耐肥性	△	△	△	C	△	C	D	D	C	D	B	C	C
㉓脫粒性	16.7	7.7	7.5	12.1	10.2	5.0	14.2	23.4	11.6	16.8	14.5	6.1	16.8
㉔出穗期 ②第一期	6.9	6.16	6.12	6.5			5.22	6.9	6.11	5.21	6.4	5.27	5.23
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.11	10.19	10.14	9.30	10.10	10.9	9.21	10.12	10.15	9.20	10.1	9.28	9.25
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.98	2.72	2.42	2.82	2.93	2.62	2.86	3.14	2.88	2.62	2.34	2.73	2.93
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items		1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684
一、形態的特性											
①株高	②第一期	119.8	123.0	118.0	120.6		138.6		130.0		
	③第二期	100.4	105.2	100.2	116.6	94.0	119.3	127.2	113.0	105.0	98.4
④有效分蘗	②第一期	20.4	12.6	13.4	13.2		14.0		14.6		
	③第二期	13.4	10.8	11.2	12.0	14.2	13.4	14.4	12.4	20.8	16.2
⑤葉色		L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	P	P	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)		1.48	2.82	3.06	3.60	2.16	4.28	3.44	3.10	2.22	2.10
⑧芒		—	—	PM	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色		W	W	B P	B P	W	W	W	W	B P	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	R P	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	D P	L Gn
	⑫已熟	×	×	○	○	×	×	○	×	○	×
⑬稃色		Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		0	0	M_1	R_1	S_1	0	M_1	0	0	R_1
⑮葉稻熱病		3		4	5		5	4	5	5	5
⑯穗頸稻熱病		100		100	100		100	100	100	100	100
⑰紋枯病	⑱被害率%	25.1	9.3	12.6	30.5	18.0	19.2	15.7	27.0	27.6	9.4
	⑲被害度%	8.7	8.7	11.6	22.3	17.7	6.0	4.9	15.8	26.2	3.3
⑳倒伏性		—	—	—	—	／	—	／	—	|	|
㉑耐旱性		d	d	d	卄	卄	卄	±	+	±	d
㉒耐肥性		△	C	△	D	△	D	D	C	△	A
㉓脫粒性		18.6	24.8	10.5	9.4	13.3	9.8	4.1	9.6	13.5	6.8
㉔出穗期	②第一期	6.6	6.6	6.13	6.12		6.19		6.10		
	㉕中間作										
	③第二期	10.3	10.3	10.9	10.7	10.4	10.13	10.24	10.6	10.22	10.25
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		2.96	3.08	2.78	2.73	2.38	2.41	2.93	3.41	2.39	2.67
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考											

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items		1686	1687	1689	1691	1692	1693	1695	1696	1697	1698	1699	1700	1701
①株高	②第一期			110.8	132.0	119.4	130.2		123.4	107.2	126.8	118.4	110.4	120.4
	③第二期	115.0	119.6	94.4	120.0	108.8	115.0	113.2	103.0	97.8	108.8	109.0	78.6	106.2
④有效分蘗	②第一期			13.6	13.2	13.2	14.2		11.2	13.2	12.2	13.6	12.6	14.0
	③第二期	13.4	13.0	13.6	12.8	12.4	12.0	12.6	11.4	11.2	10.2	13.6	11.9	13.4
⑤葉色		L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	P	P	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)		2.10	2.50	2.51	3.78	3.12	4.68	3.46	2.84	2.80	2.64	3.42	2.64	2.90
⑧芒		—	F M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	F L	—
⑨柱頭色		W	W	W	W	W	W	W	B P	B P	B P	W	W	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	R P	R P	L Gn	L Gn	L Gn
	⑫已熟	×	×	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×
⑬稃色		Y S	Y S	G	Y S	R P	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
⑭幼苗稻熱病		0	0	0	R_1	R_1		0	R_1	S_2	0	0	0	0
⑮葉稻熱病		3	3	5				5		5		5	5	5
⑯穗頸稻熱病				100				100		100		100	100	100
⑰紋枯病	⑱被害率%	18.4	20.9	24.3	24.0	17.0	14.9	19.0	24.5	29.3	16.1	24.4	23.2	31.3
	⑲被害度%	12.2	5.3	2.0	18.6	8.8	4.3	2.7	19.3	8.1	4.9	23.4	15.3	28.5
⑳倒伏性		／	／	|	—	／	／	|	—	—	—	—	|	—
㉑耐旱性		—	±	+	卄	—	d	d	d	d	d	卄	—	d
㉒耐肥性		D	B		△		C	△	△	D	△	△	A	D
㉓脫粒性		15.4	23.1	11.8	6.9	7.1	11.1	7.5	16.2	17.8	7.7	28.0	8.3	3.6
㉔出穗期	②第一期			6.13	6.18	6.22	6.25		6.10	6.8	6.15	6.7	6.13	6.21
	㉕中間作													
	③第二期	10.25	10.18	10.15	10.25	10.25	10.25	10.17	10.7	10.13	10.9	10.7	10.2	10.12
㉖穀粒形狀		2.57	4.58	2.55	2.38	2.40	2.32	2.78	2.89	2.55	2.53	2.56	1.94	2.51
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考														

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	113.4	104.8	97.0	128.2	107.0			91.8		
①株高 ③第二期	97.4	101.7	87.8	107.8	103.2	99.8	85.2	86.3	103.6	108.2
④有效分蘖 ②第一期	11.0	14.2	14.0	13.0	11.6			14.0		
④有效分蘖 ③第二期	11.2	12.3	13.8	12.2	10.0	13.6	14.4	13.3	15.2	11.8
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.54	2.60	2.54	2.20	3.48	2.78	2.50	2.06	2.84	1.80
⑧芒	—	R M	R S	F M	—	—	—	R S	R S	R S
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	B P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	W S	B F	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	M_2	0	0	R_2	S_3	S_1R_1	S_2	R_1	0	S_1
⑮葉稻熱病	5	2	3	3					5	
⑯穗頸稻熱病	100	90	75	20					100	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	19.9	19.6	18.0	21.4	23.4	30.8	29.6	23.7	15.3	21.8
⑰紋枯病 ⑲被害度%	7.5	3.7	9.9	14.2	12.4	14.8	1.2	1.4	12.1	19.9
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	\	/	|
㉑耐旱性	—	d	+	++	—	d	d	±	+	d
㉒耐肥性	△	△	D	A	△	A	C	D	△	D
㉓脫粒性	17.5	20.0	23.4	7.2	4.0	8.7	6.3	17.6	9.2	26.1
㉔出穗期 ②第一期	6.12	6.11	6.8	6.8	6.16			6.9		
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.5	10.7	10.3	10.8	10.12	10.8	10.10	10.13	10.9	10.27
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	3.63	2.07	2.62	2.68	4.10	4.04	4.19	2.68	2.82	2.70
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number	1713	1801	1802	1803	1805	1806	1807	1808	1809	1810	1813	1814	1815
一、形態的特性													
①株高 ②第一期		143.0	135.4	131.2	112.4	116.8		100.2	111.0	114.0	117.4	126.8	131.6
①株高 ③第二期	109.0	130.2	115.2	113.6	83.6	112.6	100.4	82.4	96.2	101.0	101.6	97.0	102.8
④有效分蘖 ②第一期		9.2	11.2	11.0	10.8	13.0		13.0	14.0	12.4	11.2	14.8	11.4
④有效分蘖 ③第二期	14.0	9.5	9.8	9.6	10.8	14.2	13.8	10.2	11.2	9.4	8.4	11.6	11.2
⑤葉色	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.72	3.18	3.48	3.88	1.88	2.76	2.66	2.12	2.70	2.22	2.60	2.08	2.40
⑧芒	—	R S	—	—	R S	F L	—	—	—	—	—	R S	—
⑨柱頭色	W	B P	W	W	R P	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	R P	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	B P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	×
⑬稃色	B F	Y S	L·Gd	B F	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	M_1	R_1	S_1	R_2	R_1	S_8	S_1	S_7	$S_{8\cdot5}$	S_1R_1	M_3	S_6	R_3M_1
⑮葉稻熱病	5	4		4							3		4
⑯穗頸稻熱病	100	20		100							100		100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	12.2	48.7	32.6	27.6	35.8	35.3	46.7	36.9	27.0	21.7	37.1	27.0	16.5
⑰紋枯病 ⑲被害度%	10.5	8.2	13.6	10.0	9.5	17.1	25.5	12.8	12.4	6.8	8.3	8.0	6.3
⑳倒伏性	/	|	/	|	—	/	|	|	|	/	—	/	|
㉑耐旱性	++	d	+	d	++	—	+	+	—	—	d	d	d
㉒耐肥性	A	B	△	D	△	D	C	C	B	△	C	△	D
㉓脫粒性	7.4	4.4	8.6	4.6	24.4	8.7	6.8	22.6	11.8	8.1	13.1	10.7	2.4
㉔出穗期 ②第一期		6.18	6.15	6.12	6.6	6.12		6.12	6.14	6.3	6.12	6.9	6.16
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.11	9.30	9.28	9.30	10.3	10.8	10.3	10.9	10.1	10.8	10.16	10.11	10.11
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.77	2.62	2.58	2.36	2.69	2.02	2.74	2.06	2.30	2.75	2.16	2.62	2.62
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調査項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	1816	1817	1818	1819	1820	1821	1822	1823	1824	1825
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	132.4	137.4	115.2	150.0	121.6	107.0	123.6	117.6	128.0	136.2
①株高 ③第二期	109.4	109.8	109.2	130.0	100.0	94.0	112.6	102.6	114.4	117.8
④有效分蘗 ②第一期	11.0	8.4	11.0	10.2	13.4	11.6	10.0	12.2	11.4	11.6
④有效分蘗 ③第二期	11.4	9.8	12.4	8.8	12·4	11.0	9.6	11.4	12.0	10.8
⑤葉色	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn
⑥莖基色	P	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn
⑦穗重(g)	4.06	3.36	3.10	2.00	2.28	3.66	4.08	4.18	3.74	3.74
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	B P	B P	R P	W	B P	W	W	W	B P	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	R P	R P	B P	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	○	×	○	×	×	×	○	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	L G d	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_2M_1	R_1	R_1	R_1	R_1	S_1	0	S_4M_2	0	0
⑮葉稻熱病	4	4	3	3	4		4		4	
⑯穗頸稻熱病	100	100	80	80	100		80		100	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	12.8	6.9	38.1	32.7	31.9	29.4	33.6	9.9	18.7	34.9
⑰紋枯病 ⑲被害度%	0.4	2.6	11.3	31.4	11.2	16.7	1.5	8.3	2.7	28.3
⑳倒伏性	／	／	／	／	|	—	|	|	—	|
㉑耐旱性	⧺	d	⧺	⧺	d	d	d	—	d	+
㉒耐肥性	△	D	C	△	D	△	C	D	C	△
㉓脫粒性	8.4	8.4	10.0	9.2	5.9	16.3	11.4	7.2	6.9	6.9
㉔出穗期 ②第一期	6.12	6.18	6.12	6.18	6.19	6.10	6.15	6.15	6.5	6.10
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.15	10.20	10.14	10.18	10.15	10.15	10.19	10.14	10.5	10.15
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.52	2.72	2.51	2.60	2.60	2.29	2.57	2.54	2.78	2 78
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調査項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	1826	1827	1828	1830	1831	1832	1835	1836	1837	1839	1840	1841	1843
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	134.6	133.6	108.4	107.4	110.0	115.2	129.4	126.8	132.2	127.8	122.4	118.2	117.0
①株高 ③第二期	111.8	118.8	83.2	102.2	92.4	88.0	105.0	111.8	102.6	99.4	108.8	99.6	96.4
④有效分蘗 ②第一期	8.8	12.8	14.4	14.2	13.6	13.6	7.4	6.6	13.0	12.4	13.0	15.5	9.0
④有效分蘗 ③第二期	8.0	11.5	15.8	15.2	14.0	14.4	7.2	6.1	10.0	14.6	12.0	15.0	12.4
⑤葉色	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	P
⑦穗重(g)	2.32	3.76	3.16	2.36	2.58	2.68	2.90	2.34	3.94	2.96	2.28	2.76	2.58
⑧芒	—	—	PM	—	—	—	—	—	R S	—	—	F L	R S
⑨柱頭色	W	B P	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	B P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	L G d	Y S	L G d	B F	B F	L G d	Y S	W S	D P	B F
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	R_1S_2		S_4	R_2	RS_5	RS_5	S_7M_5	R_3	S_6	R_1	R_2S_4	0	R_1M_1
⑮葉稻熱病	4							5		5		5	
⑯穗頸稻熱病	100							80		100		100	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	16.7	15.3	33.9	24.3	28.4	18.3	27.7	46.1	33.4	29.7	35.6	29.6	22.6
⑰紋枯病 ⑲被害度%	0.9	4.5	16.5	9.3	9.9	6.7	17.7	14.5	3.8	22.9	11.8	16.6	5.0
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	／	／	|	／	／
㉑耐旱性	+	±	±	d	d	±	—	±	+	d	⧺	⧺	⧺
㉒耐肥性	D	B	△	△	△	△	△	C	△	△	D	C	△
㉓脫粒性	12.9	15.0	12.6	5.9	4.6	6.7	3.4	1.7	11.1	17.5	11.3	14.5	11.6
㉔出穗期 ②第一期	6.16	6.14	6.7	6.10	6.8	6.10	6.17	6.12	6.11	6.10	6.9	6.7	6.7
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.18	10.18	10.11	10.13	10.8	10.11	10.12	10.14	10.9	10.10	10.11	10.3	10.7
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.18	2.58	2.09	3.42	2.77	2.71	2.66	2.74	2.55	2.80	2.93	2.51	3.60
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number		1844	1845	1846	1849	1850	1851	1854	1855	1856	1857
一、形態的特性											
①株高	②第一期	113.6	123.8	131.0	140.4	126.4	128.2	128.0	134.2	122.2	105.6
	③第二期	93.2	109.6	114.0	117.8	107.0	106.8	114.0	91.8	103.4	89.2
④有效分蘖	②第一期	12.8	12.0	12.2	12.0	11.2	11.0	12.0	11.8	15.6	14.4
	③第二期	12.4	11.6	9.6	13.0	9.0	12.4	14.0	13.4	12.8	11.4
⑤葉色		L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	D Gn	Gn	Gn	D Gn	D Gn	Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	P	P	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）		2.22	2.08	3.40	3.24	3.64	4.30	2.28	2.46	2.40	2.80
⑧芒		—	R S	—	—	—	—	—	P L	—	F L
⑨柱頭色		W	W	B P	B P	B P	W	W	W	W	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	R P	R P	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
	⑫已熟	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×
⑬稃色		Y S	Y S	W S	W S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		$S_{8.5}$	R_1M_1	R_2	R_1	M_1S_1	R_2	R_2	R_1	S_7	S_7
⑮葉稻熱病					4		4	3	3		
⑯穗頸稻熱病					90		100	10	20		
⑰紋枯病	⑱被害率%	45.2	47.8	25.0	18.1	44.8	27.2	39.6	47.6	29.9	43.2
	⑲被害度%	9.8	9.3	11.8	13.2	15.8	17.2	4.6	14.5	11.1	32.5
⑳倒伏性		／	—	／	／	／	—	|	|	／	／
㉑耐旱性		d	d	⧺	d	+	+	d	+	—	—
㉒耐肥性		△	D		△	△	C	D	A	D	△
㉓脫粒性		23.4	19.2	10.6	11.3	9.9	15.0	12.3	5.7	15.1	15.3
㉔出穗期	②第一期	6.6	6.16	6.20	6.14	6.20	6.12	6.20	6.25	6.13	6.7
	㉕中間作										
	③第二期	10.11	10.9	10.14	10.8	10.12	10.5	10.11	10.13	10.6	10.2
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		2.78	2.65	2.36	2.41	2.37	2.30	4.54	2.83	2.23	2.25
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考											

調查項目 Items		1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871
一、形態的特性														
①株高	②第一期	135.2	121.0	137.6	118.0	117.6	116.4	102.8	118.4	128.0	109.0			
	③第二期		97.8	117.2	105.6	101.1	94.0	95.2	101.6	108.0	101.7	103.0	97.2	96.2
④有效分蘖	②第一期	8.4	9.7	10.6	15.4	10.6	11.8	13.8	12.0	10.2	9.4			
	③第二期		10.2	8.5	9.6	12.5	11.6	10.5	9.4	10.8	8.5	16.8	12.0	12.8
⑤葉色		Gn	D Gn	D Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn	Gn	Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）		3.72	2.78	4.12	2.70	1.70	2.22	2.46	4.28	3.36	2.34	2.46	2.50	2.60
⑧芒		R S	—	—	—	R S	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色		W	W	W	W	R P	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
	⑫已熟	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色		R B	Y S	B F	Y S	W S	Y S	L Gd	Y S	Y S	Y S	L Gd	L Gd	B F
二、生理的特性														
⑭幼苗稻熱病			0	R_1	R_1	R_4M_2	S_1	0	R_1	M_2	S_7	0	0	0
⑮葉稻熱病									4	4		5	5	3
⑯穗頸稻熱病									100	100		100	100	20
⑰紋枯病	⑱被害率%		36.1	30.2	39.7	42.8	47.5	44.4	21.4	20.5	27.5	17.8	36.8	57.2
	⑲被害度%		18.6	4.7	8.9	7.5	18.2	16.7	9.6	2.3	4.0	6.1	11.1	25.3
⑳倒伏性		—	／	|	／	／	／	／	／	—	／	—	／	／
㉑耐旱性			+	⧺	+	d	+	d	⧺	+	⧺	+	⧺	+
㉒耐肥性		△	△	D	C	D	△	D	D	C	C	△	△	C
㉓脫粒性		10.7	12.9	14.1	25.1	5.9	9.0	7.3	19.9	9.9	7.7	2.4	6.4	8.5
㉔出穗期	②第一期	6.19	6.13	6.18	6.19	6.12	6.10	6.7	6.15	6.12	5.30			
	㉕中間作													
	③第二期	10.11	10.9	10.12	10.11	10.8	10.12	10.1	10.8	10.3	10.6	10.7	10.7	10.9
三、穀粒的特性														
㉖穀粒形狀		2.46	2.29	2.44	2.66	2.88	2.95	2.93	2.62	2.57	2.91	2.94	2.57	2.64
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考														

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items		1872	1873	1874	1875	1876	1877				
一、形態的特性											
①株高	②第一期										
	③第二期	104.4	94.0	103.2	102.4	90.8	98.8				
④有效分蘖	②第一期										
	③第二期	11.0	8.6	9.0	7.6	16.4	9.8				
⑤葉色		Gn	Gn	Gn	D Gn	D Gn	Gn				
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn				
⑦穗重(g)		2.34	3.12	3.70	3.08	2.10	3.18				
⑧芒		—	—	—	F L	—	—				
⑨柱頭色		W	W	W	W	W	W				
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	B P	L Gn	L Gn				
	⑫已熟	×	×	×	○	×	×				
⑬稃色		B F	Y S	Y S	W S	W S	Y S				
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		S_1	0	R_4	S_7	R_1	M_4				
⑮葉稻熱病			5	5		5					
⑯穗頸稻熱病			100	100		100					
⑰紋枯病	⑱被害率%	32.9	47.5	33.9	39.9	28.9	44.5				
	⑲被害度%	13.3	7.5	4.9	26.6	11.3	7.8				
⑳倒伏性		／	—	／	—	—	—				
㉑耐旱性		⧺	⧺	+	d	d	⧺				
㉒耐肥性		D	△	△	△		△				
㉓脫粒性		3.4	10.2	11.4	7.8	5.7	10.7				
㉔出穗期	②第一期										
	㉕中間作										
	③第二期	10.8	10.9	10.12	10.15	10.11	10.11				
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		2.57	2.37	2.72	2.28	2.26	2.49				
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl				
㉘備考											

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items		2001	2003	2004	2005	2007	2008	2010	2011	2012	2013
一、形態的特性											
①株高	②第一期	125.6	86.6	109.2	126.1	123.2	126.4	135.8	114.8	119.9	134.6
	③第二期	112.8	73.2	94.2	104.6	111.6	113.4	128.2	104.3	109.4	120.1
④有效分蘖	②第一期	11.0	11.8	11.4	11.2	9.4	12.0	11.8	12.2	10.0	13.2
	③第二期	9.2	11.6	10.2	10.2	8.4	9.8	10.4	11.2	8.9	12.1
⑤葉色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)		3.80	3.78	2.32	4.30	3.16	3.30	3.96	2.62	2.50	3.62
⑧芒		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
	⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色		Y S	G	Y S	Y S	B F	L G d	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		0	M_1	R_1	0	S_3	0	0	M_2	0	0
⑮葉稻熱病		4	5	5	5	5	5	5	5		5
⑯穗頸稻熱病		100	100	100	100	100	100	80	100		100
⑰紋枯病	⑱被害率%	28.2	37.3	35.8	27.8	37.7	42.8	25.5	30.7	34.5	48.0
	⑲被害度%	14.0	30.2	24.4	3.8	13.2	6.9	1.8	6.8	7.2	18.3
⑳倒伏性		|	|	|	|	|	／	／	—	／	—
㉑耐旱性		d	d	d	+	d	d	d	⧺	d	⧺
㉒耐肥性		D	D	D	A	C	D	D	D	D	D
㉓脫粒性		11.6	10.6	12.9	11.3	5.1	22.2	5.6	9.2	12.1	7.7
㉔出穗期	②第一期	6.20	6.14	6.13	7.3	6.15	6.16	6.22	6.12	6.13	6.21
	㉕中間作										
	③第二期	10.16	10.15	10.16	10.20	10.20	10.16	10.22	10.8	10.11	10.11
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		2.25	2.26	2.25	2.17	2.26	2.34	2.35	2.99	2.06	2.18
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考											

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2027	2028
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	120.2	123.0	127.8	122.6	125.9	133.4	126.4	125.8	114.6	118.4
①株高 ③第二期	107.0	118.8	111.8	96.2	102.8	122.2	115.6	118.2	103.2	110.4
④有效分蘗 ②第一期	12.6	11.8	12.8	14.0	14.6	12.0	10.6	11.6	11.6	13.4
④有效分蘗 ③第二期	10.6	9.4	9.8	12.8	10.4	8.0	8.8	11.2	10.6	11.4
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	2.08	2.46	2.26	2.64	3.34	3.58	3.14	2.46	2.32	1.92
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R S
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	G	W S	Y S	Y S	W S	W S	Y S	Y S	W S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	0	0	M_1	M_1	0	R_1	0	R_1	M_2	S_2
⑮葉稻熱病	5	5	5	5	3	3	4	2	4	
⑯穗頸稻熱病	100	100	100	100	0	0	100	100	80	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	44.9	54.0	44.6	47.7	33.5	38.9	43.3	57.3	46.7	44.7
⑰紋枯病 ⑲被害度%	13.1	11.0	12.0	0.4	9.2	7.2	13.8	19.5	32.3	18.6
⑳倒伏性	—	—	／	|	|	|	／	／	／	／
㉑耐旱性	d	d	d	d	⧺	⧺	⧺	⧺	d	+
㉒耐肥性	D	D	C	D	△	D	C	△	△	C
㉓脫粒性	10.6	2.4	7.0	5.0	5.4	5.7	10.3	8.2	15.5	5.2
㉔出穗期 ①第一期	6.18	6.23	6.20	6.19	7.1	6.20	6.16	6.21	6.15	6.13
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.12	10.18	10.15	10.21	10.15	10.23	10.15	10.27	10.16	10.17
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.56	2.86	2.47	2.57	2.76	2.39	2.77	2.36	2.58	2.44
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調査項目 Items	2030	2038	2039	2042	2044	2045	2048	2051	2053	2055	2057	2058	2059
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	120.6	132.6	106.2	141.8	129.4	137.0	115.6	93.4	122.8	124.6	120.6	116.8	115.6
①株高 ③第二期	115.0	132.6	97.4	113.4	114.2	115.8	104.4	91.4	106.2	109.2	103.2	103.2	99.8
④有效分蘗 ②第一期	12.2	10.6	11.0	12.0	12.6	12.8	12.8	9.4	11.2	9.2	10.2	11.0	10.0
④有效分蘗 ③第二期	11.5	9.0	10.0	11.6	10.4	9.8	10.4	8.7	9.2	9.6	9.4	9.4	9.6
⑤葉色	L Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.30	3.98	2.22	2.96	3.00	2.56	2.21	2.58	2.72	3.64	4.0	2.90	2.70
⑧芒	—	—	—	—	R S	—	R S	—	—	—	R S	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	W S	W S	L G d	Y S	W S	Y S	W S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	0	0	0	0	M_1	R_1	R_1	R_1	0	M_1	0	0	R_1
⑮葉稻熱病	3	2	3	4	4	5	5	4	5	3	5	5	
⑯穗頸稻熱病	30	20	40	60	100	100	100	80	100	80	100	100	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	44.1	45.3	54.2	42.1	31.6	29.0	27.9	28.1	41.8	51.5	39.8	38.7	50.3
⑰紋枯病 ⑲被害度%	7.2	5.0	7.2	16.8	5.0	9.7	7.9	2.0	17.8	12.4	14.9	7.1	6.8
⑳倒伏性	／	／	／	／	|	／	—	|	|	|	—	—	／
㉑耐旱性	d	+	d	d	±	d	d	d	d	±	⧺	d	⧺
㉒耐肥性		△	C	C	B	B	C	C	C	D	B	D	C
㉓脫粒性	15.7	6.0	10.8	7.4	9.4	7.8	6.1	11.6	6.6	15.1	10.0	15.9	15.7
㉔出穗期 ①第一期	6.12	6.17	6.13	6.18	6.20	6.9	6.15	6.1	6.19	6.20	6.17	6.13	6.12
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.13	10.20	10.13	10.18	10.19	10.13	10.15	10.5	10.15	10.15	10.14	10.12	10.13
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.16	2.45	2.17	2.35	2.22	2.41	2.58	2.78	2.70	1.93	2.43	2.21	2.19
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	107.8	114.8	128.4	125.4	121.6	119.8	120.0	126.4	132.8	141.8
①株高 ③第二期	97.8	101.8	118.0	105.6	113.0	109.8	107.0	114.8	116.8	119.6
④有效分蘖 ②第一期	13.2	12.2	10.4	10.0	9.8	11.0	9.6	12.4	12.2	9.8
④有效分蘖 ③第二期	11.4	10.8	9.2	8.2	8.6	9.6	8.8	11.6	9.5	8.2
⑤葉色	L Gn	L Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.66	2.18	2.70	2.66	2.84	3.24	2.90	2.31	2.68	3.48
⑧芒	—	—	R S	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	W S	Y S	Y S	Y S	Y S	W S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	M_1	R_1	M_2	0	M_1	0	M_2	R_1	0	0
⑮葉稻熱病	5		4	4	5	5	4	4	3	2
⑯穗頭稻熱病	100		100	100	100	100	100	80	40	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	51.6	54.2	41.3	51.0	49.3	41.5	46.4	42.6	48.9	55.3
⑰紋枯病 ⑲被害度%	9.5	13.2	5.0	10.4	14.7	15.0	17.4	16.9	15.0	7.0
⑳倒伏性	—	—	—	—	—	—	／	—	—	／
㉑耐旱性	d	d	++	++	+	d	+	d	±	+
㉒耐肥性	D	C	△	D	D	D	C	C	C	
㉓脫粒性	15.0	12.8	5.2	16.6	10.5	14.2	6.9	8.3	2.3	7.5
㉔出穗期 ②第一期	6.13	6.13	6.19	6.13	6.13	6.13	6.19	6.20	6.22	6.23
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.13	10.11	10.20	10.12	10.10	10.9	10.15	10.21	10.21	10.21
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.27	2.30	2.29	2.32	1.93	2.12	1.95	2.91	3.90	2.41
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number	2071	2072	2074	2075	2077	2085	2087	2090	2093	2095	2102	2106	2109
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	90.8	128.6	127.4	135.2	122.2	132.4	127.6	139.6	135.0	126.2	118.0	120.0	120.2
①株高 ③第二期	82.2	102.4	111.4	113.0	108.6	114.2	107.4	123.6	125.2	111.4	106.0	111.8	110.2
④有效分蘖 ②第一期	12.0	13.0	13.6	12.6	12.0	14.4	11.0	8.4	12.0	10.2	9.6	9.8	12.4
④有效分蘖 ③第二期	12.9	11.0	12.4	9.0	8.6	10.8	8.0	7.8	10.0	8.6	7.8	8.8	9.8
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.30	3.14	3.06	2.90	3.10	2.08	3.42	2.52	2.58	2.46	3.28	3.34	2.36
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	G	L Cd	Y S	W S	W S	W S	L Gd	W S	W S	W S	W S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑮葉稻熱病	3	4	5	5	3	3	4	4	4		4	4	4
⑯穗頭稻熱病	100	90	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	32.2	55.5	46.6	42.4	53.1	53.0	57.0	45.2	43.8	33.6	34.5	23.9	28.0
⑰紋枯病 ⑲被害度%	13.8	7.1	4.4	9.2	15.1	8.8	11.5	11.1	4.0	16.9	3.0	20.4	19.3
⑳倒伏性	—	—	—	／	—	—	—	／	—	—	—	—	—
㉑耐旱性	++	d	+	d	++	++	d	++	++	d	d	d	+
㉒耐肥性		C	D	△	△	△	△	D	△	△	C	D	D
㉓脫粒性	14.0	12.2	5.2	5.5	6.4	5.7	11.7	6.3	5.4	6.5	13.4	10.2	11.0
㉔出穗期 ②第一期	5.28	6.15	6.18	6.18	6.15	6.16	6.15	6.9	6.19	6.15	6.15	6.15	6.13
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	9.31	10.13	10.18	10.20	10.13	10.11	10.16	10.17	10.17	10.13	10.14	10.17	10.16
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.85	2.61	2.71	2.52	2.21	2.42	2.05	2.45	2.46	2.43	2.02	2.29	2.44
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調査項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2117	2118	2119	2120
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	127.8	90.0	127.2	121.0	131.0	121.6	123.4	89.2	128.4	131.6
①株高 ③第二期	113.8	76.8	115.6	114.7	119.6	114.0	110.0	75.4	105.2	129.6
④有效分蘖 ②第一期	10.2	16.2	12.2	10.8	11.8	9.6	15.0	12.4	8.4	10.4
④有效分蘖 ③第二期	9.8	14.0	11.8	11.9	10.4	9.6	13.6	11.4	8.0	9.4
⑤葉色	Gn	Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.84	2.42	3.22	3.08	2.42	3.50	3.62	3.42	4.10	4.00
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	W S	Y S	Y S	Y S	B F
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_1	R_1	R_1		S_1	S_1	0	R_1	R_1	M_1
⑮葉稻熱病	3	4	4				4	5	4	5
⑯穗頸稻熱病	100	100	100				100	100	100	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	33.7	48.7	48.8		37.6	42.3	39.1	21.6	52.3	34.0
⑰紋枯病 ⑲被害度%	3.9	3.1	15.4		6.1	19.7	2.4	21.4	5.5	6.2
⑳倒伏性	／	—	—	—	—	—	／	／	／	／
㉑耐旱性	卄	d	d	卄	±	d	＋	卄	d	±
㉒耐肥性		D	C		△	△	C	C	D	△
㉓脫粒性	7.3	9.9	14.9	13.0	7.6	7.4	6.1	12.3	9.3	4.5
㉔出穗期 ②第一期	6.18	6.19	6.14	6.13	6.19	6.16	6.14	6.14	6.15	6.15
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.16	10.21	10.15	10.17	10.18	10.16	10.12	10.14	10.14	10.20
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.22	2.47	2.22	2.18	2.23	2.25	2.41	2.35	2.20	2.23
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調査項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	2121	2122	2123	2124	2125	2127	2128	2129	2131	2132	2134	2135	2137
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	130.4	123.0	131.2	132.6	130.6	119.6	123.4	144.2	109.4	130.4	124.2	107.0	128.2
①株高 ③第二期	115.2	106.0	113.4	117.0	114.0	103.8	108.6	118.2	106.6	116.6	114.6	98.5	107.4
④有效分蘖 ②第一期	10.0	10.4	12.0	11.2	13.4	13.6	11.4	9.2	11.4	10.0	10.0	10.2	10.2
④有效分蘖 ③第二期	9.2	7.8	12.5	9.2	12.4	10.6	9.8	7.8	12.0	7.6	8.2	10.5	10.2
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	4.22	2.70	2.12	3.38	3.32	2.16	4.40	4.50	3.28	3.08	4.20	2.84	3.10
⑧芒	—	—	R S	—	—	—	—	R S	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	L G	B F	B F	Y S	W S	Y S	W S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	R_1	0	0	M_1	M_1	0	0	0	0	R_1	0	S_1	M_1
⑮葉稻熱病	4	3	4	4	4	4	4	5	5	4	3		4
⑯穗頸稻熱病	80	90	60	100	100	100	100	100	0	90	100		100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	44.5	30.2	45.3	47.5	40.8	47.1	43.7	51.4	46.7	47.1	36.9	50.3	45.6
⑰紋枯病 ⑲被害度%	9.7	14.0	11.5	7.5	4.9	1.3	1.0	3.8	8.8	4.4	5.8	8.3	9.1
⑳倒伏性	—	—	—	／	／	—	—	／	—	—	—	—	—
㉑耐旱性	d	d	＋	±	＋	d	d	—	卄	＋	d	卄	d
㉒耐肥性	△	△	D	B	△	C	C	D		△	C		C
㉓脫粒性	8.6	10.4	9.4	4.1	6.0	7.4	3.6	4.4	9.1	7.1	9.5	7.7	6.5
㉔出穗期 ②第一期	6.13	6.15	6.18	6.20	6.13	6.13	6.13	6.21	6.8	6.16	6.13	6.9	6.5
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.9	10.14	10.16	10.22	10.15	10.10	10.17	10.19	10.6	10.19	10.12	10.10	10.12
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.29	2.27	2.44	2.53	2.46	2.40	2.54	2.44	2.11	2.67	2.27	2.12	2.29
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	2139	2141	2142	2143	2144	2147	2151	2152	2153	2154
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	120.4	119.6	117.0	125.0	125.0	117.4	87.4	121.4	131.2	122.4
①株高 ③第二期	120.2	119.6	117.0	107.6	107.6	100.4	74.4	106.4	110.0	107.2
④有效分蘗 ②第一期	9.4	9.4	11.4	14.0	11.6	11.6	14.2	18.8	12.8	19.2
④有效分蘗 ③第二期	7.8	7.8	12.6	12.2	10.0	9.6	14.2	18.0	10.6	17.8
⑤葉色	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Cn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Cn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.16	3.76	2.78	3.02	3.06	3.32	2.74	2.10	3.48	2.14
⑧芒	—	—	R S	R S	—	—	R S	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Cn	L Cn	L Cn	L Cn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	B F	Y S	B F	W S	B F	Y S	Y S	G
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_1	R_1	R_1	M_1	R_2	0	0	0	0	M_1
⑮葉稻熱病	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5
⑯穗頸稻熱病	95	100	70	100	100	100	100	100	100	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	46.8	46.9	54.7	48.5	40.4	38.8	41.6	43.0	40.3	52.4
⑰紋枯病 ⑲被害度%	16.7	6.2	1.8	1.1	8.7	2.8	2.8	3.9	2.8	7.5
⑳倒伏性	／	—	—	—	—	—	—	—	—	—
㉑耐旱性	±	d	⧺	⧺	±	d	±	d	d	+
㉒耐肥性	△	D	D	C	△	C	△	△	△	△
㉓脫粒性	3.2	10.6	2.6	3.3	6.5	10.8	3.6	3.8	10.3	4.7
㉔出穗期 ②第一期	6.19	6.14	6.18	6.18	6.20	6.16	6.20	6.20	6.20	6.20
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.22	10.17	10.20	10.19	10.16	10.16	10.20	10.19	10.19	10.19
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.47	1.97	2.45	2.50	2.64	2.04	2.53	2.66	2.43	2.72
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	2155	2157	2158	2160	2161	2162	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	83.4	134.0	131.4	126.8	128.2	128.4	123.0	130.6	123.0	108.0	121.4	132.2	113.4
①株高 ③第二期	70.0	111.2	114.4	115.2	111.0	112.1	113.0	112.6	108.8	107.2	104.5	115.6	100.8
④有效分蘗 ②第一期	16.8	12.8	14.8	14.0	13.8	12.0	10.0	12.2	11.8	9.8	9.8	12.0	8.4
④有效分蘗 ③第二期	16.4	11.6	15.2	11.0	11.0	10.0	9.2	12.0	10.4	9.2	9.8	12.5	8.4
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	2.84	2.70	2.76	2.16	2.20	2.78	3.09	2.40	2.03	2.40	2.80	2.22	3.40
⑧芒	—	R S	—	R S	—	—	—	R S	P M	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×
⑬稃色	Y S	W S	B F	Y S	B F	B F	G	B F	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	R_1	0	R_1	0	0	0	R_1	R_1	0	0	0	S_1	0
⑮葉稻熱病	5	5	5	5	4		4		4	4			3
⑯穗頸稻熱病	100	80	100	100	10		100		90	80			60
⑰紋枯病 ⑱被害率%	46.0	47.9	50.2	47.1	72.0	49.4	46.5	53.3	49.3	39.7	40.4	39.1	33.4
⑰紋枯病 ⑲被害度%	10.6	8.7	2.9	15.5	9.2	23.2	42.3	1.7	4.1	12.4	2.3	1.0	5.4
⑳倒伏性	—	／	—	—	／	／	—	—	／	|	—	—	—
㉑耐旱性	d	+	d	+	+		d	+	+	+	⧺	d	d
㉒耐肥性	△	△	C	D		A	C	△	C	D	△		C
㉓脫粒性	9.2	9.6	5.8	6.5	8.2	5.8	4.2	6.7	10.6	8.4	11.4	9.0	5.3
㉔出穗期 ②第一期	6.18	6.21	6.18	6.18	6.20	6.21	6.16	6.17	6.20	6.29	6.10	6.12	6.14
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.18	10.15	10.20	10.20	10.15	10.23	10.16	10.24	10.18	10.7	10.16	10.10	10.14
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.49	2.36	2.50	2.58	2.35	2.36	2.35	2.29	2.30	2.32	2.16	2.09	2.14
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2178	2179	2180	2181
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	130.2	123.4	119.2	136.8	124.0	130.0	127.8	130.4	122.0	74.6
①株高 ③第二期	113.0	115.6	103.2	118.4	104.0	107.0	112.2	114.4	100.8	59.6
④有效分蘗 ②第一期	14.4	11.8	10.2	12.0	13.6	13.0	14.2	12.2	14.8	16.8
④有效分蘗 ③第二期	13.2	9.8	9.8	10.0	11.8	10.4	12.6	12.5	15.4	18.8
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.96	3.94	3.26	4.36	3.88	3.38	2.86	2.56	1.60	2.40
⑧芒	—	R S	—	R S	—	—	—	—	R S	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	B F	W S	B F	Y S	Y S	Y S	W S	L G d	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑮葉稻熱病	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
⑯穗頸稻熱病	95	100	100	20	100	100	100	100	100	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	48.6	52.2	57.2	48.9	52.6	45.0	47.5	49.6	43.5	48.8
⑰紋枯病 ⑲被害度%	8.9	4.7	5.3	17.8	5.0	0.8	2.2	10.6	14.0	39.6
⑳倒伏性	—	—	—	—	—	—	—	—	／	／
㉑耐旱性	±	±	+	+	±	+	d	d	⧺	+
㉒耐肥性	C	D	C	△	△	△	△	△	△	C
㉓脫粒性	6.8	10.2	8.6	10.3	3.6	5.3	3.5	7.0	3.4	2.5
㉔出穗期 ②第一期	6.18	6.23	6.14	6.20	6.14	6.14	6.14	6.20	6.26	6.20
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.19	10.20	10.11	10.18	10.10	10.14	10.15	10.18	10.25	10.22
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.43	2.43	2.23	2.59	2.52	2.50	2.40	2.49	2.58	2.40
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調查項目 Items	2184	2186	2189	2191	2195	2198	2202	2204	2208	2209	2211	2212	2213
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	123.2	124.4	124.0	116.8	131.0	127.8	129.8	124.4	127.0	129.8	135.2	119.8	82.4
①株高 ③第二期	90.2	107.4	115.8	103.4	115.6	117.2	116.6	99.8	102.2	109.2	110.8	99.4	70.6
④有效分蘗 ②第一期	10.0	9.6	10.8	16.2	14.8	14.6	12.8	11.0	15.6	11.4	13.6	17.4	18.4
④有效分蘗 ③第二期	11.1	9.6	8.8	13.2	12.8	10.0	10.4	12.4	16.2	10.6	14.8	16.4	16.4
⑤葉色	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.50	3.32	2.63	2.34	3.80	2.98	3.18	2.76	1.92	2.62	3.30	2.18	2.28
⑧芒	—	—	—	—	R S	R S	—	—	R S	—	R S	—	—
⑨柱頭色	W	W	B P	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	B P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	L G d	L G d	W S	Y S	B F	Y S	B F	B F	R B	W S	W S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_1	0	M_1	0	M_1	0	0	R_1	R_1	S_5	0	0	R_1
⑮葉稻熱病		5	4	5	5	4	5	5			5	5	5
⑯穗頸稻熱病		90	100	100	100	100	100	20			100	100	80
⑰紋枯病 ⑱被害率%	49.0	44.5	47.9	51.0	48.6	50.0	48.2	47.3	40.7	46.0	47.5	35.5	53.4
⑰紋枯病 ⑲被害度%	2.2	2.1	3.2	10.0	2.3	4.5	10.8	13.5	6.8	9.9	6.8	10.4	6.0
⑳倒伏性	—	—	—	／	／	—	／	／	／	／	／	—	／
㉑耐旱性	⧺	d	d	d	d	±	d	d	d	⧺	±	⧺	d
㉒耐肥性		△	C	C	△	D	C	D	C	△	△	D	B
㉓脫粒性	8.4	7.2	6.7	6.8	4.7	5.4	3.1	5.8	6.3	10.7	3.6	4.6	4.4
㉔出穗期 ②第一期	6.10	6.14	6.16	6.14	6.18	6.20	6.19	6.17	6.25	6.18	6.19	6.20	6.22
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.15	6.17	10.13	10.15	10.20	10.22	10.18	10.21	10.29	10.20	10.21	10.21	10.23
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.27	2.70	2.33	2.34	2.50	2.40	2.43	2.57	2.47	2.47	2.43	2.70	2.48
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number		2215	2216	2217	2218	2221	2223	2224	2225	2226	2227
一、形態的特性											
①株高	②第一期	85.2	125.6	141.0	117.0	131.6	130.6	124.8	118.4	120.4	131.6
	③第二期	71.0	108.6	113.4	91.4	100.4	116.2	101.4	103.2	109.8	113.4
④有效分蘖	②第一期	16.5	13.0	13.2	20.0	15.0	13.6	16.4	15.6	12.0	12.4
	③第二期	14.8	11.6	11.0	17.8	14.0	10.8	14.2	13.4	9.2	9.8
⑤葉色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Cn	Gn	Gn	L Gn	Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Cn	Cn	Cn	Gn
⑦穗重（g）		3.18	3.42	3.32	2.06	2.80	2.98	3.54	3.24	3.78	4.72
⑧芒		—	—	R S	R S	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
	⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色		B F	Y S	Y S	Y S	Y S	W S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		0	R_1	M_1	M_2	R_1	M_1	0	R_1	0	0
⑮葉稻熱病		5	4	4	4	5	5	5	5	4	4
⑯穗頸稻熱病		100	90	100	100	100	100	100	100	100	100
⑰紋枯病	⑱被害率%	50.1	51.4	60.2	41.5	44.1	45.4	36.5	46.9	55.3	53.3
	⑲被害度%	2.5	4.0	5.8	4.8	5.2	1.0	17.0	4.2	21.0	4.7
⑳倒伏性		／	／	—	—	／	—	—	—	—	—
㉑耐旱性		d	d	＋	＋	＋	d	d	＋	＋	d
㉒耐肥性		D	D	△	C	D	C	D	B	C	C
㉓脫粒性		3.7	4.6	7.8	4.8	6.4	5.3	4.5	8.0	10.1	8.5
㉔出穗期	②第一期	6.23	6.19	6.20	6.20	6.20	6.17	6.17	6.18	6.16	6.18
	㉕中間作										
	③第二期	10.24	10.19	10.22	10.23	10.17	10.17	10.15	10.16	10.15	10.20
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		2.42	2.40	2.49	2.55	2.33	2.06	2.39	2.36	2.27	2.38
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考											

調查項目 Items		2229	2231	2233	2237	2239	2240	2241	2243	2244	2245	2247	2248	2253
一、形態的特性														
①株高	②第一期	130.8	129.0	129.8	134.2	122.6	129.4	126.6	120.4	130.6	124.6	128.4	122.2	125.8
	③第二期	112.6	105.8	112.0	126.4	106.6	107.6	113.6	104.0	107.0	110.6	117.0	97.4	110.4
④有效分蘖	②第一期	16.0	13.6	15.8	10.4	10.2	11.4	13.2	13.4	12.0	9.2	7.8	14.2	13.4
	③第二期	13.8	10.8	12.4	9.8	8.2	11.0	12.6	12.4	11.0	9.4	6.0	12.4	11.8
⑤葉色		L Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）		2.16	2.58	3.68	3.00	4.00	4.28	3.62	3.16	3.78	4.54	2.83	3.94	3.12
⑧芒		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色		W	W	W	P	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
	⑫已熟	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色		R B	B F	B F	Y S	Y S	L Gd	Y S	Y S	Y S	Y S	B F	Y S	Y S
二、生理的特性														
⑭幼苗稻熱病		R_1	M_1	R_1	0	M_1	R_1	0	R_1	S_1	R_1	S_2	S_5	0
⑮葉稻熱病		4	4	4	4		5	4	5		4			5
⑯穗頸稻熱病		100	100	100	100		100	100	100		100			100
⑰紋枯病	⑱被害率%	41.9	47.6	50.6	51.9	48.4	50.3	49.2	53.0		46.0	37.4	49.1	23.7
	⑲被害度%	4.2	3.5	2.0	10.8	13.7	4.1	6.2	19.2		9.5	14.5	8.9	0.7
⑳倒伏性		—	／	／	—	／	—	／	／	—	—	／	／	／
㉑耐旱性		±	＃	＋	＋	d	d	＋	d	＋	d	d	±	d
㉒耐肥性		D	△	B	D	D	C	D	C	C	C	△	D	△
㉓脫粒性		1.8	3.1	3.2	4.0	9.5	4.7	3.9	3.2	3.7	9.7	4.9	5.1	4.5
㉔出穗期	②第一期	6.20	6.18	6.20	6.13	6.16	6.19	6.21	6.18	6.20	6.16	6.18	6.18	6.20
	㉕中間作													
	③第二期	10.22	10.21	10.21	10.16	10.17	10.16	10.21	10.17	10.22	10.17	10.20	10.19	10.20
三、穀粒的特性														
㉖穀粒形狀		2.39	2.53	2.48	2.50	1.97	2.35	2.43	2.37	2.40	1.98	2.20	2.37	2.57
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考														

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	2254	2255	2256	2258	2261	2262	2266	2267	2269	2270
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	123.0	130.8	135.2	143.8	126.2	139.6	127.4	122.8	120.8	134.0
①株高 ③第二期	112.0	118.6	125.2	124.4	116.0	124.4	112.0	104.6	106.0	117.4
④有效分蘖 ②第一期	10.2	10.8	11.4	11.6	12.4	11.2	10.4	13.6	14.0	13.4
④有效分蘖 ③第二期	8.2	9.8	10.8	9.4	13.6	7.5	8.2	12.6	13.4	11.8
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.80	3.86	3.18	5.06	2.92	3.38	3.82	3.10	2.26	2.34
⑧芒	—	—	—	—	—	R S	—	R S	—	R S
⑨柱頭色	W	W	P	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	G	B F	G	Y S	W S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_1	M_1	0	0	S_2	R_1	R_1	0	M_1	0
⑮葉稻熱病	4	5	4	4		4	4	4	4	5
⑯穗頸稻熱病	100	100	90	100		100	100	80	100	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	39.2	34.3	37.4	36.3	19.6	26.4	30.3	35.8	40.9	48.1
⑰紋枯病 ⑲被害度%	24.7	5.7	3.1	2.8	5.9	6.3	6.8	26.5	10.7	16.0
⑳倒伏性	／	／	—	—	—	／	—	—	—	—
㉑耐旱性	d	d	d	⧺	d	d	d	d	d	＋
㉒耐肥性	C	△	D	C	D	D	△	△	D	D
㉓脫粒性	6.9	5.7	3.2	2.8	8.9	3.6	8.9	2.6	5.3	5.1
㉔出穗期 ②第一期	6.18	6.21	6.14	6.19	6.12	6.21	6.18	6.21	6.14	6.20
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.17	10.20	10.17	10.19	10.7	10.17	10.17	10.18	10.12	10.19
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.66	2.60	2.50	2.42	2.27	2.71	2.27	2.50	2.40	2.35
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	2274	2276	2280	2281	2282	2283	2284	2287	2288	2292	2294	2295	2296
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	114.0	132.0	125.2	118.0	124.0	125.6	138.6	122.4	99.2	131.6	124.8	110.6	127.4
①株高 ③第二期	100.0	117.8	113.4	104.4	107.2	108.8	125.0	114.8	73.8	120.6	107.8	113.0	115.0
④有效分蘖 ②第一期	14.6	9.2	14.2	13.8	15.4	11.6	12.8	14.0	9.8	13.0	12.4	12.8	11.2
④有效分蘖 ③第二期	11.6	8.2	12.8	11.4	13.0	10.0	10.2	11.0	10.7	11.8	10.4	11.8	9.0
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	2.34	4.00	2.92	2.70	1.92	2.84	3.60	3.08	2.56	3.34	3.08	3.46	2.68
⑧芒	—	—	R S	R S	P M	—	—	--	R S	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	P	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	L G d	L G d	Y S	Y S	Y S	G	B F	Y S	Y S	W S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_2	R	0	S_1	S_1M_3	M_1	R_1	0	0	M_1	R_1	M_1	M_1
⑮葉稻熱病		3	3			4	5	3	4	5	3	5	5
⑯穗頸稻熱病		10	20			100	100	5	100	100	0	100	100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	40.1	40.1	31.2	31.5	38.6	48.5	34.5	34.5	46.8	37.9	45.6	35.6	39.1
⑰紋枯病 ⑲被害度%	19.9	9.1	11.4	20.7	9.4	2.8	17.0	18.2	5.8	3.9	7.4	6.7	23.1
⑳倒伏性	—	／	／	—	—	／	／	—	／	—	—	—	—
㉑耐旱性	d	d	d	—	d	d	±	d	＋	＋	d	d	d
㉒耐肥性	C	△	D	D	C		△	D		△	D	△	D
㉓脫粒性	4.3	5.0	1.4	3.7	4.2	9.9	9.4	5.8	7.0	1.8	2.6	4.0	4.5
㉔出穗期 ②第一期	6.13	6.22	6.21	6.20	6.16	6.12	6.17	6.20	6.1	6.20	6.16	6.20	6.14
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.7	10.19	10.24	10.17	10.15	10.13	10.19	10.20	9.30	10.24	10.20	10.21	10.20
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.58	2.36	2.34	2.47	2.67	2.11	2.49	2.45	2.55	2.19	2.46	2.58	2.52
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2306	2308	2309
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	137.2	131.2	115.0	116.8	115.0	117.0	136.2	117.6	116.6	98.6
①株高 ③第二期	119.2	107.0	103.8	99.4	102.6	100.2	118.4	100.0	104.0	90.8
④有效分蘖 ②第一期	13.2	10.4	12.6	13.2	11.8	10.4	11.6	12.8	17.6	10.6
④有效分蘖 ③第二期	12.0	9.2	9.8	11.8	10.4	8.2	9.8	10.6	15.4	9.6
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	2.72	2.38	3.68	2.20	2.12	2.21	2.74	3.58	2.10	3.00
⑧芒	R S	P M	—	—	—	R S	—	—	—	—
⑨柱頭色	P	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	W S	Y S	W S	Y S	G	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_1	S_1	R_1	0	0	S_2	M_2	M_2	R_2	R_1
⑮葉稻熱病	5		4	4	4		4	4	4	3
⑯穗頸稻熱病	95		100	10	5		100	20	100	10
⑰紋枯病 ⑱被害率%	42.0	28.6	44.8	34.2	37.1	39.4	38.8	37.7	48.0	37.1
⑰紋枯病 ⑲被害度%	5.2	9.8	14.0	4.4	6.0	8.7	7.3	8.0	12.5	10.5
⑳倒伏性	／	／	／	／	—	—	／	—	—	／
㉑耐旱性	—	♯	♯	±	d	d	＋	d	♯	d
㉒耐肥性	D		C	C	D	E	E	E	D	D
㉓脫粒性	2.9	7.6	8.7	2.7	2.8	2.3	4.3	11.1	3.8	18.0
㉔出穗期 ②第一期	6.22	6.23	6.14	6.20	6.10	6.15	6.17	6.13	6.19	6.2
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.21	10.18	10.17	10.15	10.15	10.16	10.14	10.16	10.21	10.5
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.42	2.32	2.33	2.49	2.16	2.55	2.30	2.20	2.54	2.89
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

	2310	2311	2312	2313	2314	2316	2318	2319	2322	2326	2330	2331	2332
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	123.4	84.0	123.0	99.8	116.2	119.8	122.8	128.4	121.4	76.4	139.4	116.8	131.4
①株高 ③第二期	112.1	72.8	119.5	79.3	110.2	104.8	106.2	109.2	114.4	64.0	110.4	100.4	116.4
④有效分蘖 ②第一期	17.4	20.8	13.6	11.6	13.0	12.0	11.4	11.6	11.0	15.8	12.8	10.0	11.8
④有效分蘖 ③第二期	15.8	19.2	11.7	9.0	11.6	10.2	9.8	9.8	10.0	13.2	9.6	9.8	10.6
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	2.98	1.88	2.18	2.66	2.06	2.66	2.28	2.55	2.58	2.36	3.74	3.50	3.38
⑧芒	R S	—	R S	—	—	—	—	P M	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	B F	Y S	W S	G	Y S	G	Y S	W S	Y S	Y S	Y S	B F	B F
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	R_1	R_1	S_2	0	S_3	S_1	S_8	S_1	R_1	0	0	R_1S_1	0
⑮葉稻熱病		4							3	4	4		4
⑯穗頸稻熱病		100							60	80	60		100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	25.2	31.5	34.2	30.7	40.6	35.4	44.6	45.3	60.1	44.0	42.2	24.3	14.5
⑰紋枯病 ⑲被害度%	2.2	3.9	17.0	4.6	9.7	10.4	14.8	6.7	11.7	42.0	34.4	19.4	7.8
⑳倒伏性	—	｜	／	／	／	—	／	／	—	／	／	／	／
㉑耐旱性	＋	d	♯	♯	d	d	d	d	d	＋	♯	♯	d
㉒耐肥性	D	△	△	△	C	C	D	B	C	B			C
㉓脫粒性	5.3	20.9	16.8	19.5	9.7	7.5	14.6	11.4	12.4	5.1	7.0	11.4	2.4
㉔出穗期 ②第一期	6.22	6.22	6.22	6.5	6.14	6.13	6.13	6.22	6.13	6.19	6.22	6.11	6.22
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.27	10.24	10.16	10.3	10.12	10.19	10.15	10.16	10.14	10.17	10.19	10.13	10.18
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.43	2.50	2.55	2.67	2.18	2.19	2.14	2.15	2.19	2.56	2.17	2.14	2.66
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	2333	2334	2335	2336	2338	2341	2342	2343	2344	2347
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	136.2	136.8	95.4	80.8	132.6	130.8	132.8	138.0	132.0	127.2
①株高 ③第二期	103.2	117.6	82.6	70.7	111.4	112.2	124.5	111.4	102.8	109.6
④有效分蘗 ②第一期	12.4	11.8	13.4	8.6	13.0	17.2	16.4	14.0	16.0	11.0
④有效分蘗 ③第二期	12.0	10.6	9.8	7.4	12.0	15.8	15.2	11.2	12.8	8.4
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	D Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.18	3.60	2.21	3.72	3.24	2.58	2.64	2.38	2.22	4.76
⑧芒	RM	RM	—	—	R S	R S	R S	P S	R S	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	B F	W S	L G d	L G d	L G d	L G d	L G d	B F	B F	L G d
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_1	M_2	R_4	R_2	R_1	R_1	R_1	R_1M_1	R_1	R_2
⑮葉稻熱病		4	3		5			4	4	4
⑯穗頸稻熱病		80	20		100			40	40	20
⑰紋枯病 ⑱被害率%	9.3	40.0	21.6	29.8	35.7	43.1	8.4	45.0	11.8	12.8
⑰紋枯病 ⑲被害度%	9.3	31.5	13.1	6.4	5.7	6.4	0.3	38.9	11.6	2.5
⑳倒伏性	／	／	｜	｜	—	／	／	—	／	—
㉑耐旱性	⧺	⧺	+	⧺	+	d	d	d	d	d
㉒耐肥性	B	B		C	△		D	B	△	B
㉓脫粒性	6.3	16.7	25.3	8.1	8.6	3.9	3.0	2.5	3.6	9.2
㉔出穗期 ②第一期	6.23	6.22	6.10	6.23	6.17	6.22	6.22	6.28	6.22	6.12
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.25	10.20	10.10	10.12	10.14	10.20	10.20	10.27	10.24	10.14
三、粒特穀的性										
㉖穀粒形狀	2.35	2.23	2.72	2.52	2.34	2.42	2.44	2.64	2.50	2.34
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	2348	2349	2351	2352	2353	2354	2359	2360	2363	2364	2365	2366	2367
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	115.2	138.6	145.8	148.4	145.6	119.4	135.6	128.0	124.6	123.2	119.4	134.2	132.4
①株高 ③第二期	112.4	129.6	121.3	125.0	121.8	102.7	116.9	105.4	116.1	116.8	106.6	112.6	115.0
④有效分蘗 ②第一期	11.8	10.2	11.0	14.8	13.0	11.6	11.4	12.8	17.2	12.4	13.0	14.4	13.2
④有效分蘗 ③第二期	9.0	7.8	10.1	13.7	9.0	8.0	8.0	10.6	13.5	10.9	10.6	11.4	11.0
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	D Gn	Gn	D Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	2.88	4.14	3.70	3.72	4.38	4.14	3.52	3.22	3.20	4.00	3.30	3.70	3.60
⑧芒	—	R S	R S	R S	—	R S	—	R S	—	P S	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	B F	B F	Y S	L G d	L G d	B F	L G d	Y S	Y S	Y S	W S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	R_1	R_1	S_1	M_1	M_1	R_1M_1	R_2M_1	R_1	S_3	R_1S_1	R_1	R_1S_1	R_1
⑮葉稻熱病		4			4	5	4	4					3
⑯穗頸稻熱病		100			0	100	40	90					10
⑰紋枯病 ⑱被害率%		20.5	22.8	12.8	14.4	18.0	21.5		24.7	27.4	23.0	38.6	33.3
⑰紋枯病 ⑲被害度%		1.9	9.7	0.9	0	12.2	16.3		4.4	3.2	7.8	9.9	8.4
⑳倒伏性	／	—	／	／	／	—	／	—	—	／	／	／	／
㉑耐旱性	d	⧺	±	+	⧺	+	d	d	+	d	+	+	d
㉒耐肥性	B	D	△	D	△	△	D	△	△	△	△	△	△
㉓脫粒性	4.2	2.9	2.2	4.2	1.8	4.9	11.4	8.7	4.4	2.0	4.8	3.8	4.4
㉔出穗期 ②第一期	6.15	6.19	6.19	6.22	6.19	6.14	6.23	6.18	6.22	6.23	6.20	6.22	6.19
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.17	10.21	10.20	6.18	10.21	10.16	10.24	10.19	10.23	10.15	10.17	10.18	10.15
三、粒特穀的性													
㉖穀粒形狀	2.43	2.31	2.42	2.41	2.80	2.12	2.40	2.53	2.35	2.59	2.57	2.57	2.46
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	2368	2369	2370	2371	2373	2374	2375	2382	2383
一、形態的特性									
①株高 ②第一期	124.2	122.4	122.8	129.0	131.8	110.2	124.8	140.6	134.6
①株高 ③第二期	114.4	106.8	105.4	113.2	118.9	93.4	103.2	121.8	
④有效分蘖 ②第一期	11.6	12.0	12.2	12.4	10.2	10.0	11.6	16.2	12.6
④有效分蘖 ③第二期	9.8	10.4	10.0	9.8	10.0	8.1	10.8	15.2	128.1
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn	L Gn	Gn	L Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.80	3.06	3.30	4.26	4.00	3.96	3.40	2.42	3.12
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	R S	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	○	×	×	×
⑬稃色	L G d	L G d	L G d	Y S	L G d	Y S	Y S	B F	R B
二、生理的特性									11.5
⑭幼苗稻熱病	R_1	R_1	R_1	M_1	R_3S_2	S_2	R_1M_1	R_1	R_1
⑮葉稻熱病	3	3	3	3			5		4
⑯穗頸稻熱病	40	60	20	80			100		100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	21.5	36.8	2.92	31.2	22.7	24.5	50.2		10.0
⑰紋枯病 ⑲被害度%	10.2	3.0	0.7	4.6	5.0	7.4	2.3		6.3
⑳倒伏性	／	—	—	—	／	—	—	／	—
㉑耐旱性	d	d	卄	卄	d	d	d	+	d
㉒耐肥性	C	△	△	D	D		△	D	D
㉓脫粒性	5.3	6.5	5.5	16.3	2.5	15.7	5.9	2.3	6.4
㉔出穗期 ②第一期	6.19	6.17	6.15	6.15	6.15	6.13	6.22	6.27	6.20
㉔出穗期 ㉕中間作									
㉔出穗期 ③第二期	10.11	10.15	10.5	10.8	10.17	10.15	10.24	10.26	10.19
三、穀粒的特性									
㉖穀粒形狀	2.50	2.51	2.39	2.45	2.68	2.43	2.59	2.59	2.22
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考									

2501	2502	2503	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2512	2513	2514
	122.0										
125.8	125.4	102.4	114.8	108.2	112.0	104.0	113.8	110.8	96.6	105.6	106.2
	12.8										
10.4	11.0	11.0	10.6	11.6	11.0	16.4	13.3	10.8	16.0	11.8	11.8
Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	Gn
Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
4.20	3.12	1.90	2.64	2.54	4.70	2.00	3.80	2.68	2.50	2.32	2.36
R S	R S	—	—	—	—	—	—	—	—	R S	—
W	W	P	W	W	W	W	W	W	W	W	W
L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	L G d
0	M_1	R_1	0		R_1	R_1	R_2	0	0	0	0
4		5	4	3	5	5	3	5	2	5	5
80		90			100	100		100	0	100	
44.6	66.5	29.2	27.0	41.0	40.0	40.5	38.9	28.1	39.5	43.1	37.4
8.1	25.0	1.6	6.3	3.1	6.3	10.5	26.6	4.2	21.5	9.5	11.7
—	／	／	—	—	／	—	—	／	／	／	／
d	d	d	d	d	d	+	卄	d	卄	d	d
D	D	△	A	△	△	D	△	D	△	D	D
5.3	9.6	8.4	13.6	11.8	21.2	8.0	6.6	5.2	16.0	12.1	16.1
	6.22								7.14		
9.28	10.15	10.9	10.17	10.14	10.23	10.18	10.10	10.19	10.15	10.18	10.1
2.58	2.32	2.94	2.66	2.32	2.58	2.37	2.06	2.57	2.53	2.70	2.68
Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number		2515	2516	2517	2518	2522	2523	2525	2526	2527	2528
一、形態的特性											
①株高	②第一期							135.6			
	③第二期	106.2	107.6	121.9	110.3	108.8	124.2	114.6	117.2	112.6	113.2
④有效分蘗	②第一期							15.4			
	③第二期	14.2	12.2	12.0	10.7	11.4	11.8	12.9	8.6	11.4	13.8
⑤葉色		Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn
⑦穗重（g）		2.60	2.65	3.30	2.32	2.78	3.24	3.70	2.06	3.00	2.08
⑧芒		—	—	R S	R S	—	R S	R S	—	—	—
⑨柱頭色		W	W	W	W	W	W	W	P	W	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn
	⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×
⑬稃色		Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	B F	B F	Y S	Y S
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		0	0	0	R_1	M^3	R_1	M_2	S_2	0	0
⑮葉稻熱病		5	5		5	5	5	5		4	4
⑯穗頸稻熱病			90			0	100	100			10
⑰紋枯病	⑱被害率%	39.5	39.3	39.3	35.7	39.3	39.2	32.9		45.8	32.3
	⑲被害度%	10.8	4.3	10.2	1.5	32.5	13.1	27.8		10.0	13.4
⑳倒伏性		／	—	—	|	／	／	／	／	／	—
㉑耐旱性		d	d	±	#	d	#	#	d	d	d
㉒耐肥性		△	C			C	△			△	△
㉓脫粒性		7.8	18.3	4.8	10.0	11.5	11.1	4.3	10.1	11.3	8.7
㉔出穗期	②第一期							6.24			
	㉕中間作										
	③第二期	10.17	10.18	10.12	10.21	10.20	10.21	10.19	10.7	10.19	10.23
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		2.74	2.92	2.49	2.69	2.37	2.80	2.35	3.14	2.46	2.44
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考											

調查項目 Items		2529	2530	2531	2533	2534	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543
一、形態的特性														
①株高	②第一期											102.1		114.8
	③第二期	108.0	103.4	100.2	112.8	112.2	113.0	107.2	107.0	107.2	121.4	115.6	103.8	107.8
④有效分蘗	②第一期											7.9		11.6
	③第二期	13.6	11.8	12.8	8.4	10.8	14.2	13.8	12.4	12.0	10.6	7.4	10.2	11.9
⑤葉色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）		3.68	2.60	2.16	4.32	2.34	2.82	2.06	3.24	2.40	3.00	4.06	2.42	2.42
⑧芒		R S	R S	—	—	—	R S	R S	R S	—	—	—	—	—
⑨柱頭色		W	W	W	W	W	W	P	W	P	W	W	R P	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn	P	L Gn	L Gn	P	L Gn
	⑫已熟	×	×	×	×	×	×	○	×	○	×	×	○	×
⑬稃色		Y S	Y S	Y S	Y S	L G d	L G d	L Gd	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性														
⑭幼苗稻熱病		0	0	M_1	M_1	0	0	0	0	R_2	0	0	0	R_1
⑮葉稻熱病		3	5	5	5	5	5	5	4	5		3	2	4
⑯穗頸稻熱病		0	10		100	10	100	100	0	20		100	10	100
⑰紋枯病	⑱被害率%	41.7	48.5	34.2	23.6	45.7	41.6	45.7	45.5	37.1	35.6	44.8	36.7	43.3
	⑲被害度%	8.2	5.7	10.4	2.1	6.7	11.0	9.0	8.6	8.9	7.4	8.4	4.7	2.2
⑳倒伏性		／	／	—	／	／	／	—	|	|	—	|	|	—
㉑耐旱性		d	d	d	d	d	d	#	d	#	d	#	+	#
㉒耐肥性		△	E	△	△	△	△	△	△	△	△	E	△	△
㉓脫粒性		15.2	13.0	10.2	19.0	16.2	15.7	20.3	8.1	8.6	6.7	8.9	10.7	8.3
㉔出穗期	②第一期											6.25		6.13
	㉕中間作													
	③第二期	10.21	10.14	10.12	10.21	10.19	10.19	10.21	10.18	10.19	10.17	10.5	10.11	10.17
三、穀粒的特性														
㉖穀粒形狀		2.46	2.15	2.42	2.45	2.71	2.36	2.30	2.45	2.41	2.43	2.37	2.26	2.04
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gn	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考														

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	2544	2545	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554
一、形態的特性										
①株高 ②第一期										
①株高 ③第二期	105.8	100.4	103.0	104.2	105.0	89.4	118.4	100.4	110.8	113.8
④有效分蘖 ②第一期										
④有效分蘖 ③第二期	10.2	10.0	10.2	15.0	12.2	11.6	9.4	14.4	12.0	11.6
⑤葉色	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.48	3.62	3.06	2.28	1.88	1.54	3.24	2.40	3.22	4.58
⑧芒	--	R S	—	R S	--	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	B F	Y S	Y S	Y S	L G d	Y S	L G d	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	0	R_1	0	0	0	R_1	R_1	0	S_4	R_1
⑮葉稻熱病	4	4	1	2	5	4	3			4
⑯穗頸稻熱病		100			100		0			
⑰紋枯病 ⑱被害率%	33.7	32.2	35.9	34.5	45.2	46.4	32.6	34.0	25.4	30.0
⑰紋枯病 ⑲被害度%	13.0	10.5	2.9	1.4	10.1	4.8	12.0	1.2	8.0	13.6
⑳倒伏性	/	|	/	/	/	|	/	/	—	|
㉑耐旱性	#	#	d	d	+	#	±	d	d	d
㉒耐肥性		C	B	C	B	△	B	△	A	△
㉓脫粒性	4.9	4.4	13.1	16.7	6.4	10.4	5.6	10.8	6.3	15.6
㉔出穗期 ②第一期										
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.13	10.8	10.8	10.17	10.9	10.13	10.15	10.22	10.17	10.10
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.50	2.68	2.43	2.54	2.57	2.77	2.41	2.47	2.40	2.66
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	2555	2556	2557	2559	2562	2564	2565	2566	2567	2568	2570	2571	2572
一、形態的特性													
①株高 ②第一期													
①株高 ③第二期	104.8	114.0	107.2	124.2	125.6	127.0	110.2	106.4	105.4	106.4	105.6	103.4	116.8
④有效分蘖 ②第一期													
④有效分蘖 ③第二期	15.6	13.4	10.8	13.8	10.6	10.0	11.0	9.4	11.6	10.2	12.6	12.0	11.0
⑤葉色	L Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.00	2.58	2.88	2.92	4.18	4.10	2.84	2.34	2.63	2.72	2.32	2.81	3.02
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R S	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	P	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	L G d	Y S	W S	Y S	W S	W S	W S	W S	W S	W S	L G d	L G d	B F
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	0	0	R_1	0	M_1	0	R_1	0	0	R_1	R_1	R_1	0
⑮葉稻熱病	3		5	4	5	3	5	4	4	4	5	5	5
⑯穗頸稻熱病				100	90		100		60		20		100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	32.0	35.8	40.4	34.1	24.8	46.6	33.6	37.3	25.2	32.7	36.1	41.7	15.3
⑰紋枯病 ⑲被害度%	2.1	1.1	6.2	15.1	12.8	15.6	6.8	8.3	13.5	8.6	4.4	7.7	2.9
⑳倒伏性	—	/	—	—	—	|	/	—	—	/	/	/	/
㉑耐旱性	d	#	d	d	d	+	—	d	d	d	d	d	d
㉒耐肥性	C	△	B	△	△	△	△	C	△	△	A	△	△
㉓脫粒性	7.0	11.6	4.8	14.4	5.6	12.1	7.1	7.2	13.4	12.5	5.4	29.8	24.0
㉔出穗期 ②第一期													
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.18	10.18	10.10	10.18	10.20	10.18	10.14	10.12	10.12	10.14	10.8	10.23	10.22
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.60	2.56	2.50	2.57	2.48	2.37	2.70	2.48	2.68	2.62	2.89	2.49	2.58
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	2573	2576	2577	2578	2579	2581	2582	2584	2585	2587
一、形態的特性										
①株高 ②第一期						129.6				124.0
①株高 ③第二期	116.2	132.0	116.6	98.2	102.6	104.6	111.8	99.2	106.7	101.0
④有效分蘖 ②第一期						13.4				9.4
④有效分蘖 ③第二期	13.6	12.8	10.2	9.6	11.4	11.2	12.4	8.3	14.9	8.0
⑤葉色	Gn	L Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	2.78	3.70	4.08	2.42	2.74	3.68	3.08	2.30	1.88	3.30
⑧芒	—	—	—	—	—	P L	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	W S	L G d	Y S	Y S	L G d
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	0	0	M_1	0	R_1	0	R_1	0	M_2	0
⑮葉稻熱病	5	4	5	4	5	5	5	3	5	3
⑯穗頸稻熱病	100		80	80	0	100	100	10	0	10
⑰紋枯病 ⑱被害率%	42.6	38.5	18.1	21.8	43.8	26.0	41.7	26.8		19.5
⑰紋枯病 ⑲被害度%	15.8	9.1	0.8	8.2	11.6	3.4	12.5	5.6		8.3
⑳倒伏性	／	／	／	—	／	／	／	|	|	|
㉑耐旱性	╫	d	d	+	d	d	╫	╫	╫	d
㉒耐肥性	△	△	△	B	△	C	△			A
㉓脫粒性	10.8	9.8	5.4	7.5	5.1	8.7	22.8	15.0	18.9	8.5
㉔出穗期 ②第一期					7.9	6.22		7.8		6.22
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.17	10.19	10.13	10.13	10.5	10.14	10.19	10.8	10.12	10.11
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.51	2.40	2.46	2.68	2.26	2.31	2.37	2.54	2.30	2.67
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	2588	2590	2593	2594	2595	2596	2602	2604	2607	2608	2609	2610	2612
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	133.8			93.0						114.8			
①株高 ③第二期	110.6	104.4	96.2	78.1	105.1	110.6	110.6	97.3	95.4	95.9	111.1	100.6	99.2
④有效分蘖 ②第一期	13.8			10.6						13.8			
④有效分蘖 ③第二期	12.4	11.6	13.4	10.4	10.8	11.7	10.4	14.4	13.6	14.5	10.4	12.4	13.2
⑤葉色	Gn	L Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	2.26	3.34	2.80	2.26	2.36	2.31	2.70	3.40	2.54	2.58	3.20	2.38	2.41
⑧芒	—	—	R S	—	—	R S	—	—	—	—	—	—	R S
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	L G d	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	0	M_2	0	M_1	R_1	R_1	0	S_3	0	R_1	M_2	R_1	R_1
⑮葉稻熱病	4	5	5		4	5	4		5		5	4	
⑯穗頸稻熱病	20		50		100	60	0					10	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	45.7	37.3	42.2	27.0	20.8	28.6	42.6	27.2	40.5	27.0	43.7	43.8	33.1
⑰紋枯病 ⑲被害度%	4.7	3.8	6.1	8.3	7.6	0 9	9.2	13.6	0.2	9.2	8.1	7.1	1.0
⑳倒伏性	／	／	／	|	|	|	—	／	／	／	—	—	—
㉑耐旱性	╫	+	d	╫	╫	d	+	d	d	d	d	d	d
㉒耐肥性		A	△	D			△	△	C		△	△	△
㉓脫粒性	9.0	6.6	11.9	9.8	8.8	9.8	12.8	9.5	8.7	8.9	2.5	9.3	10.2
㉔出穗期 ②第一期	6.24			6.3						6.14			
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.14	10.14	10.13	9.30	10.11	10.14	10.18	10.1	10.11	10.7	10.19	10.10	10.18
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.34	2.63	2.55	2.61	2.77	2.55	2.40	2.34	2.42	2.13	2.35	2.67	2.35
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2620	2622	2628	2630
一、形態的特性										
①株高 ②第一期			126.8						123.0	119.2
①株高 ③第二期	93.0	104.4	107.8	99.5	107.1	94.8	109.6	114.0	104.8	98.8
④有效分蘖 ②第一期			13.8						12.6	11.2
④有效分蘖 ③第二期	13.4	13.4	11.4	11.9	12.4	16.2	11.5	13.8	12.2	9.0
⑤葉色	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.20	2.20	3.76	2.15	2.10	1.06	2.68	2.28	2.70	2.84
⑧芒	—	—	—	R S	—	R S	—	R S	R S	PM
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	R P	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	L G d
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_1	S_1	S_6	R_1	M_2	M_1	S_1	R_1	R_2	R_1
⑮葉稻熱病	4			5	5	5		4	4	5
⑯穗頸稻熱病									80	80
⑰紋枯病 ⑱被害率%	30.4	33.3	27.9	38.4	35.7	38.1	48.9	28.3	30.5	31.5
⑰紋枯病 ⑲被害度%	1.7	5.1	1.3	1.6	6.3	0.6	0.3	2.1	1.1	0.2
⑳倒伏性	—	—	／	／	|	|	／	—	／	—
㉑耐旱性	d	+	d	d	d	d	d	╫	d	╫
㉒耐肥性	△	A						B		△
㉓脫粒性	4.6	8.6	8.6	19.1	22.2	19.4	10.6	7.0	3.7	8.5
㉔出穗期 ②第一期			6.23						6.21	6.21
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.13	10.4	10.17	10.22	10.18	10.21	10.14	10.18	10.17	10.13
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.34	2.59	2.56	2.86	2.57	2.48	2.63	2.43	2.50	2.18
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	2631	2633	2635	2636	2637	2639	2642	2643	2645	2646	2649	2650	2651
一、形態的特性													
①株高 ②第一期							117.4				116.0	131.6	
①株高 ③第二期	106.6	106.7	102.0	113.7	111.3	111.8	99.2	96.5	110.3	95.9	99.8	114.0	117.8
④有效分蘖 ②第一期							10.4				14.4	12.4	
④有效分蘖 ③第二期	13.3	9.3	12.2	11.6	13.6	13.1	8.2	12.3	11.9	10.0	12.9	10.0	11.8
⑤葉色	L Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.40	3.86	2.72	2.90	2.88	2.82	3.50	3.06	3.14	2.22	2.90	2.70	3.66
⑧芒	—	—	R S	—	R S	—	R S	—	—	—	R S	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	W S	Y S	Y S	Y S	Y S	W S	Y S	B F	B F	L G d	L G d
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	R_2	R_1	0	S_2	M_2	R_2	R_1	R_1	R_1	R_1	R_1	R_1	R_1
⑮葉稻熱病	4	5	5		5	5	4	3	5	4		5	4
⑯穗頸稻熱病	20				80	10	100		100			100	40
⑰紋枯病 ⑱被害率%	39.5	28.1	31.4	35.9	31.4	31.0	31.5	25.2	34.0	29.1		36.2	39.0
⑰紋枯病 ⑲被害度%	2.3	9.7	8.5	0.2	3.3	0.8	1.1	10.9	3.9	1.4		5.6	1.9
⑳倒伏性	／	|	|	／	／	／	|	|	|	／	—	—	—
㉑耐旱性	d	d	d	╫	d	d	╫	d	d	d	╫	d	╫
㉒耐肥性	△	B	△	△	B		C	△	△	△		D	△
㉓脫粒性	10.0	13.0	7.4	8.4	7.7	8.5	15.4	3.9	5.7	10.3	3.4	2.2	15.8
㉔出穗期 ②第一期							6.26				6.20	6.19	
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.18	10.18	10.16	10.21	10.7	10.17	10.2	10.10	10.12	10.21	10.29	10.16	10.22
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.19	2.44	2.56	2.44	2.55	2.53	2.63	2.58	2.86	2.68	3.44	2.68	2.18
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	2652	2653	2655	2656	2658	2660	2661	2663	2664	2665
一、形態的特性										
①株高 ②第一期		128.6					128.8			
①株高 ③第二期	105.2	105.2	114.6	107.4	120.8	106.0	107.8	106.8	102.2	97.0
④有效分蘖 ②第一期		10.2					13.2			
④有效分蘖 ③第二期	11.8	11.8	12.4	12.2	10.8	12.6	12.4	11.8	11.2	14.2
⑤葉色	L Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.64	4.46	2.82	2.24	2.74	2.26	3.66	2.32	2.12	2.32
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	L G d	B F	Y S	W S	L G d	Y S	Y S	Y S	W S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_1	R_1	0	0	R	0	M_1	0	R_1	M_2
⑮葉稻熱病			4	4	5	4	5	4	5	5
⑯穗頸稻熱病					100	0	0	100	10	
⑰紋枯病 ⑱被害率%		31.1	35.9	36.8	31.0	34.9	36.9	36.8	32.4	40.2
⑰紋枯病 ⑲被害度%		2.2	5.4	7.8	1.9	4.1	4.2	0.6	1.6	4.3
⑳倒伏性	—	—	／	—	|	／	—	—	—	—
㉑耐旱性	d	d	d	d	d	d	╫	+	+	╫
㉒耐肥性	A	△	△	B	E	△	D	△	B	△
㉓脫粒性	11.3	2.7	10.6	5.2	5.1	9.8	5.5	18.8	5.7	5.2
㉔出穗期 ②第一期		6.20			6.28		6.15			
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.16	10.27	10.19	10.15	10.6	10.13	10.14	10.12	10.2	10.8
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.34	2.30	2.61	2.42	2.72	2.36	2.41	2.24	2.46	2.31
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	2666	2668	2669	2670	2671	2672	2675	2676	2679	2681	2682	2683	2684
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	114.8												
①株高 ③第二期	100.2	106.2	90.0	93.6	94.8	101.0	94.2	112.4	92.8	110.0	106.4	92.0	106.6
④有效分蘖 ②第一期	15.0												
④有效分蘖 ③第二期	14.2	10.6	14.0	11.6	10.0	11.6	12.6	14.4	13.0	12.8	11.0	12.0	12.4
⑤葉色	Gn	Gn	L Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.40	2.36	1.82	2.78	3.92	2.09	3.46	1.96	2.13	2.07	1.60	2.50	2.54
⑧芒	—	—	—	—	—	R S	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	B F	Y S	L G d	Y S	Y S	W S	Y S	Y S	Y S	Y S	W S	Y S	W S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	0	M_2	S_4	R	0		R_1	0	0	0	0	R_1	S_1
⑮葉稻熱病	5	4	5	5	5		5	5	5	5	5	4	
⑯穗頸稻熱病	0	0	100		0		100				100		
⑰紋枯病 ⑱被害率%	41.2	36.8	46.4	34.0	6.6	21.9	11.8	23.4	16.3	5.8	13.2	9.0	
⑰紋枯病 ⑲被害度%	6.2	0.3	5.7	2.2	1.5	8.8	4.8	3.0	4.8	0.5	1.9	1.9	
⑳倒伏性	／	—	／	|	—	|	—	—	—	—	—	—	／
㉑耐旱性	╫	d	d	d	+	d	d	d	d	d	d	d	d
㉒耐肥性	D	B	D	C	A		△	△	△	B	B	C	B
㉓脫粒性	6.7	15.3	11.0	9.4	8.2		9.3	8.2	9.5	4.4	9.4	8.0	15.0
㉔出穗期 ②第一期	6.22			6.26									
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.16	10.9	10.13	10.8	10.12	10.14	10.12	10.18	10.15	10.18	10.18	10.8	10.14
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.17	2.44	2.61	2.18	2.18	2.34	2.49	2.54	2.73	2.68	2.21	2.31	2.43
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number		2686	2687	2689	2690	2692	2694	2696	2697	2700	2702
一、形態的特性											
①株高	②第一期		125.6	122.2						93.4	
	③第二期	99.0	110.2	116.8	95.2	120.8	108.2	112.0	113.0	88.0	102.8
④有效分蘖	②第一期		12.6	14.4						9.0	
	③第二期	18.0	10.8	12.2	14.6	12.2	9.8	12.2	12.0	9.6	9.0
⑤葉色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)		2.00	2.66	2.34	1.92	3.18	3.92	2.50	2.80	2.26	3.60
⑧芒		—	—	—	—	—	—	R S	R S	—	—
⑨柱頭色		W	W	W	W	W	W	P	W	W	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn
	⑫已熟	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
⑬稃色		Y S	Y S	R B	Y S	B F	W S	L G d	Y S	L G d	L G d
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		M_1	M_1	0	M_1	S_4	0	M_1	0	R_1	M_1
⑮葉稻熱病		5	4	5	5			5	4		5
⑯穗頸稻熱病		100	100	100							
⑰紋枯病	⑱被害率%	20.7	20.1	12.9	11.3	14.4	5.3	14.6	10.2	26.0	16.9
	⑲被害度%	18.4	4.5	3.1	7.6	9.4	4.2	11.1	4.0	9.7	10.3
⑳倒伏性		／	—	／	—	—	—	—	—	|	／
㉑耐旱性		卄	d	d	d	d	d	d	d	±	d
㉒耐肥性		B	E	C	C	△	B	△	B	D	C
㉓脫粒性		10.1	15.0	6.8	9.4	19.5	13.8	14.4	8.6	7.1	5.0
㉔出穗期	②第一期		6.16	6.23						5.29	
	㉕中間作										
	③第二期	10.18	10.17	10.21	10.10	10.19	10.17	10.18	10.16	10.2	10.14
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		2.64	2.39	2.58	2.33	2.38	2.36	2.41	2.48	2.74	2.67
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考											

調查項目 Items		2703	2705	2706	2707	2709	2711	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720
一、形態的特性														
①株高	②第一期												111.8	
	③第二期	110.0	111.2	110.2	136.4	106.0	103.4	104.8	93.4	115.8	111.2	113.4	90.0	106.0
④有效分蘖	②第一期												13.0	
	③第二期	13.2	12.4	14.4	11.0	10.8	11.6	12.8	12.6	11.0	11.0	13.4	12.4	12.6
⑤葉色		Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)		1.80	2.30	1.82	1.72	2.02	2.36	2.24	1.88	3.56	3.18	2.40	2.35	2.28
⑧芒		—	—	—	R S	—	—	R S	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色		W	W	P	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
	⑫已熟	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色		Y S	Y S	Y S	B F	Y S	L G d	L G d	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	W S
二、生理的特性														
⑭幼苗稻熱病		S_2	0	R_1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M_1
⑮葉稻熱病			5	5	4	4		4	5	5	3	5	4	5
⑯穗頸稻熱病					20				0			60	50	100
⑰紋枯病	⑱被害率%	16.2	18.1	18.6		29.4	23.1	27.0			39.3	25.5	34.3	14.8
	⑲被害度%	5.0	10.7	4.6		22.1	8.4	23.0			14.0	6.5	4.1	9.5
⑳倒伏性		／	—	—	—	—	—	—	—	／	—	—	／	—
㉑耐旱性		d	d	d	d	d	d	d	d	d	±	d	卄	d
㉒耐肥性		△	B	△	D	A	B	C			△	△		△
㉓脫粒性		17.9	14.8	15.4	3.5	10.9	6.8	2.7	8.6	7.9	3.8	5.0	6.0	18.4
㉔出穗期	②第一期				6.27								6.22	
	㉕中間作													
	③第二期	10.20	10.18	10.21	10.16	10.18	10.3	10.11	10.11	10.13	10.14	10.18	10.6	10.13
三、穀粒的特性														
㉖穀粒形狀		2.40	2.70	2.35	2.29	2.50	2.64	2.63	2.50	2.77	2.47	2.46	2.26	2.34
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考														

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number		2722	2724	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2803
一、形態的特性											
①桿高	②第一期										
	③第二期	97.8	100.4	98.8	114.4	113.2	117.8	111.2	104.4	108.6	117.2
④有效分蘖	②第一期										
	③第二期	15.8	15.4	10.8	10.6	8.2	8.2	13.0	11.2	12.4	14.8
⑤葉色		L Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P
⑦穗重(g)		2.20	2.54	3.64	2.34	3.34	3.22	3.78	1.74	2.40	2.04
⑧芒		—	—	R S	—	F L	F L	—	—	—	—
⑨柱頭色		W	W	W	W	W	W	W	W	W	D P
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P
	⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
⑬稃色		Y S	R B	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	L G d
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		0	0	R_1	R_1	0	0	R_1	M_2S_1	R_2	R_2
⑮葉稻熱病		5	5	5	3	3	4	3		4	5
⑯穗頸稻熱病			100	10							50
⑰紋枯病	⑱被害率%	29.8	20.0	19.3	13.4	13.7	15.2	19.3	24.3	21.1	13.0
	⑲被害度%	18.6	11.5	13.8	11.1	6.3	5.4	9.9	7.7	17.1	3.8
⑳倒伏性		—	|	—	／	—	／	—	|	／	／
㉑耐旱性		d	d	d	d	#	#	d	d	d	d
㉒耐肥性		△	△	△	B	A	△	B	△	C	C
㉓脫粒性		8.3	3.1	11.5	8.6	6.0	5.6	5.8	19.5	10.8	14.7
㉔出穗期	②第一期										
	㉕中間作										
	③第二期	10.8	10.27	10.11	10.13	10.10	10.12	10.10	10.14	10.18	10.21
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		2.34	2.47		2.76	2.99	2.91	3.06	2.33	2.69	2.46
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考											

調查項目 Items	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2818	2819	2820		
一、形態的特性													
①桿高 ②第一期													
①桿高 ③第二期	104.4	119.8	112.8	108.6	114.4	109.0	121.0	105.2	99.8	93.0	109.0		
④有效分蘖 ②第一期													
④有效分蘖 ③第二期	10.6	12.2	16.2	9.4	13.0	14.6	17.4	10.4	14.8	12.0	7.2		
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn		
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn		
⑦穗重(g)	2.01	2.76	2.28	3.10	3.54	2.92	1.78	1.78	1.82	2.32	3.96		
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	D P	W	W	W	W	W		
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn		
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×		
⑬稃色	Y S	Y S	W S	L G d	Y S	Y S	L G d	W S	L G d	Y S	R B		
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	R_2	S_1	R^I			R_5	R_3	S_4	0	0	S_1		
⑮葉稻熱病	4		5			4				5			
⑯穗頸稻熱病	20									100			
⑰紋枯病 ⑱被害率%	18.4	13.5	17.2	10.6	22.2	39.0	33.5	35.7	34.4	10.8	22.4		
⑰紋枯病 ⑲被害度%	13.9	5.5	6.8	0.9	1.9	1.3	11.0	5.7	14.0	5.2	17.6		
⑳倒伏性	—	—	—	|	／	／	—	—	／	—	|		
㉑耐旱性	d	d	#	#	+	d	d	d	d	#	d		
㉒耐肥性	△	D	C	A	C	C	B	△	△	C	B		
㉓脫粒性	14.4	15.3	18.4	8.4	15.3	9.9	12.3	10.1	6.6	10.3	6.1		
㉔出穗期 ②第一期													
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.15	10.18	10.19	10.4	10.21	10.15	10.28	10.13	10.11	10.10	10.23		
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.34	2.56	2.35	2.39	2.50	4.23	2.35	2.47	2.49	2.43	2.45		
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl		
㉘備考													

調査項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3011
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	106.2	107.8	96.6	89.2	85.8	109.2	110.6	113.4	40.0	99.4
①株高 ③第二期	90.8	83.8	92.4	72.2	67.4	98.8	88.5	109.6	41.2	58.4
④有效分蘗 ②第一期	10.0	8.6	7.0	14.4	9.0	11.4	9.6	15.0	10.8	14.4
④有效分蘗 ③第二期	11.2	11.5	9.0	12.4	10.4	14.4	12.4	14.4	9.5	14.2
⑤葉色	DGn	DGn	DGn	DGn	DGn	DGn	Gn	Gn	DGn	
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重 (g)	3.06	4.18	4.02	2.86	3.58	2.06	3.08	2.42	0.92	2.82
⑧芒	F L	F L	P M	PM	PM	R M	—	F L	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	LGn	LGn	LGn	I.Gn	LGn	P	LGn	LGn	LGn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	B F	YS
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	$S_{8\cdot5}$	$S_{8\cdot5}$	0	S_2	0	S_6	S_8	S_6	S_6	S_6
⑮葉稻熱病			3	4						
⑯穗頸稻熱病			50	70						
⑰紋枯病 ⑱被害率%	31.1	38.4	41.4	22.7	45.2	58.5	37.8	45.0		45.7
⑰紋枯病 ⑲被害度%	15.0	29.2	16.3	22.2	29.4	12.1	12.4	12.8		36.3
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	+	±	−	+	±	+	+	+	⧺	+
㉒耐肥性	B	A	B	B	B	C	B	B	△	B
㉓脫粒性	6.7	9.3	0.9	1.4	1.1	9.7	3.7	7.1	∠1	11.8
㉔出穗期 ②第一期	6.9	6.10	6.7	6.10	6.14	6.10	6.13	6.12	5.19	6.10
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	9.27	10.1	10.5	9.26	9.28	9.29	10.20	10.6	9.23	9.28
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.06	2.05	2.24	1.90	1.93	2.16	2.01	2.14	1.64	2.15
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	78.0	73.8	96.8	109.2	111.0	69.8	77.2	74.2	101.8	83.2
①株高 ③第二期	66.5	72.8	96.9	94.6	84.8	61.8	64.6	73.2	85.0	70.6
④有效分蘗 ②第一期	12.4	15.2	11.0	12.8	11.6	8.8	10.2	12.8	6.0	9.6
④有效分蘗 ③第二期	10.6	10.9	8.9	13.6	9.4	7.0	10.8	10.8	7.6	9.2
⑤葉色	Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.46	1.32	2.82	2.58	3.18	2.22	2.70	2.22	3.62	2.60
⑧芒	—	RM	—	RM	RS	FL	RM	RS	FL	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×
⑬稃色	YS	YS	YS	YS	YS	BF	YS	YS	YS	YS
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_1	S_7	$S_{8\cdot8}$	S_8	$S_{8\cdot8}$	S_3	S_2	$S_{3\cdot5}$	S_4	$S_{8\cdot5}$
⑮葉稻熱病						5	4			
⑯穗頸稻熱病						0	100			
⑰紋枯病 ⑱被害率%	57.2	37.3	22.9	18.6	61.1	58.8	48.9	39.9	72.7	60.5
⑰紋枯病 ⑲被害度%	24.9	11.8	2.5	4.5	21.0	18.8	43.2	40.0	23.3	25.3
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	±	—	+	+	+	+	+	+	+	+
㉒耐肥性	B	C	C	C	B	B	C	C	B	C
㉓脫粒性	∠1	∠1	11.4	8.5	∠1	13.0	∠1	∠1	∠1	12.5
㉔出穗期 ②第一期	6.5	6.17	6.21	6.16	6.9	5.16	5.24	5.27	6.2	6.10
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.10	10.16	10.16	10.15	9.28	9.18	9.20	9.25	9.26	9.27
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.12	2.21	2.21	2.26	2.05	2.11	2.08	2.18	2.03	2.18
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number	3022	3023	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	91.8	106.0	88.0	93.4	79.8	90.8	97.0	104.4	105.7	108.8	98.0	85.0	111.6
①株高 ③第二期	77.4	91.8	75.4	80.0	82.6	84.0	92.0	92.3	87.8	93.2	82.8	94.6	98.0
④有效分蘗 ②第一期	9.6	11.8	11.0	10.8	9.0	10.6	9.2	11.5	11.0	10.2	11.4	12.2	11.8
④有效分蘗 ③第二期	11.2	10.4	10.6	7.4	8.4	11.0	9.0	10.2	10.0	10.0	11.4	9.8	12.5
⑤葉色	Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.16	1.86	2.84	2.76	2.18	2.70	2.44	3.42	3.44	2.96	2.82	2.32	2.64
⑧芒	—	—	—	RS	—	RS	RS	—	RS	RM	—	P1	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○
⑬稃色	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	$S_{8\cdot8}$	S_7	$S_{8\cdot8}$	M_2.	S_4	S_8	$S_{8\cdot8}$	$S_{8\cdot5}$	$S_{8\cdot5}$	$S_{8\cdot5}$	S_5	S_7	S_8
⑮葉稻熱病				3									
⑯穗頸稻熱病				90									
⑰紋枯病 ⑱被害率%	54.9	62.6	31.2	21.0	54.7	57.5	87.1	55.3	35.6	46.1	21.1	26.6	28.8
⑰紋枯病 ⑲被害度%	27.4	36.3	25.3	11.8	44.4	35.5	11.3	41.7	12.4	14.2	9.0	11.3	0.5
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	+	—	—	+	+	±	+	±	+	+	±	+	±
㉒耐肥性	C	C	B	C	C	C	D	C	△	C	△	C	C
㉓脫粒性	∠1	22.3	∠1	4.2	5.5	∠1	1.6	2.9	11.8	∠1	∠1	4.9	9.1
㉔出穗期 ②第一期	6.10	6.8	6.7	6.3	5.16	5.20	5.21	6.15	6.19	6.8	6.20	6.8	6.17
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	9.25	9.25	9.29	9.26	9.30	9.25	10.10	10.6	9.27	9.29	9.28	10.3	10.15
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.27	2.12	2.19	2.28	2.15	2.12	2.20	2.14	2.02	2.09	2.16	2.15	2.13
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	76.2	107.8	101.4	100.6	104.2	111.0	92.2	112.6	114.6	122.0
①株高 ③第二期	62.4	90.0	85.2	87.6	90.2	100.0	74.4	96.0	102.4	106.6
④有效分蘖 ②第一期	15.6	8.6	10.6	18.4	10.0	10.0	14.4	11.0	10.0	10.4
④有效分蘖 ③第二期	13.4	8.4	7.4	14.2	7.2	10.8	13.6	12.4	11.6	9.0
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.60	2.86	3.60	1.88	2.18	3.32	2.54	3.32	2.76	3.44
⑧芒	P L	P L	—	—	F L	—	R L	—	R S	F L
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪已熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫未熟	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_1	S_7	S_7	S_3	S_8	S_8	S_6	R_1	S_7	S_6
⑮葉稻熱病	5			5						
⑯穗頸稻熱病	100			90						
⑰紋枯病 ⑱被害率%	54.9	59.1	32.9	41.8	55.4	27.8	42.2	28.3	58.5	33.7
⑰紋枯病 ⑲被害度%	32.6	46.7	15.5	14.2	17.4	9.4	25.3	13.1	14.6	4.8
⑳倒伏性	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜
㉑耐旱性	+	+	+	+	±	+	+	+	+	+
㉒耐肥性	△	C	D	D	B	C	B	C	C	C
㉓脫粒性	5.1	11.7	∠1	13.7	1.8	∠1	2.4	3.0	12.3	1.5
㉔出穗期 ②第一期	6.10	6.7	6.5	6.25	6.2	6.14	6.14	6.23	6.17	6.14
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	9.25	9.26	10.4	9.30	9.29	10.12	9.25	10.9	10.8	10.10
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.19	2.15	2.04	2.12	2.13	2.22	2.22	2.04	2.00	2.19
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3062
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	98.8	104.8	99.0	82.2	79.2	74.8	103.8	107.0	108.0	115.2	116.4	96.4	103.2
①株高 ③第二期	79.4	90.4	90.2	72.4	65.5	61.6	87.1	97.4	97.1	106.4	96.0	95.7	88.8
④有效分蘖 ②第一期	11.2	10.6	11.4	11.0	11.2	14.6	15.4	10.6	11.4	10.2	9.4	9.7	11.8
④有效分蘖 ③第二期	11.0	10.0	9.8	10.6	10.5	13.6	13.1	10.8	9.8	8.6	8.2	9.5	10.6
⑤葉色	D Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.64	4.08	2.52	4.44	3.42	2.08	2.26	3.54	3.04	3.26	3.88	2.11	2.62
⑧芒	F L	R S	—	—	—	—	RM	—	｜	P L	P L	P L	—
⑨柱頭色	W	R P	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪已熟	R P	R P	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P
⑩稃尖色 ⑫未熟	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	B F	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_8	R_1	S_8	$S_{8\cdot5}$	S_8	$S_{8\cdot5}$	$S_{8\cdot8}$	$S_{8\cdot8}$	$S_{8\cdot8}$	$S_{8\cdot5}$	$S_{8\cdot5}$	S_4	$S_{8\cdot5}$
⑮葉稻熱病		3											
⑯穗頸稻熱病		100											
⑰紋枯病 ⑱被害率%	20.6	44.6	47.1	44.9	51.8	62.9	65.6	28.2	27.7	30.9	35.4	52.9	38.7
⑰紋枯病 ⑲被害度%	10.5	39.6	44.1	12.0	20.2	31.9	16.3	5.8	10.5	13.1	13.0	15.2	28.0
⑳倒伏性	｜	｜	｜	｜	｜	—	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜
㉑耐旱性	+	±	±	±	+	+	⧺	+	±	+	+	±	+
㉒耐肥性	B	C	D	C	D	△	C	D	C	C	C	C	B
㉓脫粒性	∠1	4.7	7.4	∠1	∠1	2.0	∠1	8.4	10.5	∠1	9.1	7.5	∠1
㉔出穗期 ②第一期	6.7	6.2	6.8	5.22	6.22	6.16	6.7	6.7	6.23	6.15	6.10	6.16	6.6
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	9.20	9.29	10.10	9.24	9.29	9.26	9.28	10.16	10.22	10.9	9.28	10.14	9.28
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.12	2.41	2.07	2.01	2.02	21.11	2.21	2.06	2.13	2.28	2.10	2.20	2.01
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	3063	3065	3066	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	82.0	88.6	104.0	89.2	96.2	94.2	95.0	93.2	77.4	115.4
①株高 ③第二期	65.6	75.2	74.0	70.6	77.4	74.2	68.6	83.2	73.6	100.0
④有效分蘖 ②第一期	17.0	18.4	14.0	13.6	14.6	18.0	13.2	13.0	13.6	9.4
④有效分蘖 ③第二期	16.0	16.2	11.6	14.6	14.8	15.4	13.4	13.2	11.8	8.0
⑤葉色	D Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	2.16	2.02	2.08	2.54	2.40	2.52	2.18	2.62	2.76	3.84
⑧芒	RM	RM	RS	—	RS	—	RM	RM	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○
⑬稃色	YS	YS	BF	BF	BF	BF	YS	YS	BF	BF
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_8	S_7	S_7	S_5	S_4	S_5	S_1	S_5	$S_{8.5}$	S_5
⑮葉稻熱病							5			
⑯穗頸稻熱病							100			
⑰紋枯病 ⑱被害率%	40.4	57.2	72.6	59.8	36.4	43.9	46.8	34.3	33.2	46.4
⑰紋枯病 ⑲被害度%	32.0	19.0	7.6	46.3	29.5	21.2	7.6	6.7	12.5	13.2
⑳倒伏性	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜
㉑耐旱性	+	±	+	+	±	+	+	+	−	+
㉒耐肥性	C	D	C	C	B	C	C	C	D	C
㉓脫粒性	1.8	∠1	1.0	∠1	13.1	∠1	7.9	5.7	∠1	1.3
㉔出穗期 ②第一期	6.11	6.15	6.17	6.5	6.10	6.9	6.9	6.12	5.21	6.4
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	9.27	9.28	9.25	9.25	9.28	9.27	9.25	9.25	9.26	10.5
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.20	2.44	2.15	2.20	2.15	2.03	2.09	2.12	2.24	2.15
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3088
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	105.2	82.0	78.4	37.4	83.4	82.4	113.2	96.4	93.8	93.6	86.4	87.6	101.8
①株高 ③第二期	105.0	68.6	75.6	32.0	67.6	63.6	99.4	92.8	86.4	91.6	85.2	76.9	94.0
④有效分蘖 ②第一期	11.1	15.3	12.8	17.0	10.4	10.6	9.6	10.8	12.2	9.2	9.8	9.4	9.8
④有效分蘖 ③第二期	12.0	14.0	13.4	12.2	10.6	11.4	8.2	10.4	11.0	10.6	10.2	9.0	10.1
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.00	1.80	2.10	1.20	2.44	2.40	3.38	3.44	3.20	4.20	2.70	3.24	2.92
⑧芒	—	RM	RM	—	RS	PM	RS	—	RM	—	—	PL	PL
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	P	L Gn	P	P	L Gn	P	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×	○
⑬稃色	YS	YS	YS	BF	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_7	S_3	S_7	S_5	S_4	S_7	S_3	S_7	S_7	S_4	S_4	S_6	S_6
⑮葉稻熱病		5					5						
⑯穗頸稻熱病		100					100						
⑰紋枯病 ⑱被害率%	49.4	30.7	49.3	40.4	67.1	83.8	55.6	35.0	38.9	29.4	55.8	62.7	27.3
⑰紋枯病 ⑲被害度%	40.8	28.3	41.3	37.2	27.7	31.7	3.6	21.1	15.8	23.5	14.0	39.5	13.8
⑳倒伏性	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜
㉑耐旱性	+	±	±	+	+	±	+	+	±	+	±	++	+
㉒耐肥性	C	B	D	C	B	C	C	C	C	D	C	C	C
㉓脫粒性	15.4	4.4	∠1	∠1	∠1	∠1	7.5	∠1	∠1	3.3	11.8	10.0	6.4
㉔出穗期 ②第一期	6.18	6.18	5.31	5.21	6.3	5.28	6.18	6.14	6.10	6.19	6.19	6.10	6.19
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.15	9.26	9.24	9.24	9.21	9.18	10.10	10.4	10.4	10.15	10.4	9.30	10.16
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.08	2.40	2.03	1.53	2.07	2.04	1.93	2.18	2.09	2.04	2.15	2.10	2.01
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	75.6	62.0	96.2	82.2	91.4	88.8	99.0	98.8	73.6	63.8
①株高 ③第二期	58.7	53.4	78.2	74.8	73.4	71.6	82.8	79.4	72.0	66.6
④有效分蘖 ②第一期	14.4	10.6	12.0	10.4	15.2	14.4	11.6	11.6	16.0	15.2
④有效分蘖 ③第二期	13.0	12.4	12.8	10.8	12.2	14.8	11.8	13.0	15.7	13.8
⑤葉色	Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	2.96	1.56	3.10	1.98	2.56	2.38	2.92	3.26	2.12	1.44
⑧芒	—	R S	R M	F M	P L	P M	R M	×	×	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	○	○	○	×	×	○	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	M_2	R_1	S_7	S_7	S_6	S_5	S_3	S_4	$S_{8\cdot8}$	S_8
⑮葉稻熱病	4						4			
⑯穗頭稻熱病	100						100			
⑰紋枯病 ⑱被害率%	47.8	83.3	42.4	53.2	27.6	35.2	85.5	72.6	40.1	89.8
⑰紋枯病 ⑲被害度%	27.3	28.4	33.1	43.0	13.0	26.0	36.0	44.0	34.2	89.5
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	+	d	+	+	+	+	d	+	+	+
㉒耐肥性	B	C	C	C	C	C	A	A	C	C
㉓脫粒性	∠1	9.1	∠1	∠1	∠1	∠1	2.0	9.9	∠1	∠1
㉔出穗期 ②第一期	6.4	5.17	6.7	5.19	6.10	6.12	6.2	6.3	5.19	6.10
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	9.29	9.21	9.25	9.22	9.24	9.26	9.24	9.25	9.22	9.24
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.17	2.21	2.43	2.11	1.94	1.89	2.23	2.43	2.11	1.94
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	3099	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	76.2	76.2	99.8	97.4	94.2	94.2	112.8	80.2	82.2	95.2	86.2	80.2	89.6
①株高 ③第二期	70.6	63.8	95.0	90.6	83.8	83.6	99.8	63.0	67.8	79.8	68.8	66.4	72.6
④有效分蘖 ②第一期	10.8	18.2	11.8	13.0	12.0	13.6	10.0	14.4	10.4	13.4	8.0	14.6	13.4
④有效分蘖 ③第二期	12.2	17.2	10.4	11.6	12.8	14.4	8.0	13.2	8.4	13.3	8.0	14.4	12.6
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	2.00	2.22	3.64	2.66	2.98	2.58	3.16	2.78	2.74	3.56	3.86	1.70	3.16
⑧芒	—	—	—	R M	P L	—	—	—	—	P L	—	F L	R M
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	P	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	×	○	×	○	×	×	×	×	○	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	$S_{8\cdot5}$	S_7	$S_{8\cdot8}$	$S_{8\cdot8}$	$S_{8\cdot5}$	SR_3	$S_{8\cdot8}$	O	S_4	S_7	S_8	S_3	S_4
⑮葉稻熱病								3				4	
⑯穗頭稻熱病								80				100	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	61.2	24.2	25.7	45.9	31.1	44.6	36.4	44.6	66.9	27.4	8.4	24.1	53.5
⑰紋枯病 ⑲被害度%	28.3	14.3	25.1	35.4	17.9	38.1	34.0	20.6	25.8	10.6	5.8	10.3	43.4
⑳倒伏性	|	|	|	／	／	／	／	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	+	+	+	+	±	—	±	±	+	+	+	+	+
㉒耐肥性	C	C	C	C	C	C	C	C	D	B	C	B	C
㉓脫粒性	∠1	2.7	8.8	∠1	∠1	7.0	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1	2.4	13.3
㉔出穗期 ②第一期	6.9	6.3	6.20	6.11	6.9	6.7	6.7	6.2	6.2	6.16	5.28	6.20	6.7
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	9.26	9.23	10.17	10.4	9.28	9.28	10.5	9.22	9.28	9.26	9.23	9.28	9.25
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	1.89	2.22	2.70	2.01	2.29	2.47	2.03	2.16	2.10	2.38	2.05	2.08	2.13
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3120	3121	3122	3123
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	81.4	90.2	40.4	90.8	91.8	91.2	69.4	72.6	60.4	72.0
①株高 ③第二期	73.2	76.6	39.3	84.8	78.0	87.6	64.6	76.3	63.7	65.6
④有效分蘖 ②第一期	11.8	14.8	12.0	10.8	11.2	17.2	13.2	11.2	14.0	13.2
④有效分蘖 ③第二期	11.8	14.4	12.3	9.0	10.2	15.0	13.6	11.2	15.2	10.2
⑤葉色	Gn	Gn	D Gn	Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.30	2.74	1.70	2.96	3.46	2.22	1.63	1.30	1.84	1.04
⑧芒	—	P L	R S	Rn	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_5	S_2	$S_{8\cdot8}$	S_8	S_8	S_4				
⑮葉稻熱病		4								
⑯穗頸稻熱病		80								
⑰紋枯病 ⑱被害率%	42.3	26.3	48.9	37.8	29.4	35.6	33.8	40.5	31.5	34.5
⑰紋枯病 ⑲被害度%	32.4	24.5	43.5	31.5	12.8	11.5	30.6	36.6	28.4	32.7
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	+	±	±	±	—	+	+	±	+	±
㉒耐肥性	C	C	D	C	B	C	C	C	B	C
㉓脫粒性	6.7	∠1	∠1	∠1	1.5	∠1	2.5	1.8	3.1	2.4
㉔出穗期 ②第一期	6.3	6.15	6.3	6.7	6.7	6.6	6.9	6.8	5.22	5.22
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	9.23	9.23	9.29	9.30	9.30	10.3	9.24	9.20	9.20	9.19
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.19	2.27	1.41	2.03	2.09	2.25	2.18	2.27	2.20	2.20
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3302	3303	3304	3305	3306
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	65.4	65.2	54.0	48.6	55.4	76.5	59.8	64.2	88.6	98.2	79.2	99.2	80.8
①株高 ③第二期	59.4	63.2	61.8	60.6	74.6	66.2	71.2	61.6	85.6	85.0	64.4	98.0	66.6
④有效分蘖 ②第一期	16.6	14.0	25.4	22.6	19.2	17.6	20.4	13.8	16.0	13.5	14.4	12.0	14.2
④有效分蘖 ③第二期	13.8	11.8	13.4	16.4	13.2	10.6	13.2	13.6	14.4	14.2	14.4	12.6	14.8
⑤葉色	D Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn
⑦穗重(g)	0.94	1.36	1.12	0.82	1.22	0.68	1.12	1.20	1.96	2.28	2.28	2.98	2.12
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病									$S_{8\cdot8}$	$S_{8\cdot9}$	$S_{8\cdot3}$	$S_{8\cdot8}$	S_7
⑮葉稻熱病													
⑯穗頸稻熱病													
⑰紋枯病 ⑱被害率%	54.1	46.9	60.6	40.5	38.2	38.5	42.7	36.1	48.4	28.7	44.4	24.6	23.1
⑰紋枯病 ⑲被害度%	46.4	39.8	46.5	32.3	28.8	15.6	27.0	34.2	28.1	20.0	35.7	21.6	19.2
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	±	±	±	+	+	±	±	±	+	d	+	+	±
㉒耐肥性	B	C	C	C	C	C	C	C	B		C	B	C
㉓脫粒性	3.1	4.7	2.9	3.2	1.5	2.9	3.5	2.7	1.0	∠1	∠1	∠1	∠1
㉔出穗期 ②第一期	5.22	5.30	5.29	5.22	5.25	5.22	5.22	5.24	6.5	6.6	6.1	6.7	6.4
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	9.20	9.24	9.21	9.18	9.25	9.19	9.20	9.21	10.4	10.4	9.18	10.4	9.16
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.11	2.13	2.15	2.14	2.22	2.28	2.21	2.09	2.28	2.18	2.40	2.18	2.44
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	89.6	79.8	84.6	92.4	64.2	95.2	112.6	90.4	80.3	111.8
①株高 ③第二期	72.3	67.8	78.3	75.2	64.4	94.4	98.8	90.5	82.0	101.8
④有效分蘖 ②第一期	11.4	12.2	13.6	12.2	9.6	9.8	9.2	11.2	10.8	8.8
④有效分蘖 ③第二期	11.2	12.2	10.4	13.0	10.2	9.0	10.6	10.5	13.0	9.6
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	2.10	2.32	2.92	2.22	2.54	3.52	3.90	2.62	2.06	4.30
⑧芒	—	—	—	—	P S	P S	—	—	—	F L
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_6	$S_{8\cdot5}$	$S_{8\cdot5}$	S_3	S_6	S_7	S_7	S_2	M_2	S_8
⑮葉稻熱病						3			4	
⑯穗頸稻熱病						20			100	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	42.9	42.2	53.7	37.9	32.5	47.4	50.4	40.9	43.6	19.4
⑰紋枯病 ⑲被害度%	7.6	39.3	23.5	13.8	11.5	14.8	8.0	15.6	18.6	12.1
⑳倒伏性	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜
㉑耐旱性	+	—	—	+	+	+	±	+	—	⧺
㉒耐肥性	D	C	D	D	D	C	C	C	D	B
㉓脫粒性	∠1	∠1	∠1	12.9	∠1	∠1	∠1	6.9	∠1	∠1
㉔出穗期 ②第一期	6.8	5.21	6.1	5.30	5.14	6.9	6.20	6.9	5.29	6.17
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	9.20	9.20	9.21	9.25	9.26	10.4	10.18	9.20	9.20	10.16
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.44	2.17	2.33	2.18	2.05	2.38	2.16	2.21	2.19	2.20
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3328	3330	3331
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	62.0	99.0	96.2	103.0	92.6	72.6	76.4	98.4	78.0	80.3	88.6	82.0	93.8
①株高 ③第二期	62.4	84.2	85.4	94.4	81.7	72.0	74.6	89.2	67.8	65.0	71.2	76.8	80.2
④有效分蘖 ②第一期	11.4	11.4	10.8	12.6	14.2	12.2	13.2	9.0	17.6	12.4	12.2	14.0	12.2
④有效分蘖 ③第二期	11.2	10.6	11.4	11.2	14.7	11.6	12.4	9.6	15.6	10.2	13.0	13.3	11.0
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	2.10	2.96	2.52	3.32	2.96	2.80	2.28	2.82	2.04	2.86	2.76	2.02	1.58
⑧芒	—	—	—	—	R S	—	—	—	—	—	RM	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_7	S_7	S_5	S_7	S_6	S_3	S_7	S_7	S_7	M_1	S_3	S_3	S_7
⑮葉稻熱病			3							3		4	
⑯穗頸稻熱病			30							90		100	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	53.8	52.3	33.0	25.7	44.9	42.1	48.0	39.8	52.9	30.9	52.6	31.8	41.8
⑰紋枯病 ⑲被害度%	50.8	31.9	28.3	8.1	18.3	24.8	13.4	7.7	45.4	10.0	31.6	9.6	31.3
⑳倒伏性	｜	｜	｜	｜	／	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜
㉑耐旱性	±	±	+	+	+	±	+	+	+	+	+	+	+
㉒耐肥性	△	B	B	B	C	△	C	△	C	B	C	B	C
㉓脫粒性	∠1	∠1	∠1	8.4	9.2	∠1	∠1	8.5	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1
㉔出穗期 ②第一期	5.14	6.5	6.7	6.18	6.12	6.2	5.20	6.18	5.30	5.29	6.6	6.1	6.7
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	9.18	9.25	9.29	10.14	9.30	10.5	9.20	10.14	9.28	9.21	9.24	9.20	9.30
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.12	2.16	2.15	1.97	2.13	2.16	2.17	2.21	2.24	2.29	2.27	2.16	2.13
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	3332	3333	3334	3336	3337	3338	3340	3341	3342	3343
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	86.6	86.8	84.8	90.4	72.8	74.2	82.6	88.0	76.2	76.4
①株高 ③第二期	71.6	66.2	71.6	80.4	61.8	61.8	76.4	71.0	73.8	66.4
④有效分蘗 ②第一期	13.2	12.0	13.8	16.2	14.2	11.4	13.8	13.0	10.4	14.2
④有效分蘗 ③第二期	13.6	12.6	14.0	15.8	14.0	10.0	14.6	11.4	10.6	13.6
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	2.12	2.18	1.74	3.18	2.46	2.30	2.54	0.78	2.00	1.74
⑧芒	—	—	R L	—	—	—	—	—	P M	F L
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_8	S_4	S_1	S_1	S_1	S_4	S_7	S_6	S_4	S_4
⑮葉稻熱病			4	4	4					
⑯穗頸稻熱病			100	100	80					
⑰紋枯病 ⑱被害率%	53.8	46.4	50.6	31.4	52.5	27.9	38.9	49.2	58.6	75.0
⑰紋枯病 ⑲被害度%	48.5	43.8	5.3	23.4	21.6	25.6	23.0	40.3	25.0	66.1
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	+	±	+	+	+	+	+	+	+	‡
㉒耐肥性	C	D	C	C	B	C	C	C	C	D
㉓脫粒性	∠1	∠1	11.6	13.4	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1
㉔出穗期 ②第一期	6.1	6.1	6.2	6.10	5.31	5.25	6.2	6.2	5.14	5.15
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	9.19	9.21	9.21	9.24	9.23	9.24	9.22	9.20	9.18	9.16
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.23	2.29	2.24	1.97	2.31	2.05	2.09	2.36	2.12	2.07
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	3344	3345	3347	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	78.8	90.2	94.2	73.2	88.4	74.2	86.0	83.0	77.4	83.0	95.2	79.2	78.0
①株高 ③第二期	65.8	76.2	80.0	60.0	69.2	71.8	82.4	72.6	66.5	68.7	80.4	68.2	69.0
④有效分蘗 ②第一期	15.0	13.2	12.0	12.0	15.4	13.8	14.6	13.2	11.8	14.0	17.0	10.8	12.8
④有效分蘗 ③第二期	13.8	13.4	12.4	13.6	15.8	13.8	12.8	13.8	11.5	12.8	17.4	10.4	12.7
⑤葉色	D Gn	L Gn	Gn	D Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	1.74	2.24	2.86	3.14	2.24	2.42	2.78	2.54	2.38	2.52	2.86	2.80	2.70
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Y Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_7	S_7	S_7	S_6	S_8	S_4	S_7	S_8	S_7'	S_7	S_7	S_8	S_8
⑮葉稻熱病													
⑯穗頸稻熱病													
⑰紋枯病 ⑱被害率%	49.2	37.4	64.9	51.6	46.4	36.5	61.5	37.4	43.9	36.2	23.7	38.3	41.8
⑰紋枯病 ⑲被害度%	49.4	27.0	16.6	9.2	40.8	33.1	24.5	28.0	36.3	23.2	22.8	31.8	32.0
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	+	+	±	+	±	±	+	+	±	+	+	+	+
㉒耐肥性	A	C	C	D	△	△	C	D	C	C	C	D	C
㉓脫粒性	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1	6.4	∠1
㉔出穗期 ②第一期	6.3	6.2	6.4	6.3	5.28	5.19	6.2	6.1	5.25	5.30	6.2	5.29	5.25
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	9.24	9.21	9.19	9.20	9.20	9.20	9.28	9.19	9.19	9.27	9.20	9.20	9.21
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.20	2.30	2.19	2.06	2.29	2.40	2.13	2.25	2.33	2.29	2.40	2.13	2.30
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	3359	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3368	3369	3370
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	76.0	86.2	91.8	92.0	95.0	78.8	86.8	88.2	88.0	93.4
①株高 ③第二期	68.4	73.6	80.8	79.2	85.0	64.0	78.4	75.8	70.2	78.3
④有效分蘗 ②第一期	13.6	12.8	13.6	12.6	13.6	12.8	14.6	13.2	12.8	13.2
④有效分蘗 ③第二期	14.2	12.0	14.2	11.0	12.6	12.6	14.0	13.6	12.8	14.0
⑤葉色	D Gn	D Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.22	2.98	2.76	3.42	2.70	3.00	2.32	3.00	2.60	3.10
⑧芒	—	R M	R L	—	—	—	—	R L	—	R S
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	○	×	×	○	×	○	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_8	S_7	S_5	S_8	S_6	S_4	S_5	$S_{8\cdot5}$	$S_{8\cdot8}$	$S_{8\cdot8}$
⑮葉稻熱病										
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%	42.6	20.4	82.9	64.5	69.6	56.2	46.1	46.4	39.9	47.3
⑰紋枯病 ⑲被害度%	40.9	16.2	40.3	58.0	36.3	32.8	41.6	40.8	26.6	44.5
⑳倒伏性	|	|	|	／	／	／	／	|	|	|
㉑耐旱性	d	—	±	+	卄	+	±	+	+	+
㉒耐肥性	C	C	C	C	C	△	C	B	C	B
㉓脫粒性	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1	12.3	2.3	12.9
㉔出穗期 ②第一期	5.20	6.5	6.7	6.1	6.4	5.28	6.1	6.5	6.17	6.10
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	9.20	9.26	9.24	9.17	10.1	9.18	9.28	9.26	10.1	9.20
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.10	2.07	2.13	2.33	2.21	2.10	2.26	2.19	2.23	2.18
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	3371	3372	3373	3374	3375	3376	3377	3378	3379	3380	3382	3383	3384
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	78.2	82.4	88.6	84.4	77.0	96.4	84.6	77.6	77.2	92.2	70.0	83.8	88.2
①株高 ③第二期	70.4	74.8	75.6	72.4	66.2	80.0	74.0	66.4	65.6	89.2	70.2	70.4	67.4
④有效分蘗 ②第一期	13.0	11.8	12.2	11.0	12.2	11.2	11.6	10.8	12.4	15.2	14.0	12.0	15.2
④有效分蘗 ③第二期	12.8	10.4	13.0	12.0	11.4	9.2	10.2	9.6	12.6	13.4	13.6	10.8	13.0
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.02	2.92	2.96	2.26	2.28	2.88	2.64	2.96	2.22	1.92	2.38	2.08	2.52
⑧芒	—	—	—	R M	—	—	R M	—	P L	—	—	—	P L
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	×	×	○	○	×	×	○	×	×	×	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	$S_{8\cdot8}$	S_7	S_7	S_5	S_6	S_7	S_7	$S_{8\cdot5}$	$S_{8\cdot5}$	$S_{8\cdot5}$	S_8	S_7	S_8
⑮葉稻熱病													
⑯穗頸稻熱病													
⑰紋枯病 ⑱被害率%	46.2	42.1	58.4	59.3	49.7	31.7	49.8	42.8	51.6	51.3	70.7	59.8	53.9
⑰紋枯病 ⑲被害度%	40.8	40.8	50.1	29.0	8.8	4.1	40.0	22.4	18.5	31.5	60.0	58.6	34.1
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	／	／	|	|	／
㉑耐旱性	+	±	+	+	±	+	+	+	±	+	+	+	±
㉒耐肥性	C	D	B	B	C	D	C	B	C	C	C	C	C
㉓脫粒性	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1	13.4	∠1	13.2	∠1	∠1	∠1	11.5
㉔出穗期 ②第一期	5.31	6.5	6.7	6.2	6.1	6.6	6.3	5.28	6.18	6.7	5.28	5.27	6.11
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	9.20	9.29	10.4	9.26	9.27	10.1	9.20	9.21	9.26	10.6	9.27	9.19	9.20
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.30	2.26	2.31	2.15	2.19	2.13	2.12	2.16	2.10	2.21	2.08	2.23	2.22
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number		3385	3386	3387	3388	3389	3390	3391	3392	3393
一、形態的特性										
①株高	②第一期	85.8	85.0	87.2	101.2	75.8	81.4	69.8	79.0	91.8
	③第二期	79.8	79.0	72.8	90.0	63.2	72.0	60.2	78.9	82.4
④有效分蘗	②第一期	14.0	15.6	12.6	13.6	14.4	12.6	13.2	14.6	12.0
	③第二期	12.1	13.2	10.2	11.4	14.0	11.4	12.8	12.2	10.6
⑤葉色		D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）		2.98	2.62	2.92	3.42	2.26	2.68	2.58	2.52	2.52
⑧芒		—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色		W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
	⑫已熟	×	○	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色		Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病		S_2	S_6	S_8	S_8	S_2	S_7	S_1	S_8	S_2
⑮葉稻熱病		3				3				
⑯穗頸稻熱病		60				100				
⑰紋枯病	⑱被害率%	45.6	34.3	57.8	50.2	41.9	45.9	50.2	24.9	40.5
	⑲被害度%	8.5	28.2	50.5	41.0	25.6	28.0	44.0	17.0	22.7
⑳倒伏性		|	|	|	|	|	|	|	|	／
㉑耐旱性		＋	♯	＋	＋	＋	＋	－	±	＋
㉒耐肥性		C	△	C	D	C	C	C		
㉓脫粒性		∠1	1.5	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1
㉔出穗期	②第一期	6.4	6.4	6.5	6.6	5.23	5.26	5.24	5.30	5.30
	㉕中間作									
	③第二期	9.30	10.3	9.21	9.30	9.21	9.22	9.20	9.20	9.20
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀		2.21	2.23	2.32	2.06	2.24	2.14	2.25	2.35	2.16
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number		3501	3502	3503	3504	3505	3506	3507	3508	3509	3510
一、形態的特性											
①株高	②第一期	81.3	78.4	86.2	85.3	90.1	100.6	94.8	78.7	78.9	83.8
	③第二期	71.4	73.8	79.8	77.4	83.6	91.2	83.4	77.0	74.6	73.6
④有效分蘗	②第一期	12.8	14.4	10.2	14.0	11.0	14.2	13.2	12.0	14.4	12.8
	③第二期	11.6	10.0	9.6	10.2	12.4	15.2	12.8	12.4	12.2	13.6
⑤葉色		D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn
⑥莖基色		L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑦穗重（g）		2.27	2.97	2.96	2.74	3.30	3.36	2.44	2.26	2.78	1.98
⑧芒		—	—	—	—	—		—	—	—	—
⑨柱頭色		W	W	W	W	W		W	W	W	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
	⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色		Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		S_8	$S_{8,5}$	$S_{8,5}$	S_6	S_7	S_7	S_8	S_8	S_5	$S_{8,5}$
⑮葉稻熱病											
⑯穗頸稻熱病											
⑰紋枯病	⑱被害率%	64.5	57.2	49.4	66.0	55.8	23.5	48.4	59.9	57.4	53.8
	⑲被害度%	50.0	48.5	17.3	60.8	38.3	22.1	39.0	30.8	26.6	19.1
⑳倒伏性		|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性		＋	＋	＋	－	＋	＋	＋	♯	＋	＋
㉒耐肥性			C	D	C	C	△	D	△	△	△
㉓脫粒性		∠1	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1	7.7	∠1	∠1	1.4
㉔出穗期	②第一期	5.27	5.24	5.30	5.27	5.26	6.8	5.29	5.26	5.29	5.28
	㉕中間作										
	③第二期	9.22	9.26	9.25	9.23	9.21	10.10	9.26	9.24	9.22	9.22
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		1.77	1.78	1.75	1.76	1.80	1.91	1.70	1.86	1.94	2.14
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考											

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	3511	3512	3513	3514	3515					
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	84.8	95.0	88.6	79.0	95.4					
①株高 ③第二期	70.2	78.0	65.0	62.4	81.4					
④有效分蘖 ②第一期	14.2	12.2	12.6	13.2	14.0					
④有效分蘖 ③第二期	12.0	11.8	12.6	14.0	12.6					
⑤葉色	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn	D Gn					
⑥莖基色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn					
⑦穗重（g）	2.24	2.62	2.60	2.18	3.10					
⑧芒	—	—	—	—	—					
⑨柱頭色	W	W	W	W	W					
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn					
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×					
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S					
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	$S_{8.5}$	$S_{8.5}$	S_8	S_7	S_3					
⑮葉稻熱病										
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%	51.8	51.5	88.1	74.9	83.4					
⑰紋枯病 ⑲被害度%	25.0	19.7	77.9	56.9	82.1					
⑳倒伏性	|	|	|	|	|					
㉑耐旱性	+	+	+	+	+					
㉒耐肥性	△	B	C	D	C					
㉓脫粒性	1.9	∠1	∠1	∠1	3.7					
㉔出穗期 ②第一期	5.28	5.31	6.1	5.24	5.28					
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	9.21	9.26	9.24	9.22	9.22					
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.14	2.13	2.27	2.32	2.16					
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl					
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	4401	4402	4403							
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	127.2	132.0	95.0							
①株高 ③第二期	101.0	112.6	70.8							
④有效分蘖 ②第一期	6.0	5.0	7.0							
④有效分蘖 ③第二期	5.4	5.8	7.4							
⑤葉色	L Gn	L Gn	Gn							
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn							
⑦穗重（g）	3.99	4.3	3.2							
⑧芒	R S	R S	F L							
⑨柱頭色	W	W	W							
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn							
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×							
⑬稃色	W S	W S	Y S							
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_7	M_1	M_1							
⑮葉稻熱病		3	3							
⑯穗頸稻熱病		100	100							
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	|	|	|							
㉑耐旱性	+	—	+							
㉒耐肥性	A	D	D							
㉓脫粒性	0.9	2.3	8.1							
㉔出穗期 ②第一期	6.12	6.17	6.3							
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.10	10.13	10.3							
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.44	2.38	2.00							
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl							
㉘備考										

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number		4501	4502	4504	4505	4506	4507	4508	4509	4510	4511	4512	4513	4514	4515	4516	4517
一、形態的特性																	
①株高	②第一期	90.0	124.2	110.0	126.0	122.0	83.0	90.0	84.0	86.0		91.0	91.0		124.0	95.0	133.0
	③第二期	80.4	118.2	97.2	120.2	110.4	80.4	88.6	76.0	82.6	110.2	90.0	85.6	105.2	111.6	83.4	110.4
④有效分蘗	②第一期	9.0	10.6	8.0	12.6	10.0	10.0	7.0	10.0	12.0		10.0	12.0		13.0	9.0	10.0
	③第二期	12.2	9.4	9.6	10.0	12.4	10.8	10.8	18.4	11.6	9.6	9.2	10.6	8.4	10.0	11.4	10.2
⑤葉色		L Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	P
⑦穗重（g）		2.18	2.88	2.98	1.92	3.42	2.20	3.94	2.18	2.46	2.70	3.02	2.34	3.08	3.36	2.56	3.14
⑧芒		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	B P
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P
	⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色		L G d	Y S	Y S	Y S	Y S	L G d	L G d	Y S	G	Y S	B F	L G d	Y S	Y S	L G d	Y S
二、生理的特性																	
⑭幼苗稻熱病			0	0	R_1S_1	R_1	R_1	R_1	R_2	R_1	R_2	R_1	R_1	R_1	R_1	R_2	R_2
⑮葉稻熱病		3	3	3		4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	
⑯穗頸稻熱病		60	20	80		90	100	100	100	80	80	100	100	0	0	90	
⑰紋枯病	⑱被害率%	34.9	27.5	32.8	58.6	19.9	26.5	26.3	30.5	73.5	26.8	58.6	31.4	18.2	10.0	17.2	22.7
	⑲被害度%	22.1	12.4	24.5	56.1	5.6	8.1	9.9	29.1	9.7	8.0	22.2	14.5	4.6	1.7	1.3	8.6
⑳倒伏性		|	|	／	|	|	|	|	／	|	|	|	／	|	／	|	／
㉑耐旱性		d	d	d	#	d	#	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d
㉒耐肥性			D	D	C	D	△	D	C	C	C	C	C		D	C	D
㉓脫粒性		14.7	7.7	8.7	11.2	4.7	13.6	4.5	15.6	9.0	13.4	13.9	15.4	15.0	6.0	19.5	8.3
㉔出穗期	②第一期	6.3	6.26	6.12	6.14	6.22	6.3	6.3	6.3	6.3	5.21	6.1	6.2		6.18	6.4	6.17
	㉕中間作																
	③第二期	10.5	10.9	10.9	10.4	10.23	10.1	10.3	9.24	9.30	10.9	9.30	10.3	10.17	10.21	10.4	10.20
三、穀粒的特性																	
㉖穀粒形狀		2.56	2.75	2.36	2.63	2.50	2.31	2.64	2.46	3.00	2.65	2.66	2.57	2.46	2.49	2.36	2.42
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考																	

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	4601	4602	4603	4604	4605	4606	4607	4608	4609	4611
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	105.0	119.5	115.1	106.0	111.0	112.0	107.0	86.0		93.0
①株高 ③第二期	93.5	98.8	105.8	93.1	91.8	96.2	88.4	78.8	80.5	77.6
④有效分蘖 ②第一期	6.0	7.8	7.0	9.0	10.0	10.0	10.0	7.0		8.0
④有效分蘖 ③第二期	8.7	5.8	5.0	8.4	11.8	8.2	10.2	7.2	4.4	6.6
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	L Gn	D Gn
⑥莖基色	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑦穗重（g）	3.64	3.22	4.46	3.12	3.10	3.76	2.98	3.92	3.12	4.28
⑧芒	F L	—	F L	—	—	—	—	R M	R S	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	B P	W	W	W	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	B P	L Gn	L Gn	L Gn	B P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	○	×	×	○	×	×	×	○
⑬稃色	Y S	Y S	W S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_8	M_4	R_1	S_8	SR_3	S_8	S_7	0		S_5
⑮葉稻熱病			3					3		
⑯穗頸稻熱病			100					100		
⑰紋枯病 ⑱被害率%	41.4	16.3	20.1	34.6	23.6	46.9	50.9	28.7	66.9	54.2
⑰紋枯病 ⑲被害度%	6.3	6.3	7.8	16.0	22.4	24.9	26.6	20.7	15.0	39.3
⑳倒伏性	|	／	|	|	|	|	—	|	|	|
㉑耐旱性	+	±	±	++	++	++	++	—	—	—
㉒耐肥性	D		C	D	D	D		C	C	D
㉓脫粒性	7.7	∠1	2.7	6.4	7.8	7.1	4.1	6.7	∠1	15.9
㉔出穗期 ②第一期	6.5	6.1	6.7	6.17	6.7	6.15	6.19	6.9		6.14
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.8	10.3	10.5	10.11	9.30	10.7	10.15	10.12	10.3	10.6
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.50	2.30	2.71	2.59	2.65	2.58	2.19	2.40	2.31	2.30
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	4612	4613	4614	4615	4616	4617	4618	4620	4621	4623	4625	4628	4630
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	137.0	110.0	132.0	124.0		103.0		99.4	127.4				
①株高 ③第二期	124.3	109.2	120.3	111.0	107.2	89.8	81.0	79.0	112.0	98.2	85.1	98.2	84.2
④有效分蘖 ②第一期	9.2	11.0	8.0	8.0		10.0		10.0	12.2				
④有效分蘖 ③第二期	6.4	10.2	6.6	7.6	11.8	13.2	6.6	11.2	11.0	9.2	7.3	6.8	6.6
⑤葉色	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn
⑦穗重（g）	3.12	2.70	3.76	3.88	2.40	4.54	2.52	3.64	2.70	2.92	2.65	2.64	2.64
⑧芒	—	—	—	—	F L	R S	F L	P M	—	F L	R L	R S	
⑨柱頭色	B P	P	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	R P	B P	P	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	B P	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	○	○	×	×	○	×	○	○	○	○	×
⑬稃色	Y S	W S	D P	R B	L G d	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	L G d	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病		RM_3	S_7	R_2		R_3		S_4	M_3S_1	M_5	R_1	R_2	S_3
⑮葉稻熱病											3	3	
⑯穗頸稻熱病											80	10	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	45.2	38.2		11.3	51.0	46.5	78.4	35.5	50.1	82.4	29.9	11.7	22.5
⑰紋枯病 ⑲被害度%	13.7	26.2		4.2	22.2	35.1	33.3	6.5	27.7	28.5	19.2	9.6	13.9
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	—	／	|
㉑耐旱性	+	+	+	+	d	++	±	++	+	+	±	d	±
㉒耐肥性	D	△	C	C		C		△	D				
㉓脫粒性	14.1	8.9	1.1	7.2	10.8	13.1	8.0	23.1	3.7	13.0	5.8	9.8	∠1
㉔出穗期 ②第一期	6.29	6.18	6.12	6.11		6.7	7.25	6.7	6.14				
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.30	10.13	10.13	10.6	10.12	10.3	10.7	10.4	10.9	10.3	10.15	10.3	10.8
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.99	2.29	2.64	2.39	2.69	2.12	2.38	2.08	2.23	2.74	2.51	2.36	2.83
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number	4631	4632	4635	4637	4638	4640	4641	4642	4643	4644
一、形態的特性										
①株高 ②第一期			102.1			112.0	102.0		104.0	
①株高 ③第二期	83.8	86.8	81.4	89.8	105.8	84.4	76.4	93.4	95.4	80.3
④有效分蘖 ②第一期			5.0			10.0	10.0		11.0	
④有效分蘖 ③第二期	7.0	8.0	6.8	8.0	8.0	8.2	9.2	5.8	10.8	7.2
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	D Gn	D Gn	Gn	D Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn
⑦穗重 (g)	2.94	2.66	3.38	2.96	3.48	4.74	3.04	2.90	3.78	3.42
⑧芒	—	F L	F L	F L	—	F L	F L	R S	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	B P	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
⑬稃色	D P	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	L G d	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_5	R_1M_1		S_1M_1	M_3	S_8	$S_{8.5}$	S_8	S_8	S_7
⑮葉稻熱病		3			3					
⑯穗頸稻熱病		90			10					
⑰紋枯病 ⑱被害率%	19.7	16.4	43.8	16.4	16.4		29.7	28.4	18.0	32.4
⑰紋枯病 ⑲被害度%	13.8	8.0	30.9	15.0	9.4		10.5	8.9	3.5	9.4
⑳倒伏性	|	|	／	|	|	／	|	|	|	|
㉑耐旱性	+	+	+	±	±	+	+	+	±	+
㉒耐肥性						D	D		D	
㉓脫粒性	1.3	6.0	6.0	2.0	1.7	11.0	5.3	2.8	2.1	11.1
㉔出穗期 ②第一期			6.10			6.13	6.11		6.19	
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.11	10.4	10.3	10.7	10.4	10.7	10.5	10.1	10.13	10.4
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.23	2.29	2.20	3.04	2.20	2.46	2.22	2.64	2.04	2.44
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number	4646	4648	4649	4650	4652	4654	4655	4656	4657	4658	4659	4661	4662
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	134.0				89.0			110.0			104.6	109.0	117.8
①株高 ③第二期	124.4	97.4	102.0	93.8	72.0	104.4	80.3	105.4	81.4	105.0	99.2	95.0	97.6
④有效分蘖 ②第一期	8.0				11.5			9.0			8.8	11.0	5.6
④有效分蘖 ③第二期	8.2	6.2	6.2	7.2	11.0	7.6	7.6	7.6	11.2	20.0	6.6	6.0	6.2
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重 (g)	3.94	3.30	3.60	2.78	2.62	3.56	3.08	3.56	2.54	2.81	3.78	4.22	3.24
⑧芒	—	R L	—	F L	—	F L	—	—	—	—	F L	—	F L
⑨柱頭色	W	B P	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	R P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	B P	L Gn	B P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	○	○	×	○	×	×	×	○	○	○	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	L G d	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	R_1	M_3S_1	S_5	S_7	R_1			R_1	R_1		$S_{8.5}$	S_8	$S_{8.5}$
⑮葉稻熱病	2								4				
⑯穗頸稻熱病	20								10				
⑰紋枯病 ⑱被害率%	6.1	29.8	25.8	28.8	20.5	17.2	32.2	7.4	85.2	32.6	20.2	23.9	45.9
⑰紋枯病 ⑲被害度%	4.2	2.6	5.6	14.8	5.0	8.2	27.1	2.3	9.4	20.6	17.9	19.2	34.1
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	／	／	／	|	|	|	|
㉑耐旱性	±	—	—	±	±	±	d	+	d	d	+	+	+
㉒耐肥性	C				B			A			D	D	△
㉓脫粒性	7.1	3.6	5.6	2.9	9.9	3.1	6.5	11.3	3.9		10.6	6.6	∠1
㉔出穗期 ②第一期	6.28				6.1			6.11			6.9	6.24	6.11
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.6	10.1	10.3	10.5	10.8	10.11	10.1	10.6	10.11	10.14	10.2	10.18	10.6
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.00	2.42	2.49	2.70	2.58	2.26	2.72	2.12	2.28	2.71	1.98	2.28	2.61
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items		4663									
一、形態的特性											
①株高	②第一期										
	③第二期	94.2									
④有效分蘖	②第一期										
	③第二期	8.8									
⑤葉色		Gn									
⑥莖基色		Gn									
⑦穗重（g）		3.68									
⑧芒		—									
⑨柱頭色		W									
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn									
	⑫已熟	×									
⑬稃色		Y S									
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		R_3									
⑮葉稻熱病		4									
⑯穗頸稻熱病		0									
⑰紋枯病	⑱被害率%	18.4									
	⑲被害度%	4.9									
⑳倒伏性		|									
㉑耐旱性		+									
㉒耐肥性											
㉓脫粒性		4.9									
㉔出穗期	②第一期										
	㉕中間作										
	③第二期	10.6									
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		2.84									
㉗胚乳性質		Gl									
㉘備考											

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items		4701	4702	4704	4705	4706	4707	4708	4709	4710	4711
一、形態的特性											
①株高	②第一期	97.4	99.4	100.2	98.8	100.2	103.6	96.4	95.6	100.8	94.6
	③第二期	85.6	82.7	94.9	81.2	86.2	91.2	87.0	88.6	90.3	86.4
④有效分蘖	②第一期	9.0	8.0	7.6	9.4	8.8	10.6	10.8	7.6	7.2	9.4
	③第二期	8.0	8.4	6.6	7.6	7.0	10.0	10.8	7.0	8.8	7.4
⑤葉色		L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）		4.44	4.26	3.52	4.40	3.64	2.96	4.26	4.22	4.80	3.58
⑧芒		F L	R S	R S	P L	F L	F L	R S	F L	F L	R M
⑨柱頭色		W	B P	W	W	W	W	W	B P	R P	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	B P	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	B P	P	L Gn
	⑫已熟	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×
⑬稃色		Y S	L G d	L G d	W S	Y S	Y S	W S	B F	L G d	L G d
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		M_4	R_1	$S_{8\cdot5}$	M_1	R_2	$S_{8\cdot8}$	R_1	R_3	S_1	S_1
⑮葉稻熱病											
⑯穗頸稻熱病											
⑰紋枯病	⑱被害率%		55.9	49.2			49.9	40.6	45.3	51.2	49.4
	⑲被害度%		48.6	44.7			40.1	36.5	38.1	42.6	41.1
⑳倒伏性		|	|	／	|	|	／	|	|	|	|
㉑耐旱性		±	+	+	+	+	+	+	±	±	+
㉒耐肥性											
㉓脫粒性		9.9	8.5	9.1	10.5	3.8	10.8	9.9	8.5	6.7	6.1
㉔出穗期	②第一期	6.12	6.11	6.8	6.10	6.10	6.12	6.8	6.6	6.8	6.10
	㉕中間作										
	③第二期	10.3	10.2	10.5	10.5	10.5	10.7	10.4	10.8	10.2	10.8
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		2.44	2.26	2.10	2.36	2.61	2.22	3.23	2.27	2.31	2.15
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gn	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考											

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	4712	4713	4714	4715						
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	112.2	10 7.	100.6	99.8						
①株高 ③第二期	103.4	101.0	100.1	82.2						
④有效分蘖 ②第一期	8.6	10.6	12.8	10.0						
④有效分蘖 ③第二期	8.0	11.0	12.6	7.2						
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn						
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn						
⑦穗重（g）	4.52	3.40	3.36	3.64						
⑧芒	R S	—	F L	P M						
⑨柱頭色	R P	W	R P	W						
⑩稃尖色 ⑪未熟	R P	L Gn	R	L Gn						
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	○	×						
⑬稃色	Y S	W S	Y S	Y S						
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_3	S_8	S_7	M_1						
⑮葉稻熱病										
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%	50.6	46.5	45.1	59.6						
⑰紋枯病 ⑲被害度%	46.1	38.3	22.3	30.9						
⑳倒伏性	|	|	|	|						
㉑耐旱性	+	+	+	−						
㉒耐肥性			B	C						
㉓脫粒性	4.0	20.6	10.9	9.8						
㉔出穗期 ②第一期	6.8	6.18	6.2	6.2						
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.3	10.21	10.7	9.24						
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.27	2.04	2.39	2.23						
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl						
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	5004	5005	5015	5016	5018	5020	5023	5024	5028	5029
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	139.0	125.0	143.0	140.0	128.4	113.0	122.0	132.5	117.0	137.0
①株高 ③第二期	118.4	114.6	121.8	144.0	106.8	93.4	112.5	125.2	100.4	111.0
④有效分蘖 ②第一期	10.0	14.0	7.0	8.0	15.6	10.0	8.0	5.0	15.0	11.0
④有效分蘖 ③第二期	11.6	12.6	7.5	11.0	13.4	10.4	9.6	6.4	13.0	11.6
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn
⑤莖基色	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	P
⑦穗重（g）	2.88	2.24	3.84	2.82	3.06	1.37	3.54	3.90	2.56	2.82
⑧芒	—	—	—	—	F L	—	R S	—	R S	F L
⑨柱頭色	W	B P	W	W	W	W	B P	W	W	P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	B P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	B P	L Gn	L Gn	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	○	○	×	○	○	×	○	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	W S	B F	R B	Y S	L G d	D P
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_1	R_2	S_5	R_1	R_1	S_2	R_1	M_1	S_2	R_1M_1
⑮葉稻熱病	4	4		5			3	4		5
⑯穗頸稻熱病	100	100					100	10		100
⑰紋枯病 ⑱被害率%	15.3	26.5	40.1	16.6	11.2	19.7	18.5	21.6	14.9	20.5
⑰紋枯病 ⑲被害度%	15.0	13.5	30.7	10.0	7.0	6.5	9.5	4.7	14.6	5.7
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	／	／	／	／	—
㉑耐旱性	d	++	−	+	+	+	±	−	−	d
㉒耐肥性	D	D	△			C	C	C	C	C
㉓脫粒性	11.8	15.2	17.2	22.6	3.3	9.0	10.7	17.4	10.9	2.8
㉔出穗期 ②第一期	6.15	6.12	6.10	6.13	6.9	6.3	6.12	6.14	6.21	6.14
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.20	10.15	10.3	10.20	10.18	10.2	10.15	10.18	10.23	10.13
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	3.01	2.45	2.01	2.03	2.40	2.08	3.09	2.40	2.03	3.22
㉗胚乳性質	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	5030	5031	5033	5035	5036	5037	5038	5039	5040	5041	5042
一、形態的特性											
①株高 ②第一期	126.0		127.0	116.0	121.1	118.2	104.6	116.8	128.0	128.0	136.4
①株高 ③第二期	107.0	77.4	101.4	99.8	102.6	105.0	111.6	114.4	129.8	126.8	132.8
④有效分蘖 ②第一期	14.5		9.0	12.0	7.0	13.0	12.0	11.2	13.4	15.0	16.0
④有效分蘖 ③第二期	14.0	11.4	8.2	10.0	6.8	14.2	11.5	8.8	12.8	12.8	13.0
⑤葉色	Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	D Gn	L Gn	Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.54	2.08	3.48	2.28	2.02	2.16	2.60	3.46	2.84	2.84	4.04
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	R S	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	R P	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	B P	W	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	○	×	×	○	○	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	L G d	L G d	Y S	Y S	Y S	Y S	L G d	W S	Y S
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病	R_1	R_1	$S_{8.5}$	S_8	S_3	S_8	R_1S_1	R_2M_1	R_3	S_2M_1	R_1
⑮葉稻熱病	4	5						4	5		
⑯穗頸稻熱病	20	80						100	100		
⑰紋枯病 ⑱被害率%	19.8	68.8	22.0	33.9	37.1	31.6	27.6	30.1	30.9	23.2	12.9
⑰紋枯病 ⑲被害度%	8.2	59.3	16.7	31.9	32.6	11.0	0.9	29.7	13.1	10.5	1.9
⑳倒伏性	|	|	／	／	|	／	／	|	／	／	／
㉑耐旱性	—	+	±	d	—	±	╫	±	╫	d	+
㉒耐肥性	C		C	B	A	△	D	D	B	B	D
㉓脫粒性	11.9	17.6	32.7	21.2	2.9	15.7	9.2	∠1	7.7	6.5	17.3
㉔出穗期 ②第一期	6.17		6.18	6.11	6.21	6.13	6.5	6.12	6.11	6.19	6.10
㉔出穗期 ㉕中間作											
㉔出穗期 ③第二期	10.9	10.6	10.13	10.6	10.7	10.9	10.4	10.7	10.4	10.14	10.4
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀	2.20	2.18	2.00	2.24	2.67	2.24	2.65	2.07	2.67	2.70	2.45
㉗胚乳性質	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl
㉘備考											

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	5103	5108	5109	5110	5122	5123	5124	5128	5133	5134
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	122.0	134.0	135.0	130.0	114.0	127.0	134.0	114.0	43.2	130.0
①株高 ③第二期	105.6	124.2	128.0	119.4	109.4	103.8	110.8	103.2	93.2	112.8
④有效分蘖 ②第一期	12.0	8.5	11.0	13.0	12.1	10.0	10.0	12.4	10.4	13.0
④有效分蘖 ③第二期	13.4	9.8	10.6	12.8	11.6	10.0	10.8	10.8	7.8	12.8
⑤葉色	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	P	P	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.72	3.62	3.68	3.56	2.40	2.32	3.16	2.06	3.62	3.42
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	B P	W	B P	B P	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	B P	L Gn	B P	R P	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×
⑬稃色	Y S	B F	Y S	Y S	Y S	B F	Y S	L G d	L G d	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	M_1	R_2M_1	R_1S_1	S_2M_2	R_1S_1	R_1	S_1	M_1	S_1	S_4
⑮葉稻熱病	5	5				5		5		
⑯穗頸稻熱病	0	100				20		100		
⑰紋枯病 ⑱被害率%	39.2	14.8	14.9	38.6	18.1	21.8	28.9	29.6	24.1	16.4
⑰紋枯病 ⑲被害度%	21.0	13.1	13.1	33.1	5.4	4.3	5.0	22.3	10.9	6.9
⑳倒伏性	／	｜	｜	／	／	／	—	—	／	／
㉑耐旱性	d	d	d	d	+	d	d	d	+	d
㉒耐肥性	C	A	C	C	C	C	B	C		D
㉓脫粒性	8.1	17.1	5.4	3.9	9.2	15.5	3.2	9.7	24.3	3.5
㉔出穗期 ②第一期	6.21	6.27	6.20	6.18	6.12	6.9	6.21	6.17	7.6	6.23
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.17	10.23	10.22	10.4	10.9	10.12	10.19	10.16	10.16	10.15
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.83	2.61	2.86	2.83	2.73	2.71	2.90	2.70	19.9	2.92
㉗胚乳性質	g l	g l	g l	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	5139	5142	5143	5144	5145	5146	5147	5148	5149	5150	5151	5152	5153
①株高 ②第一期	130.0	116.0	126.8	109.2	129.8	138.0	131.2	125.2	126.2	104.1	127.9	126.4	129.4
①株高 ③第二期	127.4	100.6	110.0	108.6	107.8	114.8	110.8	119.0	110.0	111.0	111.0	103.6	127.1
④有效分蘖 ②第一期	14.0	11.0	13.0	14.4	13.4	14.2	13.2	12.8	12.8	12.2	10.0	11.6	10.6
④有效分蘖 ③第二期	13.4	9.4	11.0	12.4	10.8	11.5	11.6	10.8	11.8	11.4	12.3	11.6	9.8
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	L Gn	Gn	P	P	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.66	2.32	3.10	3.90	3.80	4.76	3.94	2.60	3.40	4.10	4.34	4.90	4.30
⑧芒	—	—	R S	R S	—	R S	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	P	W	W	W	W	P	P	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	W S	Y S	W S	Y S	W S	L G d	W S	Y S	Y S	WS	YS
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_1	R_1	R_2	S_2	R_1S_1	M_2	R_1	R_1	R_1	0	S_7	0	R_1S_1
⑮葉稻熱病		4	5		4	5	5	5	5	5			
⑯穗頸稻熱病		100	20		80	0	100	100	0	100			
⑰紋枯病 ⑱被害率%	21.0	26.7	40.2	39.3	37.4	27.2	41.8	25.9	30.8	32.4	11.7	19.8	36.2
⑰紋枯病 ⑲被害度%	7.8	4.1	18.4	23.5	7.4	11.1	30.6	8.8	26.3	9.2	1.5	12.8	5.1
⑳倒伏性	／	／	—	／	／	／	／	／	—	／	｜	—	—
㉑耐旱性	d	d	╫	d	d	d	d	+	d	d	+	d	d
㉒耐肥性	D		D	△	D	△	D		△	D	B	D	D
㉓脫粒性	7.1	17.6	2.6	4.6	4.7	2.9	3.0	10.5	3.5	4.4	15.7	2.7	2.8
㉔出穗期 ②第一期	6.24	6.10	6.21	6.21	6.16	6.22	6.20	6.13	6.21	6.13	6.25	6.22	6.20
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.16	10.11	10.16	10.14	10.9	10.18	10.21	10.8	10.15	10.20	10.18	10.19	10.21
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.91	2.83	2.85	2.87	2.71	2.85	2.87	2.73	2.70	2.79	2.01	2.97	2.64
㉗胚乳性質	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	g l	g l
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items		5201	5202	5207	5209	5212	5213	5217	5219	5223	5225
一、形態的特性											
①株　高	②第一期								122.2		
	③第二期	92.2	99.8	121.2	114.8	127.2	126.4	130.6	118.0	117.0	130.2
④有效分蘗	②第一期								14.4		
	③第二期	11.4	12.4	10.5	8.8	15.6	7.6	8.8	11.4	10.2	8.2
⑤葉　色		L Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖　基　色		P	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn
⑦穗　重（g）		2.72	2.74	3.94	2.98	2.68	3.94	3.89	2.38	3.64	3.72
⑧　芒		—	—	—	—	—	—	—	R S	—	—
⑨柱　頭　色		W	W	W	W	W	W	W	B P	W	W
⑩稃尖色	⑪未　熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn
	⑫已　熟	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×
⑬稃　色		Y S	B F	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	B F	B F	B F
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		R_2S_1	M_3S_1	M_1	S_4	S_7	S_7	R_1M_1	M_2S_2	M_1	R_3
⑮葉稻熱病				3				5	5	4	5
⑯穗頸稻熱病								100	100		
⑰紋枯病	⑱被害率%	22.0	20.0	28.9	20.9	22.8	24.3	22.3	14.9	29.6	26.8
	⑲被害度%	10.9	3.7	19.8	11.0	10.4	9.8	16.0	5.9	19.0	8.5
⑳倒　伏　性		／	／	／	／	／	／	／	—	—	—
㉑耐　旱　性		d	±	—	d	d	±	╫	d	d	d
㉒耐　肥　性											
㉓脫　粒　性		11.0	7.3	9.2	3.2	14.9	24.8	5.1	5.0	7.2	3.7
㉔出穗期	②第一期								6.19		
	㉕中間作										
	③第二期	10.8	10.18	10.18	10.24	10.22	10.30	10.20	10.16	10.17	10.14
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		2.59	2.82	2.13	2.68	2.48	2.09	2.93	2.86	2.94	2.96
㉗胚乳性質		gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl
㉘備　考											

調查項目 Items		5227	5228	5231	5232	5238	5241	5242	5246	5251	5253	5254	5255	5257
一、形態的特性														
①株　高	②第一期													
	③第二期	133.4	120.8	121.6	113.0	120.4	113.4	129.4	115.4	123.8	130.8	125.6	109.8	131.6
④有效分蘗	②第一期													
	③第二期	15.0	10.2	9.0	10.8	9.6	14.2	15.1	12.0	14.6	14.2	13.0	16.2	12.8
⑤葉　色		L Gn	L Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖　基　色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗　重（g）		3.30	3.28	3.42	3.98	3.24	3.46	3.62	3.38	3.28	3.12	3.52	2.28	2.46
⑧　芒		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱　頭　色		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色	⑪未　熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
	⑫已　熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃　色		Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	B F	B F	B F	Y S	B F	B F	Y S	B F
二、生理的特性														
⑭幼苗稻熱病		R_1	M_1	R_1	S_1	R_1	R_1	S_2R_1	R_1	R_3	R_2M_1	R_1	R_1M_1	R_1M_2
⑮葉稻熱病		4		4			3		4	5	3	3		
⑯穗頸稻熱病							0			10				
⑰紋枯病	⑱被害率%	30.9	19.9	21.2	23.4	10.1	20.0	14.0	15.2	20.5	7.8	12.1	16.0	3.6
	⑲被害度%	15.8	1.6	15.4	5.9	2.0	10.8	12.8	15.0	10.5	2.2	8.1	1.4	0.9
⑳倒　伏　性		／	／	／	／	—	—	—	—	—	／	／	—	—
㉑耐　旱　性		＋	—	＋	—	d	╫	＋	d	d	d	╫	d	d
㉒耐　肥　性														
㉓脫　粒　性		9.1	11.0	21.6	7.1	20.4	8.7	12.7	8.9	10.4	7.1	5.7	17.5	24.2
㉔出穗期	②第一期													
	㉕中間作													
	③第二期	10.22	10.24	10.14	10.18	10.22	10.17	10.22	10.15	10.20	10.17	10.15	10.19	10.23
三、穀粒的特性														
㉖穀粒形狀		2.91	2.64	2.10	2.09	2.95	3.37	2.56	2.84	2.63	2.84	2.75	2.45	2.80
㉗胚乳性質		gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl
㉘備　考														

調査項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	5259	5260	5261	5263	5264	5265	5266	5267		
一、形態的特性										
①株高 ②第一期										
①株高 ③第二期	138.2	136.2	118.6	113.6	114.8	106.8	117.8	111.2		
④有效分蘖 ②第一期										
④有效分蘖 ③第二期	7.8	9.4	6.6	10.4	14.8	15.4	11.2	19.8		
⑤葉色	L Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn		
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn		
⑦穗重（g）	3.54	4.09	5.76	2.46	3.44	2.42	3.56	3.36		
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—		
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W		
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn		
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×		
⑬稃色	B F	Y S	Y S	L G d	Y S	Y S	Y S	Y S		
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_4	R_1	R_1M_1	R_3	R_1	R_1	R_2	R_1		
⑮葉稻熱病	5	4	4	5		5		4		
⑯穗頸稻熱病	100			0				100		
⑰紋枯病 ⑱被害率%	23.1	23.4	32.7	9.2	15.8	16.7	40.6	19.5		
⑰紋枯病 ⑲被害度%	4.8	7.0	17.8	5.1	10.9	13.1	1.9	3.5		
⑳倒伏性	／	|	—	—	—	|	—	／		
㉑耐旱性	d	±	±	d	d	d	d	卄		
㉒耐肥性										
㉓脫粒性	18.1	25.1	10.0	9.8	29.2	24.8	16.8	6.6		
㉔出穗期 ②第一期										
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.17	10.23	10.21	10.19	10.23	10.20	10.24	10.20		
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.74	2.14	2.08	2.67	2.79	2.61	2.77	2.61		
㉗胚乳性質	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl		
㉘備考										

調査項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	5301	5302	5303	5304	5305	5306	5307	5308	5309	5310
一、形態的特性										
①株高 ②第一期		102.6	85.0	107.2	111.0	115.0	116.0	103.4	103.8	105.2
①株高 ③第二期	72.8	89.0	83.6	107.2	92.0	113.6	112.9	96.9	75.4	98.5
④有效分蘖 ②第一期		12.6	9.4	7.6	11.3	7.4	10.6	12.7	8.0	13.2
④有效分蘖 ③第二期	12.0	10.6	10.1	7.6	11.8	7.6	11.4	13.2	7.0	11.8
⑤葉色	L Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	1.50	2.30	3.52	4.44	1.70	4.38	2.96	2.62	4.88	3.64
⑧芒	R S	R S	R S	F S	—	F L	F L	F L	F L	P L
⑨柱頭色	W	W	W	W	B P	W	W	W	W	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	R P	R P	L Gn	L Gn	B P	R P	L Gn	L Gn	R P	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	×	×	○	○	○	×	×	○
⑬稃色	G	Y S	Y S	Y S	Y S	L G d	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_6	$S_{8\cdot5}$		M_1	$S_{8\cdot3}$	S_8	$S_{8\cdot5}$	S_7	S_8	S_8
⑮葉稻熱病				3						
⑯穗頸稻熱病				100						
⑰紋枯病 ⑱被害率%	40.2		40.2	46.7		46.7	50.3	38.0	46.2	39.5
⑰紋枯病 ⑲被害度%	36.4		34.5	37.4		38.1	44.1	23.9	36.9	34.5
⑳倒伏性	|	|	／	／	／	／	／	／	／	／
㉑耐旱性	卄	卄	±	±	+	±	+	—	+	+
㉒耐肥性	△	C	C	C	B	D	D	D	D	D
㉓脫粒性	∠1	10.4	∠1	11.3	∠1	∠1	∠1	∠1	∠1	19.7
㉔出穗期 ②第一期		6.25	6.4	6.10	6.2	6.10	6.25	6.21	6.8	6.14
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	9.26	10.2	9.29	10.6	9.24	10.10	10.27	10.28	10.13	9.29
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.31	2.27	1.96	2.41	2.00	2.04	2.41	2.14	2.19	2.03
㉗胚乳性質	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl
㉘備考										

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	5311	5313	5314	5315	5316	5319	5320	5321	5322	5323	5324	5325	5326	5327	5328
一、形態的特性															
①株高 ②第一期	102.6	99.6	99.8	99.8	87.4	88.8	83.4	108.6	125.6	111.0	113.2	99.2	94.0	103.4	93.0
①株高 ③第二期	96.2	94.8	84.5	79.2	73.1	85.1	82.6	109.4	119.4	94.6	97.0	93.9	73.0	96.9	96.3
④有效分蘗 ②第一期	8.2	9.8	7.6	15.4	12.2	9.8	11.0	11.4	6.0	12.8	8.9	10.6	9.8	11.8	11.0
④有效分蘗 ③第二期	9.6	9.8	8.9	14.4	10.5	8.4	8.4	10.2	6.4	10.4	9.4	9.1	8.2	11.5	12.3
⑤葉色	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Cn	Gn	D Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.18	3.66	3.92	3.94	2.22	3.54	2.60	4.58	2.34	3.24	3.94	1.90	2.82	2.26	2.90
⑧芒	—	F L	—	—	—	F L	R S	—	F L	F L	F L	—	—	—	—
⑨柱頭色	R P	W	B P	B P	W	B P	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	B P	L Gn	B P	B P	R P	B P	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	×
⑬稃色	L Gd	Y S	Y S	Y S	L Gd	B F	Y S	Y S	Y S	B F	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性															
⑭幼苗稻熱病	S_4	S_8		S_8	$S_{8\cdot5}$	S_8	S_8	$S_{8\cdot5}$	$S_{8\cdot5}$	$S_{8\cdot5}$	M_4S_1	R_1	S_3	S_7	S_6
⑮葉稻熱病												3			
⑯穗頸稻熱病												5			
⑰紋枯病 ⑱被害率%	44.1	50.5		45.2		51.9	46.6	27.9	67.9	44.7	46.8		42.3	46.1	
⑰紋枯病 ⑲被害度%	42.9	43.1		39.6		37.8	36.8	14.5	60.3	38.2	19.8		38.5	36.7	
⑳倒伏性	／	／	／	／	／	／	／	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜
㉑耐旱性	+	+	+	±	+	±	+	⧺	+	±	±	—	+	+	+
㉒耐肥性	D	D		C		△	C	C	C	C	C	C	D	D	△
㉓脫粒性	18.2	∠1	10.2	8.6	∠1	10.2	6	8.8	∠1	9.3	2.0	11.8	2.0	8.9	∠1
㉔出穗期 ②第一期	6.11	6.24	6.18	6.19	6.3	6.2	6.8	6.30	6.21	6.30	6.15	6.7	6.8	6.15	6.8
㉔出穗期 ㉕中間作															
㉔出穗期 ③第二期	10.6	10.14	10.13	10.12	9.23	10.2	9.24	10.17	10.15	10.15	10.9	9.24	9.26	10.9	9.27
三、穀粒的特性															
㉖穀粒形狀	2.11	1.87	2.05	2.20	2.27	2.13	2.24	2.10	2.35	2.07	2.26	2.11	2.20	2.24	2.23
㉗胚乳性質	gl	gl	Gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl
㉘備考															

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	5331	5332	5333	5334	5335	5336	5337	5338	5339	5340
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	109.2	97.0	99.4	99.8	118.6	112.2	102.4	111.4	117.0	97.8
①株高 ③第二期	92.5	91.0	88.4	87.6	101.5	94.8	95.0	98.4	99.6	88.8
④有效分蘖 ②第一期	11.4	9.6	11.2	11.4	9.6	10.2	9.8	10.8	9.0	11.0
④有效分蘖 ③第二期	9.8	9.4	8.8	9.6	9.4	9.0	9.2	9.8	8.0	9.4
⑤葉色	D Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn	D Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.08	3.06	5.24	4.64	3.54	3.90	3.82	3.72	4.02	3.34
⑧芒	R S	F L	F M	F M	R M	R M	F L	F S	R M	R M
⑨柱頭色	B P	W	W	W	W	W	B P	W	W	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	B P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	B P	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×
⑬稃色	Y S	D P	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	M_4	S_8	R_1	R_3M_1	S_1	R_1	S_8	S_3	R_2M_2	S_4
⑮葉稻熱病			3	3		3			3	
⑯穗頸稻熱病			80	80		80			80	
⑰紋枯病 ⑱被害率%		56.1	47.5	61.6	31.7		44.8	42.4		72.4
⑰紋枯病 ⑲被害度%		47.0	43.9	40.5	21.5		39.5	35.0		29.1
⑳倒伏性	|	|	|	|	—	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	—	±	+	±	—	±	—	+	—	±
㉒耐肥性	C	C	C	B	D	B	C	D	C	C
㉓脫粒性	12.9	∠1	3.2	4.3	3.9	6.7	∠1	5.4	7.0	2.4
㉔出穗期 ②第一期	6.3	6.8	6.11	6.13	6.15	6.13	6.7	6.14	6.14	6.7
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.1	10.3	10.7	10.1	10.9	10.12	10.8	10.9	10.10	10.5
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.36	2.02	2.08	3.19	2.30	2.26	2.14	2.55	2.29	2.16
㉗胚乳性質	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	5341	5342
一、形態的特性		
①株高 ②第一期	108.8	102.4
①株高 ③第二期	92.4	89.5
④有效分蘖 ②第一期	8.4	9.2
④有效分蘖 ③第二期	6.6	7.8
⑤葉色	Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn
⑦穗重（g）	5.80	3.46
⑧芒	P S	—
⑨柱頭色	W	P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×
⑬稃色	Y S	Y S
二、生理的特性		
⑭幼苗稻熱病	S_7	S_6
⑮葉稻熱病		
⑯穗頸稻熱病		
⑰紋枯病 ⑱被害率%		73.8
⑰紋枯病 ⑲被害度%		41.2
⑳倒伏性	—	±
㉑耐旱性		
㉒耐肥性	C	C
㉓脫粒性	2.7	1.7
㉔出穗期 ②第一期	6.13	6.9
㉔出穗期 ㉕中間作		
㉔出穗期 ③第二期	10.2	10.3
三、穀粒的特性		
㉖穀粒形狀	3.10	2.56
㉗胚乳性質	gl	gl
㉘備考		

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	5401	5501	5502	5503	5504	5505	5506	5507	5508	5509
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	107.2	102.2	103.0	107.6	113.8	117.6	102.0	105.6	103.2	113.4
①株高 ③第二期	95.4	93.2	94.8	95.1	102.0	94.2	91.8	93.6	96.4	94.4
④有效分蘗 ②第一期	10.1	10.4	8.8	8.4	10.2	7.2	9.2	9.4	13.0	8.6
④有效分蘗 ③第二期	9.8	9.8	7.4	9.1	8.0	8.2	8.6	8.6	11.2	7.4
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.76	3.92	3.30	3.72	3.96	3.34	3.46	5.10	3.62	3.38
⑧芒	—	—	FL	FL	—	—	RS	RL	FL	FL
⑨柱頭色	W	W	W	W	RP	RP	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	RP	RP	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
⑬稃色	YS	YS	YS	YS	YS	YS	LGd	BF	YS	YS
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_1	$S_{8\cdot5}$	$S_{8\cdot5}$	$S_{8\cdot8}$	$S_{8\cdot3}$	$S_{8\cdot3}$	R_1M_1	R_1	S_5	S_3
⑮葉稻熱病							3	4		
⑯穗頸稻熱病							50	100		
⑰紋枯病 ⑱被害率%	22.8	38.5	49.2	59.1	51.6	60.1	41.1	45.6	69.2	53.2
⑰紋枯病 ⑲被害度%	8.2	13.4	44.7	57.7	44.9	56.4	38.2	39.0	60.5	44.1
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|
㉑耐旱性	±	+	+	+	++	+	+	+	±	−
㉒耐肥性	C	D	C	D	D	D	D	△	△	△
㉓脫粒性	8.5	6.6	14.0	∠1	12.1	8.9	7.5	∠1	6.6	6.5
㉔出穗期 ②第一期	6.20	6.21	6.21	6.19	6.16	6.16	6.5	6.15	6.16	6.18
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.12	10.21	10.16	10.12	10.10	10.9	10.1	10.6	10.10	10.14
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.34	2.14	1.96	2.19	2.11	2.15	2.11	2.22	2.02	2.03
㉗胚乳性質	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl
㉘備考										

調查項目 Items	5511	5512	5513	5514	5515	5516	5517	5518	5519	5520	5522	5523	5524
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	116.4	105.8	106.0	112.4	105.6	102.8	113.2	118.0	98.4	103.8	118.6	115.6	120.4
①株高 ③第二期	98.0	96.3	93.3	97.8	96.0	89.0	91.8	106.8	78.0	89.8	118.4	100.6	108.2
④有效分蘗 ②第一期	8.2	9.8	11.2	11.0	9.6	7.8	10.3	10.4	9.9	12.0	11.0	13.6	10.8
④有效分蘗 ③第二期	10.2	10.3	10.6	9.6	9.4	8.8	10.8	9.8	10.5	13.6	10.7	11.6	8.2
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	4.54	4.10	3.50	3.63	3.78	4.42	3.53	3.48	3.64	2.96	4.04	3.80	4.92
⑧芒	—	—	—	—	—	RL	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	RP	W	W	W	W	W	W	BP	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	RP	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	P	RP	L Gn	RP	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○
⑬稃色	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	$S_{8\cdot5}$	S_8	$S_{8\cdot5}$	$S_{8\cdot5}$	$S_{8\cdot3}$	S_7	$S_{8\cdot5}$	$S_{6\cdot3}$	S_6	S_4	$S_{8\cdot6}$	S_2	$S_{8\cdot3}$
⑮葉稻熱病													
⑯穗頸稻熱病													
⑰紋枯病 ⑱被害率%	70.2	53.3	62.7	42.4	54.4	53.6	67.2	47.7	48.9	47.6	28.5	29.5	19.3
⑰紋枯病 ⑲被害度%	67.9	42.6	55.4	41.8	45.6	42.1	55.8	43.4	40.1	40.2	15.5	6.4	17.5
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	/	|
㉑耐旱性	+	−	±	+	−	+	±	+	+	+	+	±	+
㉒耐肥性	D	△	D	△	C	C	C	C	D	△	△	E	D
㉓脫粒性	11.9	15.1	7.4	∠1	12.7	11.8	18.3	1.1	8.8	22.3	15.9	2.6	6.1
㉔出穗期 ②第一期	6.13	6.20	6.20	6.10	6.14	6.12	6.16	6.19	6.1	6.13	6.23	6.20	6.17
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.15	10.11	10.16	10.9	10.11	10.9	10.9	10.15	9.24	10.8	10.17	10.17	10.14
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.04	2.21	2.03	2.02	2.04	2.13	2.17	2.10	2.02	2.04	2.01	2.15	2.16
㉗胚乳性質	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl
㉘備考													

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number		5526	5527	5601	5602	5603	5606				
一、形態的特性											
①株高	②第一期	116.8	120.4	113.6	122.8	117.6	125.8				
	③第二期	109.6	107.4	101.8	103.8	101.0	116.9				
④有效分蘗	②第一期	11.0	12.0	12.4	10.6	11.4	12.4				
	③第二期	11.2	11.2	10.0	10.6	9.8	10.8				
⑤葉色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn				
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn				
⑦穗重（g）		4.14	3.72	3.40	3.32	4.76	4.20				
⑧芒		—	—	—	—	—	F L				
⑨柱頭色		W	W	W	B P	W	W				
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	P	L Gn	B P	L Gn	L Gn				
	⑫已熟	○	○	○	○	○	×				
⑬稃色		Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S				
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		S_8	S_8	$S_{8\cdot8}$	$S_{8\cdot5}$	$S_{8\cdot5}$	R_1S_1				
⑮葉稻熱病											
⑯穗頸稻熱病											
⑰紋枯病	⑱被害率%	37.0	14.9	31.8	28.9	59.9	47.7				
	⑲被害度%	34.1	9.8	11.1	15.7	51.7	41.6				
⑳倒伏性		|	|	|	|	|	／				
㉑耐旱性		+	+	+	—	±	+				
㉒耐肥性		△	△	D	△	D	△				
㉓脫粒性		14.5	7.2	10.6	10.2	11.7	5.2				
㉔出穗期	②第一期	6.24	6.18	6.26	6.24	6.24	6.18				
	㉕中間作										
	③第二期	10.17	10.18	10.18	10.18	10.16	10.14				
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		2.03	2.11	2.23	2.65	2.39	1.97				
㉗胚乳性質		gl	gl	gl	gl	gl	gl				
㉘備考											

調查項目 Items \ 品種代號 Variety Number		5801	5803	5804	5805	5807	5808	5809	5810	5811	5814
一、形態的特性											
①株高	②第一期		128.1	111.8	139.4	113.8	129.8	115.5	129.0	131.2	
	③第二期	82.4	102.6	108.0	124.7	98.6	108.2	99.8	124.3	111.0	83.6
④有效分蘗	②第一期		8.9	9.4	7.2	7.4	7.4	7.8	5.6	7.0	
	③第二期	10.0	9.2	10.8	7.4	7.4	8.4	7.4	6.0	6.6	12.6
⑤葉色		L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	D Gn	Gn	Gn	D Gn	Gn	Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）		2.10	4.06	2.78	3.34	2.82	3.86	2.76	4.62	3.02	3.98
⑧芒		—	F L	F L	F L	F M	F L	F L	R S	F L	—
⑨柱頭色		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	B P	B P	B P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	B P	B P
	⑫已熟	×	○	○	○	×	×	○	×	○	○
⑬稃色		Y S	Y S	Y S	R B	Y S	L G d	Y S	Y S	R B	R B
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		R_1	R_2S_2	S_2	$S_{8\cdot5}$	S_3	S_8	R_1	S_7	S_8	M_1
⑮葉稻熱病								3			3
⑯穗頸稻熱病								90			60
⑰紋枯病	⑱被害率%	25.2	36.2	16.5	17.8	24.6	18.7	20.6	14.7	18.5	22.5
	⑲被害度%	22.9	31.1	8.8	1.3	23.9	12.8	17.1	3.9	1.0	3.0
⑳倒伏性			|	|	|	／	|	—	／	|	|
㉑耐旱性		⧺	±	±	±	—	—	±	+	+	—
㉒耐肥性			△	B	B		C	C	C	C	D
㉓脫粒性		8.2	∠1	∠1	∠1	2.1	3.1	1.4	∠1	2.0	10.6
㉔出穗期	②第一期		6.20	6.19	6.17	6.10	6.13	6.15	6.17	6.21	6.10
	㉕中間作										
	③第二期	10.5	10.12	10.14	10.12	10.8	10.6	10.8	10.7	10.12	10.7
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		2.62	2.18	2.28	2.33	2.47	2.48	2.49	2.07	2.28	2.97
㉗胚乳性質		gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl
㉘備考											

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	5815	5816	5817	5819	5820	5821	5822	5823	5824	5825	5828
一、形態的特性											
①株高 ②第一期	107.8							104.8	123.6		120.1
①株高 ③第二期	97.2	104.4	90.2	97.8	100.0	106.0	124.2	98.2	116.0	100.2	109.4
④有效分蘖 ②第一期	12.0							12.0	9.4		5.2
④有效分蘖 ③第二期	9.6	7.6	8.6	7.2	7.4	8.2	6.8	11.8	7.8	7.6	5.1
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.26	2.94	2.46	2.30	3.70	2.70	5.56	2.64	3.66	3.78	3.58
⑧芒	—	F L	F L	F L	F L	F M	F L	—	F L	R S	F L
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	P	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	L Gn	B P	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	L G d	Y S	Y S	R B	Y S	B F	W S	B F
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病	R S_5	S_5	M, S_1	R_1	$R_6 S_1$	M_3	R_1	S_4	$S_{3\cdot5}$	$M_1 R_1$	S_3
⑮葉稻熱病				3	2	3	3			3	
⑯穗頸稻熱病				80	0	20	0			60	
⑰紋枯病 ⑱被害率%	25.8	22.1	19.1	52.0	31.9		19.1	12.2	21.6	27.1	
⑰紋枯病 ⑲被害度%	5.0	18.2	10.8	46.7	24.2		16.3	10.4	7.1	20.3	
⑳倒伏性	|	／	|	／	／	／	／	／	／	／	|
㉑耐旱性	±	+	—	±	+	d	—	±	±	±	+
㉒耐肥性	C							C	C		C
㉓脫粒性	13.5	1.3	∠1	17.4	10.8	16.2	7.2	12.6	∠1	∠1	∠1
㉔出穗期 ②第一期	6.18							6.11	6.16		6.20
㉔出穗期 ㉕中間作											
㉔出穗期 ③第二期	10.14	10.16	10.3	10.2	10.3	10.8	10.9	10.15	10.9	10.6	10.19
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀	2.11	2.36	2.67	2.14	2.21	2.56	2.55	2.15	2.15	2.56	2.06
㉗胚乳性質	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl
㉘備考											

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	8001	8002								
一、形態的特性										
①株　高 ②第一期	137.0	135.2								
①株　高 ③第二期	136.8	134.8								
④有效分蘖 ②第一期	16.2	12.5								
④有效分蘖 ③第二期	14.6	10.4								
⑤葉　色	Gn	Gn								
⑥莖　基　色	Gn	Gn								
⑦穗　重（g）	3.24	3.94								
⑧　芒	—	—								
⑨柱　頭　色	W	W								
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn								
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×								
⑬稃　色	Y S	W S								
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病										
⑮葉稻熱病										
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒　伏　性	丨	—								
㉑耐　旱　性	‡	+								
㉒耐　肥　性	Λ									
㉓脫　粒　性	15.3	17.8								
㉔出穗期 ②第一期	6.11	6.17								
㉔出穗期 ㉕中間作	9.16	10.24								
㉔出穗期 ③第二期										
三、穀粒的特性										
㉖穀　粒　形　狀	2.50	2.44								
㉗胚　乳　性　質	Gl	Gl								
㉘備　考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	8101									
一、形態的特性										
①株　高 ②第一期	94.6									
①株　高 ③第二期	97.6									
④有效分蘖 ②第一期	15.8									
④有效分蘖 ③第二期	16.8									
⑤葉　色	Gn									
⑥莖　基　色	Gn									
⑦穗　重（g）	4.10									
⑧　芒	F L									
⑨柱　頭　色	W									
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn									
⑩稃尖色 ⑫已熟	○									
⑬稃　色	Y S									
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	$S_{8\cdot5}$									
⑮葉稻熱病										
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒　伏　性	丨									
㉑耐　旱　性	—									
㉒耐　肥　性										
㉓脫　粒　性	3.9									
㉔出穗期 ②第一期	6.24									
㉔出穗期 ㉕中間作	8.23									
㉔出穗期 ③第二期										
三、穀粒的特性										
㉖穀　粒　形　狀	2.38									
㉗胚　乳　性　質	Gl									
⑳備　考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	8201	8202	8203	8204	8205	8206	8207	8208	8209	8210
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	123.5	108.6	113.6	115.4	135.4	124.7	137.3	129.1	116.4	114.3
①株高 ③第二期	112.6	108.0	112.8	111.2	125.4	117.0	132.0	126.8	109.4	105.6
④有效分蘗 ②第一期	24.0	26.8	21.2	21.7	11.0	17.2	18.2	8.8	18.4	19.4
④有效分蘗 ③第二期	22.8	26.4	20.2	25.6	11.8	18.7	19.5	9.6	17.2	15.9
⑤葉色	D Gn	D Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	1.46	1.78	1.90	2.46	2.78	3.10	2.52	2.24	2.72	3.12
⑧芒	—	—	—	—	—	—	F L	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	L G d	Y S	L G d	L G d	W S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	0	$M_2S_3R_2$	S_2M_1	0	S_4	R_2S_1	0	S_1	M_1	0
⑮葉稻熱病										4
⑯穗頸稻熱病										0
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	|	—	|	／	—	|	|	／	—	／
㉑耐旱性	+	++	++	+	d	d	++	d	d	d
㉒耐肥性	A	C	C	△	△	△	D	B	C	C
㉓脫粒性	9.67	14.7	9.5	11.5	9.4	6.66	16.2	2.41	14.7	12.3
㉔出穗期 ②第一期	7.14	6.18	6.18	7.15					6.12	
㉔出穗期 ㉕中間作	9.5	8.10	8.11	9.12	9.25	9.17	9.17	9.26	8.7	9.10
㉔出穗期 ③第二期	10.15			10.17	10.10	10.14	10.12	10.12		10.10
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.20	2.57	2.64	2.01	2.52	2.21	3.13	2.41	2.75	2.14
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	8211	8212	8213	8214	8215	8216	8217	8218	8219	8220	8221	8222	8223
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	108.3	120.0	113.2	130.0	129.6		146.5	115.4	123.4			149.0	125.9
①株高 ③第二期	132.2	102.0	94.0	123.6	125.2	128.2	124.4	100.8	113.5	126.6	141.4	137.2	126.0
④有效分蘗 ②第一期	19.2	18.1	14.9	16.2	19.2		18.2	23.7	12.4			28.5	17.7
④有效分蘗 ③第二期	18.0	14.0	13.1	14.3	19.4	11.6	15.4	22.4	11.4	11.6	19.4	23.2	14.8
⑤葉色	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	D Gn	D Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.12	6.52	2.28	2.16	2.06	3.22	4.18	3.44	2.00	3.86	3.44	3.32	2.68
⑧芒	—	F L	—	—	F L	P L	—	F L	—	RM	—	F L	—
⑨柱頭色	W	W	W	B P	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	B P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	W S	Y S	L G d	L G d	W S	W S	W S	L G d	L G d	Y S	L G d	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_2	M_2	0	S_1M_1	R_1	0	R_1	R_1	S_2	R_4	0	R_1	R_1
⑮葉稻熱病						2	2			4	4		5
⑯穗頸稻熱病													
⑰紋枯病 ⑱被害率%													
⑰紋枯病 ⑲被害度%													
⑳倒伏性	／	—	—	／	—	—	—	／	|	／	／	—	—
㉑耐旱性	d	—	d	d	d	d	d	d	+	d	++	++	d
㉒耐肥性	B	C	C	C	C	B	C	C		B	B	△	B
㉓脫粒性	15.6	3.8	2.2	4.6	11.6	5.6	27.7	10.8	14.0	25.8	5.8	3.9	3.7
㉔出穗期 ②第一期		6.14	6.12	6.21					6.23			6.20	
㉔出穗期 ㉕中間作	9.23	8.15	8.7	8.16	9.25		9.20	9.11	8.25	10.12	10.5	10.5	9.23
㉔出穗期 ③第二期	10.14				10.11	10.1	10.13	10.14					10.21
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	3.06	2.35	2.74	2.90	2.29	2.63	2.74	3.03	2.01	4.05	2.85	2.36	2.65
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	8224	8225	8226	8227	8228	8229	8230	8131	8232	8233
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	140.0	125.2		121.1	142.3	126.2	122.0	127.8	106.7	130.5
①株高 ③第二期	138.5	124.4	127.4	111.1	143.2	126.0	111.0	111.7	119.6	135.7
④有效分蘗 ②第一期	16.2	19.2		15.1	18.0	17.4	21.5	17.4	18.5	19.2
④有效分蘗 ③第二期	14.2	17.2	13.2	16.5	16.2	17.2	16.9	22.0	22.0	18.6
⑤葉色	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.38	2.78	5.34	3.66	4.44	3.44	16.4	1.53	0.5	3.12
⑧芒	—	—	F L	—	—	—	—	RM	RM	F L
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	G	Y S	W S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	L G d
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_1	R_1	S_4	R_1	0	R_1	0	M_2S_1	S_2	R_1
⑮葉稻熱病	4	4			4					5
⑯穗頸稻熱病		100								100
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	—	／	—	—	／	—	／	／	|	|
㉑耐旱性	d	d	±	d	d	d	‡	‡	+	d
㉒耐肥性	C	C	B		B	C	C	△	C	C
㉓脫粒性	1.3	5.7	1.8	5.3	8.5	4.6	9.5	5.1	5.3	2.8
㉔出穗期 ②第一期						6.19	7.6			6.29
㉔出穗期 ㉕中間作	9.27	9.25	10.15	8.27	9.26	8.16	8.25	9.14	9.14	8.30
㉔出穗期 ③第二期	10.16	10.17		10.14	10.18	10.17	10.17	10.18	10.18	
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.68	2.58	2.30	2.75	2.36	2.62	4.06	2.33	3.87	2.45
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

	8234	8235	8236	8237	8238	8239	8240	8241	8242	8243	8244	8245	8246
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	127.8		134.0		93.2					90.6		117.5	89.0
①株高 ③第二期	119.4	136.0	130.0	157.2	95.4	156.0	158.8	116.2	112.8	87.8	128.4	120.5	88.9
④有效分蘗 ②第一期	19.4		15.8		16.8					12.4		25.2	22.0
④有效分蘗 ③第二期	18.6	20.2	14.8	13.8	15.3	9.0	10.0	13.6	18.4	11.9	12.6	23.5	18.0
⑤葉色	Gn	D Gn	Gn	Gn	D Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	P	Gn	P	P
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	2.30	2.68	4.34	5.60	3.40	5.18	5.40	3.94	3.12	2.44	2.70	1.92	1.72
⑧芒	F L	R S	—	P M	—	—	—	R S	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	R P	W	W	P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P	L Gn	P	P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○
⑬稃色	Y S	Y S	L G d	Y S	Y S	B F	L G d	Y S	W S	Y S	W S	L G d	W S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	M_1	R_3M_2	R_1	0	S_7	R_2	S_2R_1						
⑮葉稻熱病	5			4		5							
⑯穗頸稻熱病						40							
⑰紋枯病 ⑱被害率%													
⑰紋枯病 ⑲被害度%													
⑳倒伏性	／	—	|	—	／	—	—	—	／	|	／	／	／
㉑耐旱性	d	d	d	d	+	d	d	d	d	d	d	‡	‡
㉒耐肥性	D	E	△	C	△	C	△	△		C	B	C	C
㉓脫粒性	3.5	3.0	3.1	7.2	8.2	9.7	28.6	7.1	13.4	9.5	5.2	6.3	9.8
㉔出穗期 ②第一期	7.3				6.20					6.21		6.9	6.8
㉔出穗期 ㉕中間作	8.28	10.6	9.5	10.6	8.22	10.4	10.1	10.1	10.30			9.2	9.1
㉔出穗期 ③第二期	10.18		10.18							10.25	11.6		
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.50	2.97	2.40	2.58	2.02	3.04	2.71	2.95	3.37	2.24	2.73	2.89	3.10
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	gl	gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調査項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	8247	8248	8249	8250	8251	8252	8253	8254	8255	8256
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	90.0	101.2	95.8						94.0	
①株高 ③第二期	92.1	105.1	95.3	127.8	118.0	124.0	120.2	130.2	88.0	129.2
④有效分蘗 ②第一期	19.0	25.6	28.2						19.0	
④有効分蘗 ③第二期	16.0	21.6	25.6	19.0	16.6	20.0	16.2	14.4	17.0	15.4
⑤葉色	P	D Gn	L Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	Gn	P	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn
⑦穗重（g）	2.40	2.22	2.28	2.22	2.18	2.22	2.86	2.18	4.50	5.02
⑧芒	—	—	—	—	—	—	—	—	R S	R S
⑨柱頭色	P	W	P	W	W	W	W	W	P	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	P	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
⑬稃色	Y S	Y S	B F	L G d	W S	L G d	Y S	G	B F	B F
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病										
⑮葉稻熱病										
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	—	—	—	—	—	／	／	—	—	—
㉑耐旱性	d	d	d	d	d	卄	d	卄	d	d
㉒耐肥性	D	C	C		B	A	△	△		C
㉓脫粒性	3.8	3.1	2.8	4.5	9.2	16.2	7.7	1.9	2.0	5.2
㉔出穗期 ②第一期	6.7	6.12	6.8						5.30	
㉔出穗期 ㉕中間作	9.2	9.11	9.3	10.27	10.30	10.27	10.28	10.22	9.10	10.2
㉔出穗期 ③第二期										
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.95	3.09	2.64	2.87	2.91	2.87	3.70	3.92	2.88	3.71
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調査項目 Items	8257	8258	8259	8260	8261	8262	8263	8264	8265	8266	8267	8268	8269
一、形態的特性													
①株高 ②第一期		128.0										98.4	95.7
①株高 ③第二期	95.2	125.9	130.4	133.4	130.2	131.4	139.6	126.8	135.2	132.8	111.5	96.0	96.0
④有效分蘗 ②第一期		25.1										22.8	16.6
④有效分蘗 ③第二期	17.2	20.2	14.8	20.8	18.2	19.6	16.2	17.2	14.0	14.0	15.2	18.0	15.0
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	D Gn	L Gn
⑥莖基色	P	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn
⑦穗重（g）	1.28	2.84	1.64	2.10	2.14	2.21	2.34	2.30	2.60	1.22	2.12	1.56	2.28
⑧芒	—	RM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	P	P	W	W	W	W	W	W	W	W	W	P	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	P	P	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	P
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○
⑬稃色	B F	Y S	W S	G	W S	B F	W S	Y S	G	B F	L G d	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病													
⑮葉稻熱病													
⑯穗頸稻熱病													
⑰紋枯病 ⑱被害率%													
⑰紋枯病 ⑲被害度%													
⑳倒伏性	—	—	—	—	／	／	—	—	—	—	—	／	|
㉑耐旱性	d	d	d	d	卄	d	d	d	d	d	+	d	卄
㉒耐肥性	B	B	C	C	D					D			C
㉓脫粒性	7.9	12.5	9.8	6.8	2.81	2.54	2.18	2.10	1.24	3.3	2.5	1.3	1.4
㉔出穗期 ②第一期												6.4	6.8
㉔出穗期 ㉕中間作		9.10	10.20	10.23	10.21	11.10	11.10	11.10	11.8	10.25	11.18	9.4	9.10
㉔出穗期 ③第二期	10.21	10.12											
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.66	2.83	3.38	4.38	3.29	3.10	3.00	3.18	2.99	3.39	3.00	2.51	2.59
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	8270	8271	8272	8273	8274					
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	98.9	94.5	84.5							
①株高 ③第二期	96.8	93.2	84.0	126.8	113.0					
④有效分蘖 ②第一期	18.0	20.2	19.8							
④有效分蘖 ③第二期	19.0	19.2	18.7	14.4	10.2					
⑤葉色	Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn					
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn					
⑦穗重（g）	2.46	2.08	2.32	5.02	4.14					
⑧芒	R S	—	—	—	—					
⑨柱頭色	P	W	W	W	W					
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn					
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×					
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S					
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病										
⑮葉稻熱病										
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	|	/	|	—	—					
㉑耐旱性	d	d	d	±	+					
㉒耐肥性	C	B		B	B					
㉓脫粒性	2.5	0.9	1.2	1.4	3.0					
㉔出穗期 ②第一期	6.7	6.7	6.12							
㉔出穗期 ㉕中間作	9.6	9.10	9.11	10.23	10.25					
㉔出穗期 ③第二期										
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.88	4.27	2.80	2.74	2.57					
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl					
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	8401	8402	8403	8404	8405	8406	8407	8408	8409	8410
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	113.0	110.2	134.0	137.8	127.2	144.5	150.2	124.0	147.8	133.5
①株高 ③第二期	108.3	109.9	131.9	130.8	110.0	135.2	148.3	116.8	140.0	131.5
④有效分蘖 ②第一期	14.4	15.8	10.6	9.2	19.5	17.1	16.0	17.0	9.4	12.4
④有效分蘖 ③第二期	12.3	13.0	8.7	8.5	16.2	19.7	16.2	14.6	7.5	9.1
⑤葉色	L Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	P	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	2.39	2.68	2.06	2.50	35.6	4.02	4.48	3.30	2.16	4.08
⑧芒	—	—	F L	F L	—	—	F L	—	F L	—
⑨柱頭色	W	W	P	P	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	P	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	○	×	×	○	×	○	○
⑬稃色	Y S	L G d	D P	G	Y S	B F	B F	Y S	Y S	W S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	M_1	S_3	R_2	M_4	0	R_1	M_1	S_1	M_3	R_1
⑮葉稻熱病										
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	/	/	|	|	—	—	/	—	|	|
㉑耐旱性	d	d	—	d	d	d	±	卄	—	卄
㉒耐肥性	B	C	△	B	C	B	A	D	C	C
㉓脫粒性	7.6	11.2	∠1	∠1	1.2	8.5	∠1	∠1	1.8	1.4
㉔出穗期 ②第一期	6.17	6.17	6.24	6.22			6.23	6.15	6.30	6.23
㉔出穗期 ㉕中間作	8.18	8.15	8.29	8.27	9.23	9.13	8.29	8.13	8.31	8.20
㉔出穗期 ③第二期					10.20	10.16	10.27			
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.01	2.03	2.49	2.41	2.47	2.56	2.62	2.33	2.07	3.12
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調査項目 Items \ 品種代號 Variety Number		8411	8412	8413	8414	8415	8416	8417	8418	8419	8420
一、形態的特性											
①株　高	②第一期	126.0	112.4	165.6			126.8			103.8	
	③第二期	116.8	105.2	158.1	153.4	154.0	105.2	136.0	152.4	101.7	139.2
④有效分蘗	②第一期	18.9	22.2	19.3			17.8			14.2	
	③第二期	20.4	20.4	18.2	15.4	15.0	16.6	8.4	14.8	13.6	14.0
⑤葉色		L Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）		2.30	1.94	3.22	2.80	3.80	2.04	4.29	2.48	2.94	3.22
⑧芒		—	—	R S	R S	R S	—	F L	—	—	R S
⑨柱頭色		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn
	⑫已熟	×	×	×	×	×	×	○	×	×	Y S
⑬稃色		Y S	L G d	W S	Y S	W S	W S	Y S	G	B F	
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		R_3	0	0	0	0	R_1M_1		R_1	$S_{8\cdot8}$	M_1S_1
⑮葉稻熱病		5	4	2	3	2	4		4		
⑯穗頸稻熱病			100				20				
⑰紋枯病	⑱被害率%										
	⑲被害度%										
⑳倒伏性		—	|	—	—	—	|	|	—	|	—
㉑耐旱性		d	d	d	d	d	d	±	d	—	d
㉒耐肥性		△	C	C	D	C		D	△	D	D
㉓脫粒性		2.9	∠1	3.1	4.3	5.2	8.8	2.4	1.4	4.7	3.1
㉔出穗期	②第一期		6.18	6.20			6.22			6.7	
	㉕中間作	9.20	8.13	10.16	10.17	10.15	8.26	10.4	10.20	8.17	10.12
	③第二期	10.25									
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		3.57	2.80	3.20	3.37	3.33	2.28	2.45	2.84	2.44	2.90
㉗胚乳性質		G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1
㉘備考											

調査項目 Items \ 品種代號 Variety Number		8421	8422	8423	8424	8427	8428	8429	8430	8431	8432	8433	8435	8436
一、形態的特性														
①株　高	②第一期								137.8					131.5
	③第二期	163.2	147.4	169.4	147.6	148.8	133.2	129.8	134.0	147.4	135.1	131.1	158.6	120.6
④有效分蘗	②第一期								13.0		22.2			13.1
	③第二期	15.2	10.2	14.8	15.6	9.9	16.0	21.0	11.8	14.4	18.2	14.8	12.5	11.6
⑤葉色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）		2.50	19.8	4.98	3.70	4.48	2.92	3.78	3.10	4.46	2.94	3.58	3.46	2.48
⑧芒		—	F L	—	R S	R S	—	F L	F L	R S	—	—	F L	F L
⑨柱頭色		W	W	W	W	W	W	W	P	W	W	W	W	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
	⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○
⑬稃色		W S	Y S	Y S	Y S	Y S	W S	Y S	W S	Y S	Y S	W S	Y S	B F
二、生理的特性														
⑭幼苗稻熱病		M_3R_2	S_4M_1	R_2	R_2	R_1	R_1	R_3M_2	S_4	S_2M_1	0	S_1	$S_{8\cdot5}$	S_8
⑮葉稻熱病		5		2		4	4	5			3			
⑯穗頸稻熱病							10							
⑰紋枯病	⑱被害率%													
	⑲被害度%													
⑳倒伏性		／	／	—	—	—	—	／	|	／	|	|	|	
㉑耐旱性		d	±	d	d	d	d	d	±	d	d	d	d	d
㉒耐肥性		D	D	△	△	△			D		B			
㉓脫粒性		9.6	3.1	6.8	4.9	8.9	10.9	1.6	5.6	4.5	3.08	3.09	5.8	<1
㉔出穗期	②第一期								6.30		7.15			6.25
	㉕中間作	10.20	10.26	10.16	10.12	10.11	9.23	9.26	10.6	10.16	10.16	9.18	10.23	8.30
	③第二期													
三、穀粒的特性														
㉖穀粒形狀		2.89	2.98	2.57	2.92	2.88	3.07	2.66	2.42	2.47	3.38	2.85	2.66	2.90
㉗胚乳性質		G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1
㉘備考														

調査項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	8437	8438	8439	8440	8441	8442	8443	8444	8446	8447
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	121.1	117.2								140.2
①株高 ③第二期	120.6	110.5	144.8	149.6	143.6	153.0	141.0	156.2	144.6	139.0
④有效分蘖 ②第一期	15.3	15.2								21.5
④有效分蘖 ③第二期	14.0	14.7	7.6	11.8	12.3	7.0	11.0	8.0	8.6	24.4
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	4.98	3.84	4.36	5.60	6.28	4.11	4.84	2.50	2.49	2.06
⑧芒	F L	F L	—	—	P L	F L	R S	F L	F L	F l
⑨柱頭色	W	W	W	P	P	P	W	P	P	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	P	P	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
⑬稃色	Y S	L G d	B F	W S	Y S	Y S	Y S	G	Y S	W S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病			R_1M_1	R_3S_1	$S_{8.5}$	R_2	R_1M_1	M_2	M_1	R_1
⑮葉稻熱病			4	2						
⑯穗頸稻熱病				0						
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	—	／	|	—	|	|	|	|	|	／
㉑耐旱性	d	d	±	d	±	—	±	—	+	d
㉒耐肥性	A	D	D	△						
㉓脫粒性	1.9	2.00	26.1	6.5	3.2	5.3	8.3	3.8	3.1	4.8
㉔出穗期 ②第一期	6.28	6.28								6.28
㉔出穗期 ㉕中間作	8.30	8.30	10.14	10.16	10.4	10.24	10.14	10.30	10.30	9.2
㉔出穗期 ③第二期										
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.44	2.24	3.93	2.86	2.24	3.01	2.18	2.54	2.57	3.55
㉗胚乳性質	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1
㉘備考										

調査項目 Items	8448	8449	8450	8451	8453	8455	8457	8458	8459	8460	8461	8462	8463
一、形態的特性													
①株高 ②第一期									142.2	130.5			
①株高 ③第二期	151.8	158.4	165.4	134.2	137.2	132.0	133.4	136.2	134.5	132.4	148.0	132.8	138.8
④有效分蘖 ②第一期									13.4	18.5			
④有效分蘖 ③第二期	15.6	12.6	12.6	12.0	12.4	9.2	14.5	8.0	11.2	15.6	13.8	11.6	14.2
⑤葉色	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.80	3.40	3.16	4.12	4.84	4.74	4.84	3.44	4.22	3.30	4.28	3.67	4.54
⑧芒	F L	—	—	F L	F L	--	F L	F L	F L	F L	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	P	W	W	W	P	W	P	P	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn	P	P	Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
⑬稃色	Y S	Y S	L Gd	Y S	Y S	Y S	Y S	L G d	Y S	Y S	Y S	Y S	W S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	S_8	S_3M_3	R_1M_1	R_1	S_8	$S_{8.5}$	M_2	S_1M_1	M_2	S_4	0	0	0
⑮葉稻熱病							80				4		
⑯穗頸稻熱病											10		
⑰紋枯病 ⑱被害率%													
⑰紋枯病 ⑲被害度%													
⑳倒伏性	—	|	／	／	|	|	|	|	／	|	—	—	—
㉑耐旱性	d	d	d	—	±	±	d	±	—	d	d	d	d
㉒耐肥性								D	D		D	△	C
㉓脫粒性	2.9	17.0	15.6	2.5	24.2	2.37	24.2	17.2	12.5	10.1	21.4	5.9	32.7
㉔出穗期 ②第一期									7.3	7.3			
㉔出穗期 ㉕中間作	10.12	10.30	10.30	10.13	10.17	10.26	10.21	10.21	9.3	9.6	10.20	10.20	10.13
㉔出穗期 ③第二期													
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.71	2.58	2.69	2.52	2.23	2.38	2.72	2.56	2.43	2.63	2.79	2.54	2.31
㉗胚乳性質	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1	G1
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	8464	8465	8466	8467	8468	8469	8470	8471	8472	8473
一、形態的特性										
①株高 ②第一期						140.5		138.9		
①株高 ③第二期	157.4	118.2	112.0	136.8	128.4	130.8	138.0	132.3	165.0	140.6
④有效分蘖 ②第一期						22.2		12.8		
④有效分蘖 ③第二期	16.0	12.4	12.4	6.4	6.0	19.4	12.4	10.4	11.8	11.3
⑤葉色	L Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	4.00	3.76	3.30	5.02	5.18	2.58	2.24	3.20	3.36	4.74
⑧芒	—	F L	F L	F L	F L	—	—	F L	—	F L
⑨柱頭色	W	W	W	W	P	W	W	W	P	P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	B F	Y S	W S	W S	Y S	L G d
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	M_5S_1	S_1	M_3	M_2	R_1	R_1	S_5M_1	S_2	0	S_2
⑮葉稻熱病				4	5	5			5	
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	|	|	|	／	|	—	／	／	|	|
㉑耐旱性	d	d	±	±	—	⧺	d	+	d	±
㉒耐肥性	△	△	△	D	D	C	D	D		D
㉓脫粒性	20.0	18.8	3.5	4.0	2.7	8.6	7.8	3.5	1.5	∠1
㉔出穗期 ②第一期								7.15		
㉔出穗期 ㉕中間作	10.15	10.16	11.2	9.22	10.13	9.21	11.7	9.13	10.22	10.2
㉔出穗期 ③第二期						10.25		10.20		
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.91	2.40	2.29	2.26	3.08	3.24	2.29	2.62	3.64	2.86
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調査項目 Items	8474	8475	8476	8477	8478	8479	8480	8481	8482	8483	8484	8485	8486
一、形態的特性													
①株高 ②第一期			132.5										148.2
①株高 ③第二期	146.6	147.8	129.4	136.0	155.0	152.8	159.6	150.0	142.6	119.8	137.2	146.4	139.8
④有效分蘖 ②第一期			15.4										10.6
④有效分蘖 ③第二期	10.2	10.9	13.8	17.2	12.0	11.8	11.4	11.6	10.4	10.1	14.8	11.4	9.0
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.62	5.62	2.48	3.30	2.70	3.68	4.58	4.86	5.46	4.36	2.90	4.90	2.10
⑧芒	—	F L	F L	—	—	—	—	F L	F L	F L	—	—	F L
⑨柱頭色	P	W	W	W	W	W	W	P	P	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	W S	G	W S	Y S	W S	W S	L G d	W S	W S	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	0	M_3	M_2	R_1	R_3M_3	R_4M_2	M_2	R_2	M_3	M_1	M_5S_3	M_2	M_2
⑮葉稻熱病	3	3		4		4	5	4	4				
⑯穗頸稻熱病	20					10							
⑰紋枯病 ⑱被害率%													
⑰紋枯病 ⑲被害度%													
⑳倒伏性	|	|	|	—	|	—	—	／	／	|	—	|	|
㉑耐旱性	d	+	d	d	d	d	d	±	—	±	d	d	⧺
㉒耐肥性	△	B	D	D	△	D	D	D		B	△	D	
㉓脫粒性	8.0	2.1	4.8	8.0	2.2	2.2	4.4	4.1	2.7	2.5	6.9	4.9	2.9
㉔出穗期 ②第一期			7.5										7.12
㉔出穗期 ㉕中間作	10.14	10.18	9.12	10.9	10.18	10.18	10.17	9.26	10.1	10.6	10.8	10.23	9.10
㉔出穗期 ③第二期													
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	3.00	2.81	2.56	3.00	3.35	3.36	2.58	2.58	2.85	2.35	2.61	2.85	2.36
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	8487	8488	8489	8490	8491	8492	8493	8494	8495	8496
一、形態的特性										
①株高 ②第一期							123.1			
①株高 ③第二期	161.4	160.2	150.3	139.6	142.6	140.1	121.2	145.2	119.5	143.0
④有效分蘖 ②第一期							15.2			
④有效分蘖 ③第二期	10.4	11.8	9.0	6.8	10.4	14.0	13.1	10.2	13.8	9.8
⑤葉色	Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	4.94	4.18	3.76	4.15	4.26	3.14	2.48	4.11	4.26	4.52
⑧芒	—	—	—	F L	F L	—	—	F L	—	F L
⑨柱頭色	W	P	P	W	W	P	W	P	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	P	P	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	○	×	×	○	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	W S	W S	Y S	Y S	Y S	Y S	W S	W S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_2	R_1	0		M_1	S_2M_1	R_1	R_1	R_1	S_3
⑮葉稻熱病				5	4			4		
⑯穗頸稻熱病					0					
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	／	／	／	|	|	／	／	|	|	／
㉑耐旱性	d	d	d	+	±	++	—	—	d	±
㉒耐肥性	D	C	△		C	D	C	△	B	△
㉓脫粒性	8.1	8.6	8.0	7.0	9.4	7.7	10.4	5.9	7.1	4.5
㉔出穗期 ②第一期							6.13			
㉔出穗期 ㉕中間作	10.22	10.25	10.22	10.22	10.27	10.20	8.12	10.6	8.17	10.25
㉔出穗期 ③第二期										
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.94	3.70	3.66	2.60	2.69	3.01	2.90	2.88	2.62	2.93
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	gl	gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	8497	8498	8499	8500	8501	8502	8503	8504	8505	8506	8507	8508	8509
一、形態的特性													
①株高 ②第一期					146.5							113.4	
①株高 ③第二期	141.4	124.8	112.2	126.6	140.6	140.4	129.7	127.5	115.8	141.4	131.0	111.2	138.2
④有效分蘖 ②第一期					10.9							14.6	
④有效分蘖 ③第二期	16.0	9.6	15.8	10.1	8.4	6.0	12.2	9.5	14.6	13.8	17.6	14.0	14.2
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.92	3.90	3.04	4.38	2.20	2.45	4.18	3.80	3.16	3.36	2.22	4.86	2.72
⑧芒	—	F L	F L	F L	F L	F L	—	F L	F L	F L	—	F L	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	P	P	W	P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	R P	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	P	L Gn	P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○	○	×	○
⑬稃色	Y S	Y S	W S	R B	B F	G	B F	Y S	W S	W S	Y S	L G d	L G d
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	R_4M_1	M_2R_1	M_2	M_4		M_2	R_2	R_3M_2	S_3	$S_{8.5}$			
⑮葉稻熱病	4						5						
⑯穗頸稻熱病							40						
⑰紋枯病 ⑱被害率%													
⑰紋枯病 ⑲被害度%													
⑳倒伏性	—	／	／	|	|	|	—	／	／	／	／	／	／
㉑耐旱性	d	±	—	+	±	d	d	±	+	±	d	±	d
㉒耐肥性	△		△	△	A	△	C				△		△
㉓脫粒性	2.5		1.9	2.1	∠|	2.8	9.7	4.8	3.2	1.2	3.5	2.9	4.4
㉔出穗期 ②第一期					7.1							7.9	
㉔出穗期 ㉕中間作	10.11	9.13	10.11	10.19	9.1	11.28	10.4	10.1	9.20	10.1	10.6	9.27	10.19
㉔出穗期 ③第二期					10.21								
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.79	2.46	2.94	2.52	2.70	3.20	3.04	2.91	2.86	2.79	3.58	2.98	3.41
㉗胚乳性質	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	8510									
一、形態的特性										
①株　高 ②第一期										
①株　高 ③第二期	128.4									
④有效分蘖 ②第一期										
④有效分蘖 ③第二期	13.5									
⑤葉　色	L Gn									
⑥莖　基　色	Gn									
⑦穗　重（g）	3.23									
⑧　芒	—									
⑨柱　頭　色	W									
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn									
⑩稃尖色 ⑫已熟	×									
⑬稃　色	Y S									
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病										
⑮葉稻熱病										
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒　伏　性	—									
㉑耐　旱　性	＋									
㉒耐　肥　性	D									
㉓脫　粒　性	5.3									
㉔出穗期 ②第一期										
㉔出穗期 ㉕中間作	11.1									
㉔出穗期 ③第二期										
三、穀粒的特性										
㉖穀　粒　形　狀	2.26									
㉗胚　乳　性　質	Gl									
㉘備　考										

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	8601	8602	8603							
一、形態的特性										
①株　高 ②第一期	93.2	93.6	87.6							
①株　高 ③第二期	91.8	95.1	82.2							
④有效分蘖 ②第一期	10.4	8.6	12.0							
④有效分蘖 ③第二期	10.0	9.5	12.9							
⑤葉　色	Gn	Gn	Gn							
⑥莖　基　色	Gn	Gn	Gn							
⑦穗　重（g）	3.36	4.32	3.06							
⑧　芒	RM	R S	R S							
⑨柱　頭　色	W	W	W							
⑩稃尖色 ⑪未熟	R P	L Gn	L Gn							
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	×							
⑬稃　色	R P	W S	Y S							
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_8	S_8								
⑮葉稻熱病										
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒　伏　性	｜	｜	/							
㉑耐　旱　性	—	＋	d							
㉒耐　肥　性	D	C								
㉓脫　粒　性	3.5	3.2	3.3							
㉔出穗期 ②第一期	6.4	6.10	6.10							
㉔出穗期 ㉕中間作	8.13	8.14	9.8							
㉔出穗期 ③第二期										
三、穀粒的特性										
㉖穀　粒　形　狀	3.00	2.70	3.21							
㉗胚　乳　性　質	Gl	Gl	Gl							
㉘備　考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	8801									
一、形態的特性										
①株高 ②第一期										
①株高 ③第二期	118.4									
④有效分蘖 ②第一期										
④有效分蘖 ③第二期	11.4									
⑤葉色	Gn									
⑥莖基色	P									
⑦穗重（g）	3.76									
⑧芒	—									
⑨柱頭色	P									
⑩稃尖色 ⑪未熟	P									
⑩稃尖色 ⑫已熟	○									
⑬稃色	Y S									
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病										
⑮葉稻熱病										
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	／									
㉑耐旱性	d									
㉒耐肥性	15.4									
㉓脫粒性	5.7									
㉔出穗期 ②第一期										
㉔出穗期 ㉕中間作	10.29									
㉔出穗期 ③第二期										
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	3.25									
㉗胚乳性質	Gl									
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	8901	8902	8903	8904	8905	8906	8907	8908	8909	8910
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	130.4	126.1	128.6			128.8		140.5	133.0	
①株高 ③第二期	122.4	122.0	125.8	141.8	147.2	123.2	134.6	138.6	130.1	154.8
④有效分蘖 ②第一期	13.6	19.3	19.2			9.0		19.5	18.0	
④有效分蘖 ③第二期	13.4	16.4	18.8	14.8	9.8	8.0	10.2	16.6	16.0	12.6
⑤葉色	Gn	Gn	D Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.64	2.26	2.68	3.36	3.80	2.74	4.74	2.82	2.10	3.96
⑧芒	P L	P L	R S	—	—	R S	F L	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○
⑬稃色	Y S	B F	L G d	Y S	Y S	Y S	Y S	B F	L G d	W S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_1	R_2	R_1	0		R_1M_1	M_1	R_2	0	R_1
⑮葉稻熱病	5	5		3			4			2
⑯穗頸稻熱病	100									
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	|	／	—	—	／	|	／	—	／	—
㉑耐旱性	d	卄	卄	d	卄	±	—	卄	d	d
㉒耐肥性	D	C	B	C	D	D	D	A	C	D
㉓脫粒性	6.0	13.4	4.8	1.0	1.3	3.3	2.6	1.3		2.1
㉔出穗期 ②第一期	6.25		6.19			6.21			6.2	
㉔出穗期 ㉕中間作	8.22	9.12	9.21	10.12	10.11	8.30	10.5	9.18		10.17
㉔出穗期 ③第二期		10.11	10.12					10.27	10.8	
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.32	2.41	2.53	3.02	2.74	2.13	3.59	2.96	2.73	2.66
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	gl	gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	8911	8912	8913	8914	8915	8916	8917	8918	8919	8920
一、形態的特性										
①株高 ②第一期				137.4	132.8	137.4				135.5
①株高 ③第二期	156.8	146.0	143.0	135.9	129.2	118.6	130.0	127.0	126.0	123.0
④有效分蘖 ②第一期				9.2	7.2	9.8				10.6
④有效分蘖 ③第二期	11.2	15.4	15.8	7.7	6.8	7.2	12.2	17.0	12.8	8.4
⑤葉色	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.48	2.00	3.76	3.86	4.12	2.72	2.32	2.12	2.96	3.24
⑧芒	—	—	RS	—	—	—	FL	FL	—	RS
⑨柱頭色	W	W	P	W	W	W	W	W	P	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	BP	L Gn	L Gn	P	BP
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	×	×	○	×	×	○	○
⑬稃色	WS	YS	WS	WS	WS	BF	YS	G	WS	BF
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_1	0	M_1	M_1	M_3S_1	M_4	0	R_3	R_3M_1	M_1S_3
⑮葉稻熱病	2							3		
⑯穗頸稻熱病								40		
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	—	／	／	|	|	|	|	—	|	|
㉑耐旱性	+	d	d	±	±	±	+	d	d	—
㉒耐肥性	△	△	B	B	D		D	D	△	
㉓脫粒性	1.2	2.3	6.3	11.4	16.0	12.5	4.5	3.8	7.8	6.8
㉔出穗期 ②第一期				7.2	7.9	7.3				7.3
㉔出穗期 ㉕中間作	10.19	10.22	10.14	10.6	10.6	9.28	10.27	10.12	10.27	9.26
㉔出穗期 ③第二期					11.7					
三、穀粒的特性										
㉖殼粒形狀	2.60	2.95	2.68	2.32	2.44	2.91	2.77	2.89	3.07	3.19
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	8921	8922	8925	8926	8927	8923	8930	8932	8933	8934	8935	8936	8937
一、形態的特性													
①株高 ②第一期		131.2					142.8	143.4	138.8	116.0			
①株高 ③第二期	132.2	113.4	138.6	135.0	143.8	133.4	140.9	135.0	135.0	111.6	116.2	142.0	141.2
④有效分蘖 ②第一期		10.6					11.0	10.2	9.2	11.0			
④有效分蘖 ③第二期	14.6	9.6	10.8	10.6	9.6	6.6	8.8	9.2	8.5	10.5	13.6	10.0	9.5
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	D Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn
⑦穗重(g)	4.84	2.36	4.26	4.48	3.04	5.52	3.98	3.06	3.82	2.98	3.94	4.28	2.85
⑧芒	FL	RS	—	—	FL	FL	—	—	—	—	RS	—	FL
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	BP	W	BP	W	W	P	P
⑩稃尖色 ⑪未熟	RP	BP	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	BP	L Gn	BP	L Gn	L Gn	P	P
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	×	○	×	×	○	×	○	○	×	○	×
⑬稃色	WS	WS	WS	RB	YS	YS	RP	WS	G	WS	WS	L Gd	YS
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	M_2	M_3	R_1	S_6	M_8	M_3	M_3	M_1S_1	M_3	M_2S_1			
⑮葉稻熱病	11		4		100	4							
⑯穗頸稻熱病	10					5							
⑰紋枯病 ⑱被害率%													
⑰紋枯病 ⑲被害度%													
⑳倒伏性	|	|	／	|	|	|	／	|	|	|	—	|	／
㉑耐旱性	+	±	d	d	d	+	d	d	—	—	d	⧺	d
㉒耐肥性		C	D			△		△	C	△	△	B	
㉓脫粒性	2.1	6.5	9.4			3.5	5.7	9.8	3.5	4.0	7.1	4.0	4.2
㉔出穗期 ②第一期		7.6					7.1	7.5	7.5	6.28			
㉔出穗期 ㉕中間作	9.23	10.1	10.20	9.15	10.1	9.21	9.10	9.4	10.2	10.25	10.1		11.13
㉔出穗期 ③第二期												10.31	
三、穀粒的特性													
㉖殼粒形狀	2.88	3.04	3.00	2.93	3.14	2.10	3.19	2.63	2.99	3.17	2.95	3.10	3.48
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	gl	gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	8938	8939	8940	8941	8942	8943	8944	8945	8946	8947
一、形態的特性										
①株高 ②第一期										
①株高 ③第二期	137.0	165.2	122.2	160.2	168.4	113.3	115.0	117.6	116.0	121.8
④有效分蘖 ②第一期										
④有效分蘖 ③第二期	8.7	7.8	11.5	10.8	11.8	23.0	21.5	29.5	18.0	21.0
⑤葉色	Gn	L Gn	Gn	D Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	P	Gn	P	P	P	P	Gn	P	P
⑦穗重(g)	2.40	5.40	3.50	3.25	4.18	3.65	2.22	2.50	3.80	2.62
⑧芒	F L	F L	F M	F L	F L	P M	F M	F M	F L	P M
⑨柱頭色	P	P	P	P		P	P	W	W	P
⑩稃尖色 ⑪未熟	P	P	P	P	P	R P	R P	L Gn	L Gn	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○
⑬稃色	Y S	B F	W S	W S	B F	B F	Y S	Y S	Y S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病										
⑮葉稻熱病										
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	／	|	／	|	|	|	／	|	|	／
㉑耐旱性	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d
㉒耐肥性					△					
㉓脫粒性	3.5	6.7	8.7	3.9	7.7					
㉔出穗期 ②第一期										
㉔出穗期 ㉕中間作	11.18	10.31	11.16	11.10	10.18	11.16	11.16	11.19	11.19	11.21
㉔出穗期 ③第二期										
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	3.42	2.90	3.08	2.90	2.38	2.66	2.63	3.41	3.61	2.40
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	8949	8950	8951	8952	8953	8954	8955	8956	8957	8958	8960	8961	8962
一、形態的特性													
①株高 ②第一期											102.6		
①株高 ③第二期	126.8	146.2	141.4	116.6	130.8	130.0	79.0	138.0	135.0	141.0	96.5	146.8	123.8
④有效分蘖 ②第一期											12.5		
④有效分蘖 ③第二期	13.0	31.2	15.0	19.0	14.0	16.0	5.0	11.0	20.4	13.2	10.3	13.4	8.6
⑤葉色	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	P	P	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.52	3.00	2.32	2.90	3.14	3.45	3.52	4.50	3.88	4.00	4.54	5.60	4.70
⑧芒	P M	F L	F L	F L	P M	F L	F l	P M	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	P	P	W	W	B P	P	P	P	P	W	W	W	P
⑩稃尖色 ⑪未熟	R P	R P	L Gn	Gn	P	P	P	P	P	L Gn	L Gn	L Gn	P
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○
⑬稃色	W S	B F	Y S	Y S	Y S	Y S	W S	Y S	B F	L G d	W S	G	W S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病													
⑮葉稻熱病													
⑯穗頸稻熱病													
⑰紋枯病 ⑱被害率%													
⑰紋枯病 ⑲被害度%													
⑳倒伏性	—	|	／	／	|	—	—	／	／	／	／	|	／
㉑耐旱性	d	d	d	d	d	#	d	d	d	d	—	d	d
㉒耐肥性		△			D				D	D	C	△	B
㉓脫粒性		1.4							3.1			13.9	8.5
㉔出穗期 ②第一期											6.23		
㉔出穗期 ㉕中間作	11.18	11.3	11.21	11.21	11.22	11.19	11.23	11.20	10.18	10.16	9.27	10.18	10.1
㉔出穗期 ③第二期													
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	2.58	2.76	3.10	3.54	2.50	2.68	2.37	2.59	3.69	2.98	2.85	2.74	2.84
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Cl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	8963	8964	8965	8967	8968	8969	8972	8973	8974	8975
一、形態的特性										
①株高 ②第一期										
①株高 ③第二期	112.4	131.0	111.8	154.6	107.4	137.8	140.2	129.2	118.0	120.8
④有效分蘖 ②第一期										
④有效分蘖 ③第二期	11.0	12.5	9.1	7.0	10.0	13.0	8.8	9.8	15.5	18.5
⑤葉色	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn	Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	3.66	3.50	4.01	4.88	3.56	5.08	3.36	1.94	3.40	2.77
⑧芒	—	—	—	F L	R S	F L	—	—	—	—
⑨柱頭色	P	B P	W	P	P	W	W	W	W	B P
⑩稃尖色 ⑪未熟	P	P	L Gn	P	B P	L Gn	L Gn	P	L Gn	P
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	×	○	○	×	×	○	×	○
⑬稃色	B F	W S	B F	Y S	R B	Y S	L G d	B F	B F	R B
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病										
⑮葉稻熱病										
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	/	/	—	—	—	—	|	|	—	|
㉑耐旱性	d	⧺	d	d	±	d	d	⧺	d	d
㉒耐肥性	D			D			C			
㉓脫粒性	1.8			4.1			2.14			
㉔出穗期 ②第一期										
㉔出穗期 ㉕中間作	10.28	11.21	11.27	11.27	11.25	11.15	10.31	12.7	11.28	11.21
㉔出穗期 ③第二期										
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	3.34	2.60	3.91	2.93	3.30	3.30	2.89	2.79	3.22	3.60
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	g l
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	8976	8977	8978	8979	8980	8981	8982	8983	8984	8985	8986	8987	8988
①株高 ③第二期	122.7	130.0	127.3	123.8	164.0	128.4	124.2	135.4	154.8	128.8	133.2	109.0	140.0
④有效分蘖 ③第二期	17.0	15.5	19.5	10.5	7.8	14.8	11.4	21.0	9.2	10.2	11.2	11.0	6.0
⑤葉色	Gn	Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	L Gn	D Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	2.20	2.28	3.36	3.11	3.36	3.52	4.58	2.65	3.12	2.62	4.74	3.31	4.12
⑧芒	F L	—	F L	—	F L	—	—	F L	F L	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	B P	P	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	R P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	W S	B F	W S	Y S	G	W S	Y S	G	W S	B F	L G d	W S
⑳倒伏性	/	/	—	|	/	|	|	|	/	|	/	|	/
㉑耐旱性	d	d	d	+	d	+	⧺	d	d	d	d	d	d
㉒耐肥性					D	△				D	D		
㉓脫粒性						19.4	2.6				23.1		
㉔出穗期 ㉕中間作	11.21	11.25	11.22	12.1	10.22	10.30	11.5	11.17	11.2	11.7	10.29	12.2	11.20
㉖穀粒形狀	3.02	3.20	2.58	3.41	2.59	2.86	2.49	3.64	2.90	3.39	3.28	4.36	2.67
㉗胚乳性質	Gl		Gl	Gl	Gl	gl	gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	8989	8990	8991	8992	8993	8994	8995	8996	8999	9000	9001	9002	9005
一、形態的特性													
①株高 ②第一期													
①株高 ③第二期	143.6	121.6	133.8	133.8	125.0	129.3	119.6	111.3	134.8	139.8	142.2	157.4	136.6
④有效分蘖 ②第一期													
④有效分蘖 ③第二期	13.4	9.2	14.8	10.8	11.2	14.5	16.2	15.0	13.6	9.0	8.6	11.0	10.0
⑤葉色	D Gn	D Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	L Gn	D Gn	Gn	L Gn	Gn	D Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P	Gn
⑦穗重（g）	2.54	3.51	2.96	3.08	2.34	2.65	2.78	3.07	2.36	2.00	3.92	3.72	3.64
⑧芒	F L	—	—	R S	—	—	—	F L	—	F L	—	F L	—
⑨柱頭色	B P	B P	B P	P	W	W	W	B P	W	W	W	P	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	B P	B P	B P	P	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	W S	D P	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	B F	B F	Y S
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病													
⑮葉稻熱病													
⑯穗頸稻熱病													
⑰紋枯病 ⑱被害率%													
⑰紋枯病 ⑲被害度%													
⑳倒伏性	／	／	—	／	／	／	／	|	／	|	／	|	—
㉑耐旱性	d	d	±	d	＋	＋	d	d	⧺	d	＋	±	d
㉒耐肥性									△		D		△
㉓脫粒性	1.7			7.8	15.4				2.2	4.0	18.3	4.8	10.9
㉔出穗期 ②第一期													
㉔出穗期 ㉕中間作	11.12	11.23	12.2	10.12	10.21	12.2	12.14	12.13	10.20	10.29	10.15	10.23	10.11
㉔出穗期 ③第二期													
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	3.59	3.45	2.44	2.86	2.45	3.32		3.06	2.69	4.09	2.32	2.44	2.95
㉗胚乳性質	gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	gl	Gl	Gl
㉘備考													

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	9101	9102								
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	117.0	95.8								
①株高 ③第二期	102.8	98.6								
④有效分蘖 ②第一期	15.0	9.4								
④有效分蘖 ③第二期	13.8	9.6								
⑤葉色										
⑥莖基色	2.36	3.3								
⑦穗重（g）	—	—								
⑧芒	W	P								
⑨柱頭色	P	R P								
⑩稃尖色 ⑪未熟	○	○								
⑩稃尖色 ⑫已燃	Y S	R B								
⑬稃色										
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病										
⑮葉稻熱病										
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	|	|							
㉑耐旱性	d	d								
㉒耐肥性										
㉓脫粒性	11.4	10.5								
㉔出穗期 ②第一期	6.13	6.10								
㉔出穗期 ㉕中間作	9.10	9.3								
㉔出穗期 ③第二期										
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.14	2.75								
㉗胚乳性質	G1	G1								
㉘備考										

調查項目 Items ＼ 品種代號 Variety Number	9201	9202								
一、形態的特性										
①株高 ②第一期		90.4								
①株高 ③第二期	123.4	95.6								
④有效分蘖 ②第一期		19.0								
④有效分蘖 ③第二期	17.2	19.4								
⑤葉色	L Gn	D Gn								
⑥莖基色	Gn	Gn								
⑦穗重（g）	3.44	2.40								
⑧芒	—	—								
⑨柱頭色	W	W								
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn								
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×								
⑬稃色	L G d	L G d								
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病										
⑮葉稻熱病										
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	—	|								
㉑耐旱性	d	+								
㉒耐肥性	D	B								
㉓脫粒性	7.0	18.3								
㉔出穗期 ②第一期		6.5								
㉔出穗期 ㉕中間作	10.7	8.26								
㉔出穗期 ③第二期										
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	3.52	2.01								
㉗胚乳性質	G1	G1								
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	9301	9302	9303	9304	9305	9306	9307			
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	132.6	125.8								
①株高 ③第二期	98.0	125.3	117.5	122.0	95.0	90.0	111.8			
④有效分蘖 ②第一期	12.6	18.5								
④有效分蘖 ③第二期	10.7	17.6	14.9	12.1	13.0	16.0	12.0			
⑤葉色	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn			
⑥莖基色	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn			
⑦穗重(g)	3.72	3.62	3.32	3.70	4.30	4.12	2.12			
⑧芒	—	—	R S	—	—	—	—			
⑨柱頭色	P	W	W	W	W	W	P			
⑩稃尖色 ⑪末熟	P	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	L Gn	P			
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	×	×	×	×	○			
⑬稃色	Y S	Y S	Y S	Y S	W S	W S	Y S			
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	○	R_1								
⑮葉稻熱病	3									
⑯穗頸稻熱病	80									
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	—	—	／	／	／	|	|			
㉑耐旱性	±	卄	d	d	±	d	d			
㉒耐肥性	B	C								
㉓脫粒性	2.7									
㉔出穗期 ②第一期	6.19	4.6								
㉔出穗期 ㉕中間作	8.16	9.16	11.21	11.22	11.18	11.7	11.24			
㉔出穗期 ③第二期		10.10								
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.45	3.10	3.26	4.16	3.61	3.54	3.27			
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl			
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	9401	9402	9403	9404	9405	9406	9407	9408	9409	9410
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	95.2	100.8	109.2	115.4	117.0	125.2	118.0	98.0	111.4	127.4
①株高 ③第二期	78.4	92.0	96.0	115.2	108.6	106.6	97.4	81.4	106.8	118.2
④有效分蘖 ②第一期	9.4	12.4	11.5	7.8	7.8	11.8	8.0	12.6	12.6	8.0
④有效分蘖 ③第二期	9.6	10.4	10.0	8.2	7.8	10.2	7.4	10.6	10.6	8.2
⑤葉色	Gn	D Gn	Gn	Gn	D Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.84	3.20	3.68	4.65	3.87	3.56	4.62	2.78	2.78	4.24
⑧芒	—	R S	R S	—	—	R S	R S	—	—	R S
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪末熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
⑬稃色	Y S	W S	Y S	L G d	Y S	W S	Y S	Y S	Y S	W S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	0	$S_{8.5}$	S_8	R_2	S_4	S_5	M_3	S_8	M_2	R_1M_1
⑮葉稻熱病							3		4	3
⑯穗頸稻熱病							100		100	20
⑰紋枯病 ⑱被害率%	56.1	52.4	23.3	25.5	27.6	47.1	38.8	33.7	42.8	50.6
⑰紋枯病 ⑲被害度%	16.7	16.5	16.4	7.2	13.5	13.6	20.0	16.4	40.0	8.6
⑳倒伏性	／	|	|	／	／	／	／	|	|	|
㉑耐旱性	±	±	—	±	±	+	+	±	±	—
㉒耐肥性	C	C	C	C	C	D	△	C	C	△
㉓脫粒性	13.0	15.6	13.0	∠1	2.8	2.2	1.7	5.7	2.3	8.5
㉔出穗期 ②第一期	6.5	6.5	6.12	6.24	6.25	6.6	6.8	6.8	6.22	7.7
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	9.26	9.27	9.29	10.17	10.29	9.30	9.29	9.25	10.5	10.24
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.30	2.06	2.16	2.59	2.72	2.60	2.70	2.24	2.43	3.49
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	9411	9412	9413	9414	9415	9416	9417	9418	9419	9420
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	116.4	125.5	146.6	141.2	126.4	115.6	120.9	91.0	87.8	129.4
①株高 ③第二期	107.8	117.2	141.4	130.8	120.4	103.4	112.2	94.2	72.8	116.2
④有效分蘖 ②第一期	9.4	8.0	7.5	7.8	9.4	6.8	8.7	8.4	8.0	8.2
④有效分蘖 ③第二期	9.8	7.8	7.2	6.8	7.2	7.5	9.0	8.0	6.6	7.8
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn	D Gn	L Gn	Gn	D Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重 (g)	4.38	4.10	4.18	4.76	3.86	4.02	4.53	2.18	2.7	4.60
⑧芒	R S	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	P	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	P	P	L Gn	B P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	○	○	×	○	×	×	×	×
⑬稃色	G	L G d	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	B F	B F	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_2M_2	S_2R_2	S_6M_2	M_2	S_3M_2	M_2	S_3M_2	R_2	$S_{8.5}$	R_1
⑮葉稻熱病	3			3		3				3
⑯穗頸稻熱病	80			20		80				90
⑰紋枯病 ⑱被害率%	27.5	49.1	31.4	42.8	47.1	21.9	20.2	43.3	61.6	37.2
⑰紋枯病 ⑲被害度%	22.6	22.2	20.0	3.8	2.2	3.7	5.0	18.1	11.0	10.2
⑳倒伏性	／	／	／	|	／	／	／	／	|	／
㉑耐旱性	±	±	−	+	−	−	±	±	+	±
㉒耐肥性	D	C	C	△	D	C	D	D	C	C
㉓脫粒性	5.7	4.4	14.3	1.3	9.9	4.5	2.0	5.6	25.0	11.7
㉔出穗期 ②第一期	6.22	6.27	6.30	7.11	6.25	6.24	6.24	6.23	6.3	6.21
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.16	10.15	10.26	10.28	10.17	10.24	10.13	10.18	9.29	10.14
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	3.89	3.88	3.09	3.30	3.11	4.18	2.64	4.04	2.22	2.77
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	9421	9422	9423	9424	9425	9426	9427	9428	9429	9430	9431	9432	9433
一、形態的特性													
①株高 ②第一期	106.6	101.8	105.4	111.0	83.6	103.6	110.3	90.2	104.0	118.8	110.4	104.6	106.6
①株高 ③第二期	100.8	92.2	98.6	102.0	74.0	93.8	103.4	88.8	93.5	103.0	106.0	97.2	97.6
④有效分蘖 ②第一期	9.6	11.8	9.6	14.0	16.6	9.4	8.0	7.2	9.0	8.2	8.8	9.6	11.4
④有效分蘖 ③第二期	8.6	9.0	8.2	13.2	14.2	8.4	7.6	7.2	7.6	7.6	8.2	8.6	9.6
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重 (g)	3.82	3.56	4.66	2.64	2.12	3.96	2.74	4.26	4.42	4.94	4.36	4.48	4.74
⑧芒	P M	F S	—	—	—	R S	R S	—	R S	—	—	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	B P	L Gn	B P	L Gn	L Gn	L Gn	B P	L Gn	B P	B P	L Gn	L Gn	B P
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	○	×	×	○	○	×	○	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	B F	B F	Y S	Y S	Y S	B F	Y S	Y S	Y S	Y S	Y S	L G d
二、生理的特性													
⑭幼苗稻熱病	R_2	S_3R_2	R_2M_2	0	$S_{8.3}$	R_2S_3	R_1	0		M_2R_2	R_1	M_2S_4	M_2R_1
⑮葉稻熱病	4		3	4						3	3		
⑯穗頸稻熱病	100		100	100						100	30		
⑰紋枯病 ⑱被害率%	23.6	4.63	37.7		40.3	44.4	30.8	40.4	37.2	23.1	32.6	27.1	39.3
⑰紋枯病 ⑲被害度%	17.9	42.3	12.7		7.1	40.4	10.8	9.2	11.8	21.9	8.2	20.5	23.1
⑳倒伏性	／	|	／	／	|	／	／	|	|	|	／	|	／
㉑耐旱性	+	±	−	−	−	±	±	±	±	±	±	±	⧺
㉒耐肥性	C	C	C	D	C	C	C	△	C	D	C	D	D
㉓脫粒性	5.8	5.6	2.1	4.1	17.0	4	3.6	5.6	9.5	15.4	5.1	4.0	5.1
㉔出穗期 ②第一期	6.22	6.14	6.23	6.13	6.1	6.12	6.12	6.16	6.19	6.19	6.14	6.22	6.20
㉔出穗期 ㉕中間作													
㉔出穗期 ③第二期	10.18	10.2	10.25	10.4	9.25	10.8	10.4	10.10	10.9	10.22	10.9	10.17	10.12
三、穀粒的特性													
㉖穀粒形狀	3.40	3.23	4.04	2.72	2.15	3.43	4.00	2.75	3.4	3.94	2.70	2.74	2.78
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
備考													

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items		9434	9435	9436	9437	9438	9439	9440	9441	9442	9443
一、形態的特性											
①株高	②第一期	124.4	104.8	105.8	80.3	87.6	111.2	97.2	102.6	100.6	102.8
	③第二期	116.0	102.6	99.8	78.4	71.8	96.6	102.8	94.8	93.8	99.0
④有效分蘖	②第一期	7.4	7.8	9.6	16.3	9.6	8.6	11.4	10.8	8.8	8.0
	③第二期	5.8	7.6	8.6	12.3	7.4	5.4	8.8	8.2	5.8	6.6
⑤葉色		Gn	Gn	Gn	D Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色		Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)		4.64	5.02	2.42	1.96	3.58	5.32	3.38	4.92	4.76	3.90
⑧芒		—	—	—	R S	R S	—	—	—	—	—
⑨柱頭色		W	W	B P	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色	⑪未熟	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
	⑫已熟	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色		Y S	L Gd	Y S	L Gd	Y S	Y S	L Gd	L Gd	Y S	L Gd
二、生理的特性											
⑭幼苗稻熱病		RS_3	R_2M_1	R_1	S_4	RM_5	R_4M_2	R_1	M_5R_3	S_7M_2	R_1
⑮葉稻熱病			3				3				3
⑯穗頸稻熱病			10				100				50
⑰紋枯病	⑱被害率%	38.4	51.1	23.0	46.2	60.5	33.1	38.9	41.5	65.2	63.9
	⑲被害度%	19.2	3.2	15.0	24.7	16.8	4.6	17.6	16.2	4.7	24.5
⑳倒伏性		／	／	|	|	|	／	|	／	／	|
㉑耐旱性		—	⧺	—	—	⧺	±	+	±	+	⧺
㉒耐肥性		D	C	D	C	C	C	D	D	D	C
㉓脫粒性		4.3	3.6	18.9	5.1	5.6	4.9	30.2	2.0	6.3	5.1
㉔出穗期	②第一期	6.28	6.21	6.27	6.3	6.4	6.21	6.23	6.19	6.17	6.22
	㉕中間作										
	③第二期	10.27	10.10	10.16	9.30	9.29	10.15	10.27	10.15	10.9	10.18
三、穀粒的特性											
㉖穀粒形狀		3.72	2.76	2.12	2.21	2.12	2.48	2.57	2.55	2.59	2.66
㉗胚乳性質		Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考											

9444	9445	9446	9447	9448	9449	9450	9451	9452	9453	9454	9455	9456
103.2	107.2	109.0	112.6	113.2	113.6	111.6	108.2	114.4	116.4	105.6	102.2	107.6
105.4	100.8	108.0	101.8	106.2	108.2	103.8	104.6	104.2	104.6	95.4	94.8	90.6
6.4	6.8	6.2	6.6	9.4	7.8	9.0	8.8	6.2	6.6	6.0	7.6	7.6
6.0	6.4	6.4	6.4	8.2	6.0	9.4	7.2	5.8	5.8	5.8	7.0	6.0
Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
5.38	5.38	5.30	5.58	5.06	4.48	4.27	5.60	5.74	4.70	4.44	5.56	6.28
R S	R S	R S	R S	R S	R S	—	R S	—	R S	R S	R S	R S
W	W	W	W	W	W	W	W	W	P	W	W	P
P	P	P	P	P	P	R B	B P	B P	B P	B P	B P	B P
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
L Gd	L Gd	G	Y S	Y S	Y S	Y S	L Gd	L Gd	Y S	W S	L Gd	G
R_1S_1	R_1	R_1	R_1	M_4S_2	S_4M_3	M_2	M_1R_3	S_2R_3	S_6	S_5	S_1R_2	R_1
3	3	3	3				3					3
100	30	40	100				100					10
59.8	48.8	43.9	31.1	62.0	68.0	55.1	48.3	25.5	26.3	22.0	23.6	37.4
26.2	38.4	24.1	10.3	18.5	27.1	25.7	13.7	8.0	6.7	5.0	12.8	15.7
|	|	|	／	／	／	|	／	|	／	|	／	|
—	±	—	—	±	±	+	—	±	±	—	+	—
C	C	C	D	D	△	D	D	C	C	C	C	△
4.5	3.3	3.8	3.2	∠1	3.1	10.7	12.0	8.7	8.5	5.2	8.6	5.7
6.22	6.24	6.20	6.22	6.28	6.29	7.3	6.8	6.18	6.16	6.15	6.20	6.27
10.17	10.17	10.18	10.18	10.27	10.28	10.25	10.3	10.9	10.8	10.6	10.15	10.28
3.73	3.72	3.89	3.62	3.76	4.57	3.63	4.28	3.79	4.56	4.03	3.59	3.69
Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	9457	9458	9459	9460	9461	9462	9463			
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	106.8		97.4	103.4	106.8	91.8				
①株高 ③第二期	102.8	85.2	90.4	98.0	95.8	88.0	118.0			
④有效分蘖 ②第一期	12.6		12.4	10.4	13.4	10.4				
④有效分蘖 ③第二期	9.0	11.2	9.2	9.8	11.8	8.8	10.0			
⑤葉色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn			
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	R S	Gn			
⑦穗重（g）	3.34	2.20	3.08	2.86	2.20	3.70	2.72			
⑧芒	R S	—	—	—	—	R S	R S			
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W			
⑩稃尖色 ⑪未熟	B P	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn			
⑩稃尖色 ⑫已熟	○	×	×	×	×	○	×			
⑬稃色	Y S	Y S	L G d	L G d	Y S	W S	Y S			
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_2	M_1	R_1	M_1S_1	R_1	S_1	M_2R_2			
⑮葉稻熱病		4	4	4	3		3			
⑯穗頸稻熱病		100	20	50	100					
⑰紋枯病 ⑱被害率%	41.8	41.6	38.1	57.4	52.1	58.5	41.2			
⑰紋枯病 ⑲被害度%	20.2	19.3	26.7	52.6	36.5	30.7	10.0			
⑳倒伏性	|	|	|	|	|	|	|			
㉑耐旱性	±	±	+	—	—	—	±			
㉒耐肥性	B	△	B	C	C	△	△			
㉓脫粒性	10.8	12.7	5.2	3.5	10.9	5.5	12.5			
㉔出穗期 ②第一期	6.22		6.18	6.20	7.3	6.28				
㉔出穗期 ㉕中間作										
㉔出穗期 ③第二期	10.26	10.8	10.7	10.11	10.12	10.24	11.7			
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	3.56	4.41	3.46	3.69	4.29	3.70	4.09			
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl			
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	9601	9602	9603	9604	9605	9606	9607	9608	9609	9610
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	113.4	114.1	136.7	132.0						155.4
①株高 ③第二期	101.8	108.0	123.2	125.6	125.8	129.6	127.2	128.0	138.8	154.6
④有效分蘖 ②第一期	18.3	18.4	22.6	17.2						10.5
④有效分蘖 ③第二期	16.8	20.0	18.2	15.4	20.0	16.6	15.2	18.2	16.6	11.8
⑤葉色	Gn	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重（g）	1.78	2.80	1.76	4.06	3.02	2.18	2.20	4.94	5.30	4.78
⑧芒	R S	P M	—	P L	R S	R S	R S	R S	R S	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	W S	Y S	L G d	B F	L G d	Y S	Y S	L G d	G	W S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_2M_1	R_6S_6	M_2S_2	R_2	S_3	S_3R_1	S_2R_2	S_3R_2	$S.R_2$	M_1
⑮葉稻熱病			5	4						3
⑯穗頸稻熱病			100							
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	—	／	—	—	—	—	—	—	—	—
㉑耐旱性	d	d	卄	d	d	d	d	d	d	卄
㉒耐肥性	C	△	D	△	D	B	△	B	B	
㉓脫粒性	22.0	5.7	6.9	3.2	6.7	10.8	11.0	2.8	3.7	4.3
㉔出穗期 ②第一期			6.19							
㉔出穗期 ㉕中間作	9.25	9.17	8.8	9.21					10.2	9.30
㉔出穗期 ③第二期	10.13	10.13		10.11	10.3	10.4	10.5	10.4		10.20
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	3.50	2.80	2.79	2.49	3.44	3.27	3.34	3.34	3.21	4.33
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	9611	9612	9613	9614	9615	9616	9617	9618	9619	9620
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	135.4									
①株高 ③第二期	123.6	142.6	141.2	139.0	133.6	141.8	142.8	126.8	147.2	135.6
④有效分蘖 ②第一期	16.5									
④有效分蘖 ③第二期	14.2	18.4	19.8	21.6	16.0	16.0	11.8	19.8	14.6	21.2
⑤葉色	Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.63	3.84	2.74	2.66	3.78	2.38	4.34	2.76	2.74	3.26
⑧芒	—	—	RS	RS	RS	RS	—	—	—	FL
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	WS	L Gd	L Gd	YS	YS	L Gd	YS	YS	L Gd	BF
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	S_2R_2	0	S_2	S_4	S_6	R_1	R_3M_1	S_1	R_4	R_4M_1
⑮葉稻熱病			5			4	4			5
⑯穗頭稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	—	—	—	—	—	—	／	—	—	—
㉑耐旱性	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d
㉒耐肥性	C	D	D	D	B	D	B	△	C	D
㉓脫粒性	7.5	1.1	5.1	7.5	3.7	9.2	2.8	1.0	6.7	4.2
㉔出穗期 ②第一期										
㉔出穗期 ㉕中間作	9.23	10.4	10.2	10.1	10.3	10.19	10.12	10.1	10.12	10.3
㉔出穗期 ③第二期	10.14									
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	3.05	3.25	3.04	3.22	3.10	2.93	4.19	2.85	3.24	2.79
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

調査項目 Items	9621	9622	9623	9624	9625	9626	9627	9628	9629	9630	9631	9632	9633
①株高 ②第一期	122.9												
①株高 ③第二期	113.4	135.8	154.4	139.6	131.6	111.6	143.2	140.6	154.2	155.4	150.8	138.4	138.2
④有效分蘖 ②第一期	16.7												
④有效分蘖 ③第二期	13.4	18.4	15.0	19.9	13.4	20.0	19.0	18.0	17.8	16.6	15.6	18.8	16.2
⑤葉色	L Gn	Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	Gn	D Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	D Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	2.81	4.46	4.34	2.02	2.14	2.40	2.34	4.20	3.10	2.84	3.23	3.08	3.38
⑧芒	RM	PM	—	RS	—	RS	RS	PM	—	RS	RS	RS	PM
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	BF	WS	YS	YS	WS	G	L Gd	WS	G	RB	YS	BF	YS
⑭幼苗稻熱病	R_3M_2	R_1S_2	0	R_3	R_2	R_2	R_2	R_3	R_1	R_1	R_6	R_1	R_1
⑮葉稻熱病		5	2		5	3	5	5	5	5	4	4	5
⑯穗頭稻熱病		0											
⑰紋枯病 ⑱被害率%													
⑰紋枯病 ⑲被害度%													
⑳倒伏性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
㉑耐旱性	++	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d
㉒耐肥性	C	D	D	C	D	△	C	△	△	B	△	E	C
㉓脫粒性	4.0	3.6	3.2	2.0	3.7	1.3	2.9	4.7	1.2	1.1	2.8	5.8	7.2
㉔出穗期 ②第一期													
㉔出穗期 ㉕中間作	9.21	10.4	10.15	10.6	10.17	10.15	10.6	10.5	10.20	10.21	10.19	10.20	10.3
㉔出穗期 ③第二期	10.16												
㉖穀粒形狀	2.14	2.79	3.24	2.92	2.89	2.78	2.04	2.82	2.94	2.86	3.16	2.72	2.77
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考													

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	9634	9635	9636	9637	9638	9639	9640	9641	9642	
一、形態的特性										
①株高 ②第一期								129.5		
①株高 ③第二期	151.6	164.0	164.4	157.6	139.0	137.0	114.0	128.4	159.0	
④有效分蘖 ②第一期								13.2		
④有效分蘖 ③第二期	22.6	15.8	14.2	14.4	15.0	20.6	20.4	12.0	16.0	
⑤葉色	Gn	L Gn	Gn	Gn	L Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	P	Gn	Gn	P	Gn	Gn	
⑦穗重(g)	3.56	2.42	2.36	3.34	3.40	3.40	3.62	3.58	3.68	
⑧芒	—	—	—	—	R S	R S	—	—	RM	
⑨柱頭色	W	W	W	P	W	W	P	W	W	
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn	
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	○	×	×	○	×	×	
⑬稃色	Y S	W S	Y S	W S	Y S	Y S	Y S	W S	W S	
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	0	0	R_1	0	R_2	M_1	R_2	M_2	S_8	
⑮葉稻熱病	3	2	4					4		
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	—	—	—	—	—	|	|	—	—	
㉑耐旱性	d	d	d	d	d	±	d	d	d	
㉒耐肥性	△	D	D	△	△	C	△		△	
㉓脫粒性	1.5	4.1	10.5	9.6	9.4	11.4	7.8	2.7	1.4	
㉔出穗期 ②第一期						7.2				
㉔出穗期 ㉕中間作	10.19	10.19	10.20	10.19	10.1	10.6	10.27	9.29	10.6	
㉔出穗期 ③第二期										
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.97	3.18	3.37	2.94	3.05	2.32	3.91	2.98	2.66	
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調查項目 Items	9801	9802	9803	9804	9805	9806	9807	9808	9809	9810
一、形態的特性										
①株高 ②第一期		123.2			140.9	136.8		118.1	98.9	109.0
①株高 ③第二期	131.0	125.4	123.2	142.2	136.8	135.5	79.2	124.0	94.4	103.5
④有效分蘖 ②第一期		12.0			16.0	16.4		18.2	20.5	10.6
④有效分蘖 ③第二期	13.0	12.4	12.0	13.6	13.5	14.6	8.0	17.6	17.4	10.8
⑤葉色	L Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	L Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn
⑥莖基色	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	P
⑦穗重(g)	3.08	3.42	3.06	4.18	3.40	3.60	2.60	3.98	2.46	2.06
⑧芒	—	—	R S	R S	—	—	—	R S	—	—
⑨柱頭色	W	W	W	W	W	W	W	W	W	P
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	R P
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
⑬稃色	Y S	W S	Y S	G	W S	Y S	Y S	L G d	L G d	G
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_1	0	0	R_1	R_1	R_1	S_3	R_1	R_2S_1	R_1
⑮葉稻熱病	3		3	3	5				5	
⑯穗頸稻熱病										
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	／	／	—	—	—	|	|	—	／	|
㉑耐旱性	d	d	d	+	++	+	d	d	d	d
㉒耐肥性	C	B	C	△	△		D	△	B	
㉓脫粒性	1.1	1.5	6.4	5.7	8.6	9.6	6.5	8.5	4.5	2.9
㉔出穗期 ②第一期					7.6	7.8				6.25
㉔出穗期 ㉕中間作	10.2	9.18	10.1	10.6	9.10	9.9	10.7	9.14	9.10	8.22
㉔出穗期 ③第二期		10.19				11.2		10.12	10.8	
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.51	2.51	2.69	2.68	2.57	2.48	2.24	2.17	2.63	3.06
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	9811	9812	9813	9814	9815	9816	9817	9818	9819	9820
一、形態的特性										
①株高 ②第一期	118.0	101.2				134.6	126.4	111.5		117.7
①株高 ③第二期	104.2	92.9	127.6	138.6	116.3	133.1	121.2	110.6	137.6	113.0
④有效分蘖 ②第一期	26.8	16.4				12.8	15.6	13.5		10.2
④有效分蘖 ③第二期	23.6	14.9	13.6	12.8	21.2	12.2	14.8	14.8	18.8	11.5
⑤葉色	Gn	L Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	L Gn	D Gn	L Gn
⑥莖基色	Gn	P	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn	Gn
⑦穗重(g)	3.52	1.23	1.96	3.61	3.03	3.10	2.78	4.60	2.96	2.04
⑧芒	—	—	—	R S	—	—	—	—	P M	—
⑨柱頭色	W	P	W	W	W	W	W	W	W	W
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	P	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn	L Gn
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
⑬稃色	Y S	B F	W S	Y S	G	Y S	W S	Y S	W S	Y S
二、生理的特性										
⑭幼苗稻熱病	R_1	R_1	R_1	R_1	R_1	R_1	R_1	R_1	0	R_1
⑮葉稻熱病		5	3	4		4	3	2	3	3
⑯穗頸稻熱病		100							0	
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	—	｜	—	—	／	／	—	—	—	—
㉑耐旱性	d	d	d	d	d	d	d	#	d	#
㉒耐肥性	C	C	D	D	△	C	C	C	C	D
㉓脫粒性	10.5	8.9	1.0	1.1	7.4	7.8	7.1	7.3	7.4	1.7
㉔出穗期 ②第一期		6.22				6.19				
㉔出穗期 ㉕中間作	9.23	8.23	10.5	10.18	10.20	8.14	9.21	9.25	10.6	9.23
㉔出穗期 ③第二期	10.12						10.17	10.16		10.20
三、穀粒的特性										
㉖穀粒形狀	2.47	3.90	4.14	3.71	3.36	2.10	3.03	3.05	2.53	2.84
㉗胚乳性質	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl
㉘備考										

品種代號 Variety Number / 調査項目 Items	9821	9822	9823	9824	9825					
①株高 ②第一期			126.1	115.1	124.8					
①株高 ③第二期	135.2	127.6	124.6	110.0	104.8					
④有效分蘖 ②第一期			15.0	19.1	11.0					
④有效分蘖 ③第二期	18.2	13.2	12.8	16.2	8.5					
⑤葉色	L Gn	Gn	Gn	D Gn	D Gn					
⑥莖基色	Gn	Gn	P	Gn	Gn					
⑦穗重(g)	2.98	2.20	3.00	2.04	1.53					
⑧芒	R S	R S	P M	P M	—					
⑨柱頭色	W	W	P	W	W					
⑩稃尖色 ⑪未熟	L Gn	L Gn	P	L Gn	L Gn					
⑩稃尖色 ⑫已熟	×	×	○	×	×					
⑬稃色	W S	B F	Y S	R B	B F					
⑭幼苗稻熱病	R_1M_1	M_1R_1	R_1	S_7	S_8					
⑮葉稻熱病	5	5								
⑯穗頸稻熱病		60								
⑰紋枯病 ⑱被害率%										
⑰紋枯病 ⑲被害度%										
⑳倒伏性	—	—	｜							
㉑耐旱性	d	±	#	#	±					
㉒耐肥性	D	△	B	△	△					
㉓脫粒性	9.3	1.5	3.3	5.5	2.0					
㉔出穗期 ②第一期										
㉔出穗期 ㉕中間作	10.20	10.21	9.22	9.11	9.20					
㉔出穗期 ③第二期			10.10	10.12	10.12					
㉖穀粒形狀	2.94	2.83	2.73	2.64	2.54					
㉗胚乳性質	Gl	Gl	gl	gl	gl					
㉘備考										